



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 04.10.2024
Αριθ. πρωτ: 10239/283686**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr**

**Προς: CIECH Sarzyna S.A., Πολωνίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70412 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού (ζιζανιοκτόνο) BGT (glyphosate 18% β/ο) ως προς τα στοιχεία στο φάσμα δράσης καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 Απόφασή μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
6. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»

7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 10239/283686/20.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 70412 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BGT (δ. ο. glyphosate 18% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 316/9074/04.02.2021 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία στο φάσμα δράσης καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Το σημείο **17**, απαλείφεται και το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ./στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ Σόργο ¹ SORVU Κεχρί ¹ ΡΑΝΜΙ	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	250-300	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος. Φεβρουάριο - Ιούλιο/ Πριν και μετά τη σπορά (προφυτρωτικά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00)	1
Ακαλλιέργητες εκτάσεις, βιομηχανικές περιοχές	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400-800	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος. Απρίλιο - Οκτώβριο/ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	1
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας (σιτηρών, αραβοσίτου, ελαιοκράμβης και άλλων) ΥΣΤΕΓ, ΥΣΤΖΕ	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκάσμος. Ιούλιο - Νοέμβριο / Μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, σε μέγεθος ζιζανίων μετά τα 2 πραγματικά φύλλα (BBCH 12)	1

<p>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά⁵ PYUCO - Κυδωνιά CYDOB - Μουσμουλιά MSPGE - Ιαπωνική Μουσμουλιά ΕΙΟJA 	<p>Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*</p>	400-600	-	10-30	<p>Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Απρίλιο - Νοέμβριο / Κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-81)</p>	1
<p>Λωτός¹ DOSKA</p>	<p>Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*</p>	400-700	-	10-30	<p>Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00)</p>	1
<p>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πορτοκαλιά³ CIDSΙ - Μανταρινιά CIDRE - Λεμονιά^{1, 2} CIDLI - Γκρέϊτ-φρουτ^{1, 4} CIDPA 	<p>Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*</p>	400-700	-	10-30	<p>Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη</p>	1

					συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-79 και BBCH 89-00)	
<p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ¹</p> <ul style="list-style-type: none"> - Νεκταρινιά PRNPN - Κερασιά⁶ PRNAV - Δαμασκηνιά⁷ PRNDO 	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400-700	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00)	1
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400-600	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-79 και BBCH 89-00)	1

Ελιά OLVEU (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400-700	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρπόδεσης (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-81 και BBCH 89-00)	1
ΑΚΡΟΔΡΥΑ ¹ - Αμυγδαλιά PRNDU - Φιστικιά PLAVE - Φουντουκιά CYLAV - Καρυδιά IUGRE - Καστανιά CSNSA - Κουκουναριά PIUPN	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)*	400-700	-	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης, Ιανουάριο - Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της βλάστησης, πριν την έναρξη της ανθοφορίας έως την πλήρη ανθοφορία και μετά τη συγκομιδή πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου (μεταφυτρωτικά των ζιζανίων) (BBCH 00-65 και BBCH 89-00)	1

Παρατηρήσεις:

1. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες πυρηνοκάρπων, ακρόδρυων, λωτού, σόργου και κεχριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε αυτές τις καλλιέργειες να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
2. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει το κίτρο.
3. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νερατζιά και το περγαμόντο.

4. Η χρήση στο γκρέϊπ-φρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
5. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει την αχλαδομηλιά.
6. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
7. Η χρήση στη δαμασκηλιά περιλαμβάνει τη κορομηλιά.
8. Εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό, ανάμεσα στα δένδρα επί των γραμμών φύτευσης σε λωρίδες που καλύπτουν το 33% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.
9. Μην το εφαρμόζεται στο γλυκό καλαμπόκι.
10. Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών).
11. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
12. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή.
13. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πολυετών ζιζανίων στους αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, να τηρείται ελάχιστο διάστημα 3 ημερών μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας.

***Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:**

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ-ΣΟΡΓΟ-ΚΕΧΡΙ

Ευαίσθητα

Abutilon theophrasti - ABUTH (Αγριοβαμβακιά)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)
Xanthium strumarium - XANST (Αγριομελιτζάνα)
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)
Sorghum halepense - SORHA (Βέλιουρας)

Μετρίως ευαίσθητα

Helminthotheca echinoides - PICEC (Πικρίς)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ευαίσθητα

Sonchus asper - SONAS (Ζωχός τραχύς)
Sonchus arvensis - SONAR (Ζωχός)

Μετρίως ευαίσθητα

Rumex crispus - RUMCR (Λάπαθο)

ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ευαίσθητα

Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Lamium amplexicaule - LAMAM (Δωδεκάνθι)
Papaver rhoeas - PAPRH (Παπαρούνα)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)
Setaria viridis - SETVI (πράσινη Σετάρια)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

Μετρίως ευαίσθητα

Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

- Δόση 400-600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Solanum nigrum - SOLNI (Αγριοτοματιά)
Sonchus oleraceus - SONOL (Ζωχός)

Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοραδίκι)
Hordeum murinum - HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Μετρίως ευαίσθητα (δόση 400 κ.εκ./στρ.)
Daucus carota - DAUCA (Καρότο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

- Δόση 600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Daucus carota - DAUCA (Καρότο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

Μετρίως ευαίσθητα

Malva sylvestris - MALSI (Μολόχα)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

- Δόση 400-700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Solanum nigrum - SOLNI (Αγριοτοματιά)

Sonchus oleraceus - SONOL (Ζωχός)

Μετρίως ευαίσθητα

Malva sylvestris - MALSI (Μολόχα)

- Δόση 400 κ.εκ./στρ.

Μετρίως ευαίσθητα

Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

- Δόση 700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

Μετρίως ευαίσθητα

Conyza bonariensis - ERIBO (Μικρή Κόνυζα)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

- Δόση 400-600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)

Solanum nigrum - SOLNI (Αγριοτοματιά)

Sonchus oleraceus - SONOL (Ζωχός)

Taraxacum officinale -TAROF (Αγριοραδίκι)

Hordeum murinum - HORMU (Αγριοκρίθαρο)

Μετρίως ευαίσθητα (δόση 400 κ.εκ./στρ.)

Daucus carota - DAUCA (Καρότο)

Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

- Δόση 600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Daucus carota - DAUCA (Καρότο)

Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

Μετρίως ευαίσθητα

Malva sylvestris - MALSI (Μολόχα)

- Δόση 700 κ.εκ./στρ.

Μετρίως ευαίσθητα

Conyza bonariensis -ERIBO (Μικρή Κόνυζα)

ΕΛΙΑ

- Δόση 400-700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Sonchus oleraceus-SONOL (Ζωχός)

Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοραδίκι)

Lolium multiflorum - LOLMU (Πολύανθη ήρα)

- Δόση 700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Anagallis arvensis - ANGAR (Αναγαλλίδα)

Picris hieracioides - PICHI (Πικραλίδα)
 Μετρίως ευαίσθητα
Conyza bonariensis - ERIBO (Μικρή Κόνυζα)
Conyza canadensis - ERICA (Κόνυζα)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ - ΛΩΤΟΣ

▪ Δόση 400-600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Solanum nigrum - SOLNI (Αγριοτοματιά)
Sonchus oleraceus - SONOL (Ζωχός)
Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοραδίκι)
Hordeum murinum - HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Μετρίως ευαίσθητα (δόση 400 κ.εκ./στρ.)

Daucus carota - DAUCA (Καρότο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)
 ▪ Δόση 400-700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Lolium multiflorum - LOLMU (Πολύανθη ήρα)
 ▪ Δόση 600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Daucus carota - DAUCA (Καρότο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)
Μετρίως ευαίσθητα

Malva sylvestris - MALSI (Μολόχα)
 ▪ Δόση 700 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Anagallis arvensis - ANGAR (Αναγαλλίδα)
Picris hieracioides - PICHI (Πικραλίδα)
 Μετρίως ευαίσθητα
Conyza bonariensis - ERIBO (Μικρή Κόνυζα)
Conyza canadensis - ERICA (Κόνυζα)

ΑΜΠΕΛΙ

▪ Δόση 400-600 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα

Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Solanum nigrum - SOLNI (Αγριοτοματιά)
Daucus carota - DAUCA (Καρότο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περικοκλάδα)

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 316/9074/04.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ