



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.10.2024
Αριθ. πρωτ: 5691/145142

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14636 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSECTOIL KEY [δ. ο. Paraffin oil/(CAS 8042-47-5) 79% β/ο] ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».
6. Την αριθμ. 12140/117318 π.ε /08.02.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14636 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSECTOIL KEY [δ. ο. Paraffin oil/(CAS 8042-47-5) 79% β/ο], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 5691/145142/23.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14636 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSECTOIL KEY [δ. ο. Paraffin oil/(CAS 8042-47-5) 79% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12140/117318 π.ε./08.02.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 10, 11 και 17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέϊπ φρούτ CIDPA	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU)				Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
Λεμονιά CIDLI	Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE)					
Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE	Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE)	1000 - 1500	100- 200	1000 - 3000		
Πορτοκαλιά CIDSΙ	Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE)					
Φράπα CIDGR	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)					
	κ.α. ακάρεα (<i>Eutetranychus banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI)					
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidotus perniciosus</i> - QUADPE)	750 - 1000	50-150	375- 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Αχλαδιά						

<p>ΡΥΥCO</p> <p>Κυδωνιά CYDOB</p> <p>Μουσμουλιά MSPGE</p> <p>Αχλαδόμηλα ΡΥΥPC</p>	<p>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</p> <p>Βαμβακάδα** (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>-PSEAPE)</p> <p>Ψευδόκοκκος** (<i>Planococcus citri</i>-PSECCI)</p> <p>Ψώρες** (<i>Eriococcus lagerstroemiae</i>-ERIOILA)</p> <p>Ματόψειρα** (<i>Eriosoma lanigerum</i>-ERISLA)</p>					
<p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</p> <p>Βερικοκιά PRNAR</p> <p>Κερασιά PRNAV</p> <p>Ροδακινιά PRNPS</p> <p>Νεκταρινιά PRNPN</p> <p>Δαμασκηνιά PRNDO</p>	<p>Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)</p> <p>Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>-PSEAPE)</p> <p>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος** (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR)</p>	750 - 1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
<p>Αμυγδαλιά* PRNDU (χρήση ήσσονος σημασίας)</p>	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>-QUADPE)</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπες (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>-PSEAPE) (<i>Planococcus</i> /<i>Pseudococcus citri</i>-PSECCI) (<i>Diaspis</i>-DIASSP)</p> <p>Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>-SAISOL)</p> <p>Παρλατόρια</p>	750 - 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	<p>(<i>Parlatoria oleae</i>-PARLOL)</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i>-LEPSUL)</p> <p>Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i>-CERPRU)</p> <p>Ψώρες (<i>Sphaerolecanium prunastri</i>-LECAPN) (<i>Eulecanium persicae</i>-LECAPE)</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR)</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>-METTUL)</p> <p>Παραμορφωτικό άκαρι (<i>Aceria sheldoni</i>-ACEISH)</p> <p>Ακάρεα (<i>Aculus pelekassi</i>-ACULPE) (<i>Bryobia rubrioculus</i>-BRYORU)</p>					
<p>Φουντουκιά* CYLAV (χρήση ήσσονος σημασίας)</p>	<p>Βαμβακάδα (<i>Diaspis</i>-DIASSP)</p> <p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR)</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>-METTUL)</p> <p>Ακάρεα (<i>Bryobia</i></p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	<i>praetiosa-BRYOPR)</i>					
Φιστικιά* ΡΙΑΒΕ (χρήση ήσσονος σημασίας)	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae-TETRUR</i>) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae-SAISOL</i>) Ψώρες (<i>Parthenolecanium pruinatum - LECAP1</i>) (<i>Parthenolecanium corni - LECACO</i>) (<i>Coccus hesperidum-COCCHÉ</i>)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ελιά ΟΛΒΕΥ	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae-SAISOL</i>)	750 – 1500	50 – 100	375 – 1500	Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθηση BBCH 00-59 ή από την πτώση των πετάλων έως την έναρξη της πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) BBCH 71-75	1

	<p>Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Παρλατόρια** <i>(Parlatoria oleae- PARLOL)</i></p> <p>Πολλίνια** <i>(Pollinia pollini- POLNPO)</i></p> <p>Άσπρη ψώρα** <i>(Aspidiotus nerii- ASPDNE)</i></p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα** <i>(Lepidosaphes Ulmi - LEPSUL)</i></p> <p>Ψώρες** <i>(Leucaspis riccae- LEUARI)</i></p> <p><i>(Chrysomphalus dictyospermi - CHRYDI)</i></p> <p>Ακάρεα** <i>(Eriophyes vitis - ERPHVI)</i> <i>(Tegolophus hassani - TEGLSP)</i> <i>(Oxycenus maxwelli- OXYNMA)</i> <i>(Eotetranychus carpini - EOTECA)</i></p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Αμπέλι VITVI	<p>Ψώρα (Parthenolecanium corni- LECACO)</p> <p>Ψευδόκκοκος (Planococcus citri- PSECCI)</p>	750 – 1500	50 – 100	375 – 1500	Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθηση BBCH 00-57	1
	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>(Tetranychus urticae-TETRUR)</i></p> <p>Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi- METTUL)</p>				Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	

	<p>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</p> <p>Ψευδόκοκκος ή Βαμβακάδα** (<i>Pseudococcus sp.-PSECSP</i>) (<i>Planococcus sp.-PLANSP</i>)</p> <p>Ερίνωση** (<i>Eriophyes vitis-ERPHVI</i>)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ροδιά* PUNGR (χρήση ήσσονος σημασίας)	<p>Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae-TETRUR</i>)</p> <p>Ακάρεα (<i>Eriophyes grannati-ACEIGA</i>)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Συκιά* FIUCA (χρήση ήσσονος σημασίας)	<p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae-TETRUR</i>)</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi -METTUL</i>)</p> <p>Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci-CERPRU</i>)</p> <p>Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus ficus-PLANFI</i>)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Ακτινιδιά* ATIDE (χρήση ήσσονος σημασίας)	<p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae-TETRUR</i>)</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi - METTUL</i>)</p> <p>Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE</i>)</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona-PSEAPE</i>)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του **σκευάσματος** επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.
6. **Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.**

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της Αμυγδαλιάς, Φουντουκιάς, Φιστικιάς, Ροδιάς, Συκιάς και Ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στους ήσσονος σημασίας εχθρούς βαμβακάδα, ψευδόκοκκο, ψώρα και ματόψειρα στα Μηλοειδή, κίτρινο τετράνυχο στα Πυρηνόκαρπα, παρλατόρια, πολλίνια, άσπρη ψώρα, μυτιλόμορφη ψώρα, ψώρα και ακάρεα στην Ελιά, βαμβακάδα και ερίνωση στο Αμπέλι. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Sp3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 5 μέτρων σε Εσπεριδοειδή, **Ροδιά**, και
- 10 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, **Αμυγδαλιά**, **Φουντουκιά**, **Φιστικιά**, **Ελιά**, **Αμπέλι**, **Συκιά** και **Ακτινιδιά**.

Sp3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Sp8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12140/117318 π.ε /08.02.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ