



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 8869/240521

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
E-mail: [l.vellis@efthymiadis.gr](mailto:l.vellis@efthymiadis.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 2203 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl 16,4 % β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικυδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
  - (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 07/2024 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 1659/17.07.2024) και την συμπληρωματική εισήγηση (ΕΜΠ3311/10.10.2024).
- Την αριθμ. 5447/122007/28.05.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 2203 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl 16,4 % β/ο).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).

7. Τις αρ. πρωτ. 5056/130913/03.05.2023, 9232/266128/29.08.2023, 448/10923/12.01.2024, 1088/27206/29.01.2024, 2527/63819/01.03.2024 και 8869/240521/08.08.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **2203** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ακαρεοκτόνο) ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl 16,4 % β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 5447/122007/28.05.2019, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 6, 7, 10, 11, 12** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> (METTCI)	120-300	100-120	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης, φούσκωμα οφθαλμών) BBCH 51-89	1 εφαρμογή
Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB), Μούσμουλα (MSPGE), Ιαπωνική Αχλαδιά -Nashi (PYUPC)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	120-180	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοιξη έως Φθινόπωρο) BBCH 35-89	1 εφαρμογή

Ροδακινιά (PRNPS)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	120-180	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Άνοιξη έως Φθινόπωρο) BBCH 35-89	1 εφαρμογή
Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME) (Υ, Θ)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	100-120	100-120	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-80	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Φουντουκιά (CYLAV)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	150	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων.	1 εφαρμογή
Αγγούρι (Υ,Θ) CUMSA, Αγγουράκι (Υ, Θ) CUMSA, Κολοκύθι (Υ, Θ) CUUPG	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-80	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πεπόνι (Υ) CUMSA, Καρπούζι (Υ) CUMSA, Κολοκύθα (Υ) CUUPG	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-80	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά (Υ, Θ)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	100-120	100-120	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. BBCH 30-80	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:</b>						

<p>1. Το σκεύασμα έχει δευτερογενή δράση για την αντιμετώπιση των ακάρεων: <i>Phytonemus</i> sp., <i>Eriophyes</i> sp. στις εγκεκριμένες καλλιέργειες.</p> <p>2. Συνιστάται η επέμβαση στην έναρξη της προσβολής, με όγκο νερού που διασφαλίζει ομοιόμορφη και καλή διαβροχή του φυλλώματος.</p> <p>3. Σε περίπτωση καθυστερημένης εφαρμογής όπου παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί σε ενήλικα, προνύμφες και ωά ακάρεων, συνιστάται ψεκασμός με εγκεκριμένο ωοκτόνο ακαρεοκτόνο σκεύασμα που συμπληρώνει τη δράση.</p> <p>4. Η χρήση στο αγγούρι, αγγουράκι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι και κολοκύθα υπαίθρου, περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.</p>						
<p>Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον Κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Φράουλες (Υ&Θ) FRAAN	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	100-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-89	1 εφαρμογή
<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χρήση στις φράουλες υπαίθρου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.</li> <li>• Στο <b>σημείο 13</b>: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: <b>Φράουλα (0152000) (Υ &amp; Θ): 3 ημέρες</b></li> </ul>						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

<p><b>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</b></p> <p>Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία <i>acequinocyl</i>, η οποία ανήκει στην ομάδα 20 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να γίνεται χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.</li> <li>-Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.</li> <li>-Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φύλλων με το ψεκαστικό υγρό.</li> <li>-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.</li> <li>-Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.</li> </ul>
--

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

-

-

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**Μην εισέρχετε στον αγρό** πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
 H370: Προκαλεί βλάβες στους **πνεύμονες (από εισπνοή)**.  
 H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 EUH208: Περιέχει acequinosyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
 P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
 P260: Μην αναπνέετε αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.  
**P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.**  
 P264: Πλύνετε τα χέρια και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 P501: Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με εθνική νομοθεσία.

**Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση, και ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή.**

**Σε περιπτώσεις πυκνής φύτευσης φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια, και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή.**

**Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.**

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε:

- Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών (με δόση: 300 κ.εκ./στρ).

Μια απέκαστη ζώνη προστασίας:

20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 30% ή

10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% ή

3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 95% ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 25 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

- Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών (με δόση έως 200 κ.εκ./στρ.).

Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας :

10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 70% ή

3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% ή

τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

- Για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών, των Πυρηνοκάρπων, της Φουντουκιάς και των Καλλωπιστικών ύψους άνω των 50 εκ.

Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας:

10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 70% ή

3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% ή

τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος κάτω των 50 εκ. τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.**

12

Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P308 + P311: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα με καθαρό νερό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	28 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μούσμουλα, Ιαπωνική Αχλαδιά – Nashi	30 ημέρες
Ροδακινιά	30 ημέρες
Τομάτα (Υ & Θ), Μελιτζάνα (Υ & Θ), <b>Αγγούρι (0232010) (Υ &amp; Θ),</b> <b>Αγγουράκι (0232020) (Υ &amp; Θ),</b> <b>Κολοκύθι (0232030) (Υ &amp; Θ),</b> Πεπόνι (0233010) (Υ), Καρπούζι (0233030) (Υ), Κολοκύθα (0233020) (Υ).	3 ημέρες
Φουντουκιά	21 ημέρες

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5447/122007/28.05.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**