



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14 - 06 - 2017
Αριθ. Πρωτ. 6622/64720

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Εθνικής Αντίστασης 73,

TELEFAX: 210 9212090

Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

E-mail: technical@alfagro.gr

Τηλέφωνο: 210 9287161

e-mail: chapanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70130 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) COTTONEX 50 SC (δ.ο. fluometuron) ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ήσσοнос σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Το SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.2 23 September 2016 GUIDANCE DOCUMENT Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7329/85398/31-7-2015, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. 70130 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **COTTONEX 50 SC**, που χορηγήθηκε με την αριθ. **6153/72427/18-9-2015** Απόφασή μας, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή .

Συγκεκριμένα, τα σημεία **4, 5** και **13.2** διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι και το σουσάμι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λίτρα / στρέμμα		
CMJSP - Βαμβάκι	Καταπολέμηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	200 - 400	--	30-50	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση	1
		200 - 400	--	30-50	Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά.	1

Χρήση ήσσονος σημασίας SEGIN - Σουσάμι	Καταπολέμηση η ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	200 - 400		30-50	Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά.	1
---	---	-----------	--	-------	------------------------------------	---

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.
2. Η προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
3. Σε 7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να 'ενεργοποιηθεί' το fluometuron.
4. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη
5. **Καταπολεμούμενα ζιζάνια**

Ευαίσθητα Αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*) - ECHSS

Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus spp*) - AMASS

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*)* - ABUTH

Λουβουδιές (*Chenopodium spp*) - CHESS

Τατούλας (*Datura stramonium*) - DATST

Χαμομήλι (*Matricaria recutita*) - MATCH

Ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*)* - HEOEU

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) - POLPE

Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*) - POLAV

Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) - POROL

Λάπαθο (*Rumex spp.*) - RUMSS

Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) - SENVU

Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*) - SINAR

Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) - SOLNI

Ζωχοί (*Sonchus sp*) - SONSS

Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)* - XANST

Τριβόλι (*Tribulus terrestris*) - TRBTE

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Χρωζοφόρα (*Chrozophora tinctoria*) - CRZTI

Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*) - LAMAM

Σετάριες (*Setaria sp.*) – SETSS

*Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση

6. Για την καταπολέμηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων το Cottonex 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.
7. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σουσαμιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#).

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λιτρα / στρέμμα		
CMJSP - Βαμβάκι	Καταπολέμηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	300+100	-- --	30-50	Σπαστή εφαρμογή: 1. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση + 2. Προφυτρωτικά	2 / 7

Παρατηρήσεις:

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Μουχρίτσα *Echinochloa crus-galli* v- *ECHCG*,
 Βλήτα *Amaranthus retroflexus* - *AMARE*,
 Λουβουδιές *Chenopodium album* - *CHEAL*,
 Τατούλας *Datura stramonium* - *DATST*,
 Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* – *SOLNI*,
 Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium* - *XANST*

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#).

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι- Σουσάμι	Δεν εφαρμόζεται, καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. **6153/72427/18-9-2015** Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ