

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26 - 10 -2017  
Αριθ. πρωτ: 945/10363

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20,  
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

E-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** Ανανέωση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **NORTRON 50 SC (δραστική ουσία ethofumesate)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία ethofumesate.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις υπ' αρ. 9349/89412/25-08-2017 και υπ' αρ. 10211/98764/18-09-2017 αξιολογήσεις του Μ.Φ.Ι.
10. Την υπ' αρ. 945/10363/30-01-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NORTRON 50 SC** (δραστική ουσία ethofumesate) της εταιρείας **Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

7154

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

31.03.2008

1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης

26.10.2017

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

31.10.2032

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

NORTRON 50 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

ethofumesate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Min 97 % β/β

Χημική ομάδα

Βενζοφουράνια

Παρασκευαστής

Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
51373 Leverkusen, Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
(πλήρης διεύθυνση):  
Bayer Vapi Pvt. Ltd,  
Plot No. 306/3, Phase II GIDC,  
Vapi - 396195 Gujrat, India

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **ethofumesate**, όπως αυτές έχουν κατατεθεί με το υπ' αρ. 945/10363/30-01-2017 έγγραφο, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
 Σωρού 18-20, Μαρούσι  
 ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685  
 Τ.Κ. 151 25  
 Τηλ.: 210 6166000  
 Fax: 210 6109100  
 E-mail: [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
 Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι  
 Τ.Κ.: 151 25  
 Τηλ.: 210 6166374  
 Fax: 210 6109100  
 E-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

|  |
|--|
|  |
|--|

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Bayer S.A.S. - Division Crop Science,  
 16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106,  
 69266 Lyon Cedex 09, France**

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer AG  
 Industriepark Höchst  
 65926 Frankfurt, Germany
2. Bayer S.A.S. - Division Crop Science  
 Site de Marle  
 Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier  
 Zone Industrielle BP2  
 02250 Marle-sur-Serre, France
3. Phyteurop S.A.  
 ZI de la Grande Champagne  
 49260 Montreuil-Bellay, France
4. Schirm GmbH  
 Geschwister-Scholl-Straße 127  
 39218 Schönebeck (Elbe), Germany
5. Bayer S.A.S. - Division Crop Science  
 Industrial Operations – Villefranche  
 1 avenue Edouard Herriot  
 69400 Villefranche-Limas, France
6. Imperial Chemical Logistics GmbH

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Niederlassung Wolfenbüttel  
Wendessener Strasse 11c  
38300 Wolfenbüttel, Germany

7. Bayer CropScience LP  
8400 Hawthorn Road  
Kansas City, MO 64120, USA

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
Imperial Chemical Logistics GmbH  
Niederlassung Wolfenbüttel  
Wendessener Strasse 11c  
38300 Wolfenbüttel, Germany

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: ethofumesate 50% β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες: 54,38 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2

## Συσκευασία(ες)

## 2.2 Συσκευασία(ες):

| A/A | Είδος        | Μέγεθος   | Υλικό |
|-----|--------------|-----------|-------|
| 1   | Φιάλη        | 200 κ.εκ. | HDPE  |
| 2   | Φιάλη        | 350 κ.εκ. | HDPE  |
| 3   | Φιάλη        | 500 κ.εκ. | HDPE  |
| 4   | Φιάλη        | 600 κ.εκ. | HDPE  |
| 5   | Φιάλη        | 1 λίτρο   | HDPE  |
| 6   | Φιάλη/Δοχείο | 3 λίτρα   | HDPE  |
| 7   | Φιάλη/Δοχείο | 5 λίτρα   | HDPE  |

## 3

## Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με 20 – 30 λίτρα νερό/στρέμμα. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή του. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με το σκεύασμα Spark EC (rhenmedipham 16% + desmedipham 16%).

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** ---

|          |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| <b>4</b> | Κατηγορία και τρόπος δράσης: | <p>Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα.</p> <p>Το ethofumesate (χημική ομάδα βενζοφουρανίων) παρεμποδίζει την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων με δράση στις επιμηκυνάσες των κυττάρων, οπότε παρεμποδίζεται η κυτταρική διαίρεση με αποτέλεσμα να σταματάει η ανάπτυξη των ζιζανίων. Απορροφάται από το κολεόπτυλο των αγρωστωδών ζιζανίων και το υποκοτύλιο των πλατύφυλλων ζιζανίων κατά την έκπτυξή τους, ενώ σε νεαρά ζιζάνια απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα.</p> |
|----------|------------------------------|--|

| <b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης   |   |                    |                                |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής   | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος |                                | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο |
|   |   | κ.εκ. σκ./στρ.     | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα |  |  |
| <b>Ζαχαρότευτλα (BEAVP)</b><br><br><b>Κτηνοτροφικά τεύτλα (BEAVC)</b> | <i>Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια:</i><br><br>- Καπνόχορτο ( <i>Fumaria officinalis</i> ) (FUMOF)<br><br>- Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη ( <i>Gallium aparine</i> ) (GALAP) | 150-200            | 20-30                          | <b>Μεταφυτρωτικά*</b><br>στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας και μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. | 1  |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|  |  |    |       |  |   |
|--|--|----|-------|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Στελλάρια<br/>(<i>Stellaria media</i>)<br/>(STEME)</li> <li>- Τραχύ βλήτο<br/>(<i>Amaranthus retroflexus</i>)<br/>(AMARE)</li> <li>- Σετάρια<br/>(<i>Setaria spp.</i>)<br/>(SETSP)</li> </ul> | 50 | 20-30 | <b>Μεταφυτρωτικά</b><br>(μικροδόσεις ζιζανιοκτόνων)** από το στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. | 2 |
|--|--|----|-------|--|---|

**Παρατηρήσεις:**

\*Για διεύρυνση του φάσματος και στα καταπολεμούμενα από το Spark EC ζιζάνια το Nortron 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με 200-250 κ.εκ./στρέμμα Spark EC.

\*\*Σε μίγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα (με την προϋπόθεση της χημικής συνδιαστικότητας των μιγμάτων) σε μειωμένες δόσεις και σύμφωνα πάντα με την πρακτική και τις οδηγίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

-Η μέγιστη ποσότητα Nortron 50 SC που επιτρέπεται να εφαρμοσθεί στο ίδιο χωράφι σε διάστημα 3 ετών είναι 200 gr/στρέμμα (=100 gr ethofumesate/στρέμμα).

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω υπερβολικής υγρασίας ή ξηρασίας, προσβολής από ασθένειες ή εχθρούς ή έχουν ζημιωθεί από προηγούμενες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Οι εφαρμογές που πραγματοποιούνται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 21 °C μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες εφαρμόστε το προϊόν αργά το απόγευμα.
3. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

|  |  |
|--|--|
| - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας | Δεν απαιτείται   |
| - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν  | Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν εννέα μήνες μετά την εφαρμογή του Nortron 50 SC στο χωράφι. Όργωμα σε βάθος 15-20 εκ. πρέπει να γίνεται πριν |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|  |  |
|--|--|
|  | την σπορά ή τη φύτευση.  |
| - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. | Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. Στην περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών. |

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

## ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH 208** Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.  
*«Ο χειριστής θα πρέπει να φοράει μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.»*  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμείνει, συμβουλευτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ'όλ'αυτά, εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα     | Ημέρες |
|---------------------|--------|
| Ζαχαρότευτλα        | -      |
| Κτηνοτροφικά τεύτλα | -      |
|                     |        |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

**Β**

Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την υπ' αρ. 117471/31-3-2008 Υπουργική απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7154 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NORTRON 50 SC όπως αυτή τροποποιήθηκε, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 26.01.2018).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 26.04.2018).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 26.04.2019).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 26.04.2019, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**