



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10-11-2016
Αριθ. πρωτ:11383/125397

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 Σπ. Λαούσης
Τηλέφωνο: 210 928 7211, 2109287224
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr
sdaousis@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς ABEE
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
 15125-Μαρούσι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.305 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CABRIO DUO 4/7.2 EC (δραστικές ουσίες: *pyraclostrobin* + *dimethomorph*) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *pyraclostrobin* και *dimethomorph*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.

8. Την με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β’/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας”.
10. Τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος (μέρη Α, Β και Γ) που αφορούσε την επέκταση της έγκρισης του προϊόντος, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Πορτογαλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο της ΕΕ, καθώς και τη σχετική απόφαση των αρχών της Πορτογαλίας για την επέκταση του φάσματος δράσης του προϊόντος (αριθμός έγκρισης στην Πορτογαλία 00196).
11. Το με αριθ. ΕΜΠ 881/10.9.14 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα σχόλιά του για την έκθεση αξιολόγησης που ετοίμασε η Πορτογαλία για διεύρυνση του φάσματος δράσης του σκευάσματος CABRIO DUO 4/7.2 EC στη Νότια Ζώνη της ΕΕ.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 3469/39050/29.3.13 σχετική αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΕΒΕ, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την με αριθ. 7994/88518/16.7.13 αίτησή της.
13. Την με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε την με αριθ. **60.305** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **CABRIO DUO 4/7.2 EC** (δραστικές ουσίες: pyraclostrobin + dimethomorph), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 92315/19.1.11 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 101978/1.11.11, 585/7017/20.1.12, 4330/48265/23.4.12, 10643/119200ΠΕ/10.3.15 και 3507/41222/19.06.15 Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παράγραφοι 5 και 13.2 της με αριθ. 92315/19.1.11 Απόφασής μας διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5		5.1 Φάσμα δράσης			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	200-250	250-400*	50-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κολοκύθι (θερμοκηπίου)	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη σχηματισμού των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου)	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250	-	80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες, εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (υπαίθρου)	Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημερες, εφόσον απαιτείται
Πατάτα	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	200-250	-	80-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερες, εφόσον απαιτείται
Κρεμμύδι (υπαίθρου)	Περωνόσπορος (<i>Peronospora</i>)	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8

	<i>destructor</i>)				εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	ημέρες, εφόσον απαιτείται
-Λυκοτρίβολο (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αρωματικά φυτά (υπαίθρου): Βασιλικός, Μαϊντανός, Θυμάρι, Δενδρολίβανο	Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) (<i>farinosa etc.</i>)	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Σκόρδο (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Σκόρδο (υπαίθρου) Μικρής Σημασίας Χρήση **	Αλτερνάρια (<i>Alternaria porri</i>)	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Αγκινάρα (υπαίθρου) Μικρής Σημασίας Χρήση **	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέχρι το 50% της ανάπτυξης των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

*Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις μικρής σημασίας χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές

- Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.
- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Οι χρήσεις στις καλλιέργειες Σκαρόλα (Υπαίθρου), Ανθοκράμβες - Μπρόκολο – Κουνουπίδι (Υπαίθρου), Κεφαλωτές Κράμβες-Λάχανο (Υπαίθρου), Σπανάκι και συναφή (Υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη ΣΕΑ.

Σκαρόλα (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 7 ημέρες
Ανθοκράμβες - Μπρόκολο (υπαίθρου) Κουνουπίδι (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria brassicae</i>)	150-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 7 ημέρες
Κεφαλωτές Κράμβες-Λάχανο (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i>	150-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση

	<i>brassicae</i>)				ανάπτυξη του καρπού.	πριν τη συγκομιδή 3 ημέρες
Σπανάκι και συναφή (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) (<i>farinosa etc.</i>)	200-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φαλλικής επιφάνειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι (υπαίθρου)	7
Σκόρδο (υπαίθρου)	7
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3
Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κολοκύθι (θερμοκηπίου)	1
Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου)	3
Μαρούλι (υπαίθρου), Λυκοτρίβολο (υπαίθρου)	7
Πατάτα (υπαίθρου)	3
Αγκινάρα (υπαίθρου)	3
Αρωματικά Φυτά (υπαίθρου): Βασιλικός, Μαϊντανός, Θυμάρι, Δενδρολίβανο	7

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 92315/19.1.11 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ