

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23-11-2016
Αριθ. πρωτ: 11983/130962

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρή
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60415 έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) COMET 20 EC (pyraclostrobin) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών Ουσιών
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Την αξιολόγηση της Ιταλίας, για την υπ' αριθμ 15961 άδεια διάθεσης στην αγορά για το όμοιο φυτοπροστατευτικό προϊόν RETENGO NEW από Ιούλιο 2016
8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5039/50906/ 16.04.2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60415 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **COMET 20 EC** η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 5026/50837/16-4-2014 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος:

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού		
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Τριτικάλε	Σκωριάσεις (καστανή: <i>Puccinia recondite</i> , κίτρινη: <i>Puccinia striiformis</i>) Ωίδιο (<i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>) Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> , <i>S. nodorum</i>) Φουζαρίωση (<i>Fusarium sp.</i>)	100-125	10-40	-	Συστήνεται η εφαρμογή του από την εμφάνιση του 5ου αδελφιού έως και το τέλος της άνθισης . Χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες	2
Κριθάρι	Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i>), Δικτυωτή κυλίδωση (<i>Pyrenophora teres</i>) Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Ωίδιο (<i>Blumeria graminis f. sp. hordei</i>)	100-125	10-40	-		2

Καλαμπόκι	Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium turcicum</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia sorghi</i>)	100	10-40	-	Από το στάδιο της επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την άνθηση της φόβης και την πλήρη εμφάνιση των σιγμάτων στον σπάδικα (BBCH 65)	1
Ηλίανθος	Φόμα (<i>Phoma macdonaldi</i>) Αλτερνάρια ⁽⁴⁾ (<i>Alternaria helianthi</i>) Ωίδιο ⁽⁴⁾ (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Θετική επίδραση στη φυσιολογία του φυτού	100	10-40	-	Συστήνεται μια προληπτική εφαρμογή, κατά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, στο χρονικό διάστημα από το 6 ^ο φύλλο μέχρι το στάδιο κατά το οποίο οι σπόροι στο μέσο της ταξιανθίας είναι χρώματος γκρι και έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος. Για να μεγιστοποιήσετε την θετική φυσιολογική επίδραση στην καλλιέργεια, συστήνεται η εφαρμογή να γίνει το αργότερο δυνατό (ύψος φυτού 80-100 εκατοστά).	1

Το COMET 20 EC έχει επίδραση στη φυσιολογία των φυτών των σιτηρών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής, ακόμη και σε συνθήκες απουσίας ορατών συμπτωμάτων της ασθένειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόστε το COMET 20 EC προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.
2. Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθένειας, σε υψηλές βροχοπτώσεις ή σε υψηλό ρυθμό αύξησης της βλάστησης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η υψηλότερη

δόση διατηρώντας ένα μεσοδιάστημα για τον επόμενο ψεκασμό ίσο με 21 ημέρες.

3. Συστήνεται η χρήση των όγκων του ψεκαστικού υγρού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια πλήρης και ομοιογενής κάλυψη της βλάστησης.
4. Στο καλαμπόκι, το COMET 20 EC έχει σημαντική δευτερεύουσα δράση στην Αλτερνάρια και στο Ωίδιο.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με τον κανονισμό 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε	35
Καλαμπόκι	Προσδιορίζεται από το τελικό στάδιο εφαρμογής
Ηλίανθος	21

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 60415 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) COMET 20 EC που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 5026/50837/16-4-2014 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ