

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.12.2016
Αριθ. πρωτ: 3118/36613

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσας
Τ.Κ. 15349, Ανθούσα Αττικής
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
CHEROKEE (δ.ο. chlorothalonil, cyproconazole, propiconazole)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
7. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων και της **propiconazole**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 533/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methyl-cyclopropene, **chlorothalonil**, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl και tribenuron.
9. Τη με αριθ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την με Αριθμό Έγκρισης 2110177 Απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CHEROKEE από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 7766/85619/26-7-2016 σχετική Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης που απεστάλη από την AAA της Γαλλίας (Anses).
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 3118/36613/24-3-2016 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CHEROKEE** της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60578
06.12.2016
31.01.2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

CHEROKEE
SE- Γαλακτώδες Αιώρημα

1.3 Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

chlorothalonil

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min. 98,5 % min

Χημική ομάδα

Χλωρονιτριλίων

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG CH 4002 - Basel Switzerland
--

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. GB Biosciences**
Greens Bayou, 2239 Haden Road
Houston, TX 77015, USA
- 2. SDS Biotech K.K.**
Yokohama Works, 8, Ebisu-cho, Kanagawa-ku
Yokohama, Japan
- 3. Jiangsu Xinhe Agrochemical Co. Ltd.**
No.19, Shanghai Road, Economic Development Zone,
XinYi City, Jiangsu Province, 226407 P.R.China

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **chlorothalonil**, όπως αυτές έχουν υποβληθεί είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.3 Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

cyproconazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min. 94% min

Χημική ομάδα

Τριαζόλες

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG
CH 4002 - Basel Switzerland

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Bayer (Schweiz) AG CropScience Produktion Muttentz**
Rothausstrasse 61,
4132, Muttentz, Switzerland
- 2. Saltigo GmbH (owned by the Lanxess Group)**
Rothausstrasse 61
51369, Leverkusen Germany

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **cyproconazole**, όπως αυτές έχουν υποβληθεί είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.3 Δραστική ουσία 3

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

propiconazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min. 93% min

Χημική ομάδα

Τριαζόλες

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG
CH 4002 - Basel Switzerland

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd**
28 Chengbei Road
Zhangjiagang
Jiangsu 215600, China
2. **Syngenta Crop Protection Monthey SA**
Route de l'Île au Bois
CH-1870 Monthey
Switzerland

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **propiconazole**, όπως αυτές έχουν υποβληθεί είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE

Λ.Ανθούσας
Τ.Κ. 15349, Ανθούσα Αττικής
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas AEBE

Λ.Ανθούσας
Τ.Κ. 15349, Ανθούσα Αττικής
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Protection AG
CH 4002 - Basel Switzerland

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Syngenta Grangemouth Manufacturing Center UK**
Grangemouth Works Earl's Road Grangemouth
Stirlingshire FK3 8XG Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Schirm GmbH standort Schönebeck**
Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schoenebeck/Elbe, Germany
3. **Phyteurop SA**
Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne
49260 Montreull-Bellay, France

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Syngenta Hellas AEBE**
Οινόφυτα Βοιωτίας
2. **Syngenta Grangemouth Manufacturing Center UK**
Grangemouth Works Earl's Road Grangemouth
Stirlingshire FK3 8XG Ηνωμένο Βασίλειο
3. **Schirm GmbH standort Schönebeck**
Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schoenebeck/Elbe, Germany
4. **Phyteurop SA**
Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne
49260 Montreull-Bellay, France

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

Cyproconazole 4.1% β/ο (50g/L)

Propiconazole 5.17 % β/ο (62.5g/L)

Chlorothalonil 31% β/ο (375g/L)

Βοηθητικές ουσίες : 59,73 % β/β

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ .

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250 κ.εκ., 500 κ.εκ, 1 λίτρο	• HDPE
2	Μπιτόνια	5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα	• HDPE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Προετοιμασία του διαλύματος: Γεμίστε το βυτίο με τα $\frac{3}{4}$ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε γάντια, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και συσκευή προστασίας ματιών κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων προετοιμασίας και χρήσης του σκευάσματος.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών στα σιτηρά. Το chlorothalonil είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών. Τα cyproconazole και protriconazole είναι διασυστηματικά μυκητοκτόνά της ομάδας των τριαζολών με προστατευτική, θεραπευτική δράση.</p>
----------	------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Σιτάρι	Σεπτορίωση <i>septoria spp</i> Σκωρίαση <i>Puccinia recondita</i>	200		10-50	Μια εφαρμογή στη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ/στρ από το στάδιο BBCH 31 ως το BBCH 65 ή	1
					Δυο σπαστές εφαρμογές στη δόση των 133κ.εκ /στρ μεταξύ του BBCH 31 και BBCH 39 και στη δόση 200 κ.εκ /στρ μεταξύ του BBCH 39 και BBCH 65.	2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κριθάρι	Ελμινθοσπόριο <i>Helminthosporium teres</i> Σκωρίαση <i>Puccinia hordei</i> Ρυνχοσπορίωση <i>Rhynchosporium secalis</i>	200		10-50	Μια εφαρμογή στη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ/στρ από το στάδιο BBCH 31 μέχρι το BBCH 59 ή	1
					Δυο εφαρμογές στη δόση των 133 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 31 και BBCH 39 και 200 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 39 και BBCH 65.	2
Σίκαλη	Σκωρίαση <i>Puccinia spp.</i>	200		10-50	Μια εφαρμογή στη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ/στρ από το στάδιο BBCH 31 μέχρι το BBCH 59 ή	1
					Δυο εφαρμογές στη δόση των 133 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 31 και BBCH 39 και 200 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 39 και BBCH 65.	2
Τριτικάλε	Σεπτορίωση <i>septoria spp.</i> Σκωρίαση <i>Puccinia spp.</i>	200		10-50	Μια εφαρμογή στη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ/στρ από το στάδιο BBCH 31 μέχρι το BBCH 65 ή	1
					Δυο εφαρμογές στη δόση των 133 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 31 και BBCH 39 και 200 κ.εκ/στρ μεταξύ του BBCH 39 και BBCH 65.	2
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <u>Παράρτημα II</u>						

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Για τον περιορισμό ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και σε εναλλαγές με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.
7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.
9	Εικονογράμματα κινδύνου	<p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p>  <p>GHS07 GHS08 GHS09</p>
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H351 Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. H361d Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις</p>
11	Δηλώσεις	P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

προφύλαξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς / εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατεύεται τα αρθρώποδα μη στόχους, αφήστε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

“Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην εφαρμόζεται το σκεύασμα Cherokee ή κάποιο άλλο σκεύασμα που να περιέχει chlorothalonil σε ετήσια δόση μεγαλύτερη των 1250γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο και μην ξεπερνάτε τα 500γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο για μία εφαρμογή στα στάδια BBCH 31-39 και τα 750 γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο για μια εφαρμογή που ξεκινά στο στάδιο BBCH 39.”

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε	49
	Κριθάρι	42

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσετε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- μια μέθοδο, με την πιστοποίησή της μέσω πολλών εργαστηρίων, για τον προσδιορισμό της χλωροθαλονίλης στα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
- δεδομένα επιλεκτικότητας του σκευάσματος στη σίκαλη και το τριτικάλε,
- τρέχοντα στοιχεία για το κριθάρι της ζυθοποιίας

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ