

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.12.2016  
Αριθ. πρωτ: 6661/74452

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑΛΙΑ SpA  
Δια μέσου του αντιπροσώπου της  
ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ  
Β. Κωνσταντίνου 32,  
Τ.Κ. 19400, Κορωπί Αττικής  
E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
**CLORTOSIP 50 SC (δ.ο. chlorothalonil)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 533/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methyl-cyclopropane, **chlorothalonil**, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl και tribenuron.
8. Τη με αριθ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την με Αριθμό Έγκρισης 8300243 Απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FONGIL FL από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 8248/90152/08-08-2016 σχετική Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης που απεστάλη από την AAA της Γαλλίας (Anses).
11. Τις υπ' αρ. πρωτ. 6661/74452/29-6-2016 και 10892/119528/26-10-2016 αιτήσεις της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας OXON ITALIA, SpA.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CLORTOSIP 50 SC** της εταιρείας **OXON ITALIA SpA** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60577</b>
<b>06.12.2016</b>
<b>31.10.2018</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>CLORTOSIP 50 SC</b>
Πυκνό εναιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>chlorothalonil</b>
-----------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

<b>min. 98,5 % min</b>
------------------------

Χημική ομάδα

Χλωρονιτριλίων
----------------

Παρασκευαστής

<b>OXON ITALIA, SpA</b> <b>Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy</b>
---

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>OXON ITALIA, SpA</b> Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>chlorothalonil</b> , όπως αυτές έχουν υποβληθεί είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
---

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**OXON ITALIA, SpA**

Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

Τηλ.: +39 02 35378235

Fax: +39 (02) 3390 275

E-mail: [CPalladini@oxon.it](mailto:CPalladini@oxon.it)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

A. **OXON ITALIA, SpA**

Ον/νυμο: Chiara Palladini

Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

Τηλ.: +39 02 35378235, Fax: +39 (02) 3390 275

E-mail: [CPalladini@oxon.it](mailto:CPalladini@oxon.it)B. **SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**

Ον/νυμο: Απόστολος Σαμούδης

Βασ. Κωνσταντίνου 32

Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139

E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**

Βασ. Κωνσταντίνου 32

Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139

E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SIPCAM SpA.**

Via Vittorio Veneto 81

26857, Salerano S/L Lambro (LO), Italy

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**SIPCAM SpA, Ιταλία**

Via Vittorio Veneto 81,

26857 Salerano Sul Lambro (LO), Italy

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM SpA, Ιταλίας**

Via Vittorio Veneto 81,

Salerano sul Lambro (LO), Italy

2. **SIPCAM Inagra SA, Ισπανίας**

Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia),

Spain

3. **ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.**

Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής

4. **ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**

Νέα Σάντα Κυλκίς, Τ.Κ. 56403

5. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**

Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δραστική ουσία 50 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 59,6 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ .

**2**

**Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	100κ.εκ., 150κ.εκ., 200κ.εκ., 300κ.εκ., 400 κ.εκ., 500κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα	Πολυαιθυλένιο
2.	Μπιτόνι	5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα	Πολυαιθυλένιο

**3**

Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκασμός.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** -

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** Οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την διάρκεια όλων των φάσεων προετοιμασίας (ανάμειξης/ φόρτωσης) και εφαρμογής του σκευάσματος.

**4**

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών, που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των спорίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρ.		
Σιτάρι	<b>Σεπτορίωση</b> <i>Septoria spp.</i>	150	300	50	Μέχρι του σταδίου αρχής κεφαλώματος (έως BBCH 51)	1/έτος
		100	200	50	<b>1<sup>η</sup></b> Από το στάδιο όταν ο πρώτος κόμβος είναι τουλάχιστον 1 εκ. πάνω από τον κόμβο του αδελφώματος μέχρι του σταδίου εμφάνισης της σημαίας (από BBCH 31 έως BBCH 39)	2/έτος
		150	300	50	<b>2<sup>η</sup></b> Από το στάδιο της σημαίας μέχρι την αρχή του κεφαλώματος (από BBCH 39 έως BBCH 51)	
Σπαράγγι (εκτός των πράσινων σπαραγγιών)	<b>Στεμφύλιο</b> <i>(Stemphylium vesicarium)</i>	500	1.666,7	30	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	1 φορά ανά 3 χρόνια
Αγγούρι (Υ - Θ)	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i> <b>Μυκοσφαιρέλα-Κηλίδωση φύλλων</b> <i>(Mycosphaerella citrullina)</i> <b>Αλτερναρίωση</b> <i>(Alternaria alternata)</i>	200	200-250	80 Έως 100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3/έτος
Αγγουράκι (Υ - Θ)	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i> <b>Ανθράκωση</b> <i>(Colletotrichum sp)</i> <b>Κλαδοσπορίωση</b> <i>(Cladosporium fulvum)</i>	200	200-250	80 Έως 100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3/έτος
Μπιζέλι (νωπό - χωρίς λοβό)	<b>Ασκοχύτωση</b> <i>(Ascochyta blight),</i> <b>Βοτρυτής</b> <i>(Botrytis cinerea)</i> <b>Σκληρωτινίαση</b> <i>(Sclerotinia spp)</i>	200	400	50	Μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 69)	1/έτος

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εαρινά και Χειμερινά κτηνοτροφικά μπιζέλια	<b>Ανθράκωση</b> ( <i>Colletotrichum sp</i> ) <b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> ) <b>Σκληρωτινίαση</b> ( <i>Sclerotinia spp</i> )	200	400	50	Εφαρμογή στην αρχή ή στο τέλος της ανθοφορίας	1/έτος
Πατάτα	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150	150-185	80 Έως 100	Από το στάδιο έναρξης σχηματισμού των κονδύλων (από στάδιο BBCH 40 έως BBCH 69)	1/ έτος
Τομάτα (Υ - Θ)	<b>Αλτερνάρια</b> ( <i>Alternaria solani</i> ), <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) <b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> ), <b>Βοτρύτης</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> ) <b>Σκληρωτινίαση</b> ( <i>Sclerotinia spp</i> )	200	200-250	80 Έως 100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	1/ έτος (σε Υπαίθρια)
						3/ έτος (σε Θερμοκήπιο)
<b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <u>Παράρτημα II</u></b>						

**Παρατηρήσεις**

1. Για τις καλλιέργειες:: αγγούρι, αγγουράκι και τομάτα, επιτρέπεται υπό κάλυψη αποκλειστικά με τη βοήθεια αυτόματου μηχανήματος.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για τον περιορισμό ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και σε εναλλαγές με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<b>9</b>	Εικονογράμματα κινδύνου	<p><b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b></p>  <p><b>GHS05    GHS07    GHS08    GHS09</b></p>
<b>10</b>	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p><b>H315</b> Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.  <b>H317</b> Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  <b>H318</b> Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  <b>H332</b> Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  <b>H335</b> Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  <b>H351</b> Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις</p>
<b>11</b>	Δηλώσεις	<p><b>P102+405:</b> Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p>

προφύλαξης

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

- P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς / εκνεφώματα.
- P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
- P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
- P273:** Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
- SP1:** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- SPe1:** Για τις χρήσεις σε ντομάτες υπαίθρου μην το εφαρμόζετε σε ετήσια δόση μεγαλύτερη από 1x100 γραμμάρια/στρέμμα.
- SPe1:** Για τις χρήσεις σε νωπά μπιζέλια (χωρίς λοβό) και χειμερινά – εαρινά κτηνοτροφικά μπιζέλια μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που να περιέχει chlorothalonil σε ετήσια δόση μεγαλύτερη από 1x100 γραμμάρια/στρέμμα.
- SPe1:** Για τις χρήσεις σε πατάτες μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που να περιέχει chlorothalonil σε ετήσια δόση μεγαλύτερη από 1x75 γραμμάρια/στρέμμα. Μην το εφαρμόζετε πριν το στάδιο BBCH 40.
- SPe1:** Για τις χρήσεις σε σιτάρι μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που να περιέχει chlorothalonil σε ετήσια δόση μεγαλύτερη από 1x75 γραμμάρια/στρέμμα στην περίπτωση εφάπαξ εφαρμογής. Στην περίπτωση πολλαπλών εφαρμογών, μην εφαρμόζετε συνολική ετήσια δόση μεγαλύτερη από 125 γραμμάρια/στρέμμα. Μην υπερβαίνετε τα 50 γραμμάρια/στρέμμα για εφαρμογή στα στάδια BBCH 31-39 και τα 75 γραμμάρια/στρέμμα για εφαρμογή από το στάδιο BBCH 39 και έπειτα.
- SPe3:** Για να προστατεύεται τα αρθρώποδα μη στόχους, εκτός των μελισσών, αφήστε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
- SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες: σιτάρι, πατάτες, τομάτες, **20 μέτρων** για τις καλλιέργειες νωπά μπιζέλια (χωρίς λοβό), χειμερινά –εαρινά κτηνοτροφικά μπιζέλια, αγγούρια, αγγουράκια και **50 μέτρων** για την καλλιέργεια του σπαραγγιού.
- EUH401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επίμονων συμπτωμάτων συμβουλευτείτε τον γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται παρέχεται τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

**P302 + P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

**P333 + P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

*Περιέχει Χλωροθαλονίνη*

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Σιτάρι, Μπιζέλι (χωρίς λοβό)	Μη εφαρμόσιμο
	Σπαράγγι	3
	Αγγούρι (Υ+Θ)	7
	Αγγουράκι (Υ+Θ)	7
	Χειμερινά και εαρινά Κτηνοτροφικά μπιζέλια	35
	Πατάτα	30
	Τομάτα (Υ+Θ)	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας, ψύξης και το άμεσο ηλιακό φως.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**