



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12-12-2016
Αριθ. πρωτ: 9686/105532

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Nissan Chemical Europe SARL Γαλλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.,
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
153 43 - Αγία Παρασκευή)

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl).
 2. Ανάκληση της με αριθ. 7402 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 7402 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl), που χορηγήθηκε με την αριθ. 84743/21.4.89 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 188126/3.9.10, 95011/23.3.11 (ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-ΦΡ), 6581/68133/1.10.12 (ΑΔΑ: Β4ΤΝΒ-Τ3Α) και 3614/39237/26.8.14 (ΑΔΑ: ΩΑ6ΓΒ-ΝΟ6) Αποφάσεις μας.

10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 5839/61496/28.5.12 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε., ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Nissan Chemical Europe S.A.R.L. Γαλλίας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 9686/105532/23.9.16 αίτησή της.
12. Την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Γαλλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο CIRCABC, στη διαμόρφωση της οποίας συμμετείχε και η ΑΑΑ κάνοντας σχόλια επί του προσχεδίου αυτής.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.191
12-12-2016
30-11-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

TARGA 5 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Quizalofop-P-ethyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95% (β/β) min
Χημική ομάδα	Αρυλοξυφαινοξυ-αλκανοϊκά οξέα
Παρασκευαστής	Nissan Chemical Industries Ltd., Agricultural Division Kowa Hitotsubashi Building 7-1, 3-chome Kanda-Nishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Ιαπωνία <u>με εκπρόσωπο στην ΕΕ την εταιρεία:</u> Nissan Chemical Europe SARL Γαλλίας
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Nissan Chemical Industries, Ltd. Onoda Plant, 6903-1, Oaza Onoda Sanyo-Onoda, Yamaguchi 756-0093, Ιαπωνία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι εμπιστευτική πληροφορία. Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

<p>Nissan Chemical Europe S.A.R.L. Parc d' Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee 69370 St-Didier au Mont d' Or, Γαλλία Τηλ: +33 (0) 4 37 64 40 21, Fax: +33 (0) 4 37 64 68 74 E-mail: masanori.kai@nissanchem-eu.com</p>

<p>με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία: Greenfarm Χημικά Α.Ε. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6990932, Fax : 210 6990862 E-mail: info@gr.nufarm.com</p>
--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 6990932, Fax: 210 6990862
E-mail: info@gr.nufarm.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
Parc d' Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee
69370 St-Didier au Mont d' Or, Γαλλία
Τηλ: +33 (0) 4 37 64 40 21, Fax: +33 (0) 4 37 64 68 74
E-mail: masanori.kai@nissanchem-eu.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων :

- Arysta Life Science Europe Africa Middle-East**
Route d' Artix -BP 80-64150, Nogueres, Γαλλία
- Chimac S.A.**, Rue de Renoy, 26/2 B-4102,
Rue Antonie-Laurent de Lavoiser, Zone Industrielle Ougree-Βέλγιο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Arysta Life Science Europe Africa Middle-East**
Route d' Artix -BP 80-64150, Nogueres, Γαλλία
- Chimac S.A.**, Rue de Renoy, 26/2 B-4102,
Rue Antonie-Laurent de Lavoiser, Zone Industrielle Ougree-Βέλγιο
- K&N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ**, ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 75022-Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl 5% β/ο, βοηθητικές ουσίες 94,5% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ., 1 λίτρου, 3, 5, 10 και 20 λίτρων	PE / PA
2	Φιάλη	500 κ.εκ., 1 λίτρου, 3, 5, 10 και 20 λίτρων	PE / EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με προτεινόμενη πίεση τουλάχιστον 2 bar.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα $\frac{3}{4}$ με νερό, προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: Αδειάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού, αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ, καθαρίστε τα και ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό τρεις φορές. Γεμίστε με καθαρό νερό το 10% του ψεκαστικού δοχείου και θέστε σε λειτουργία το σύστημα καθαρισμού εφόσον υπάρχει. Κυκλοφορήστε το νερό μέσα από την αντλία και τα άλλα μέρη για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αδειάστε το ψεκαστικό και επαναλάβετε τη διαδικασία, αδειάζοντας το νερό πλύσης περνώντας το από την αντλία, τα λάστιχα και τους αυλούς. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο δυνατό όγκο νερού. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα και μπεκ. Τα νερά του ξεπλύματος από κάθε στάδιο πρέπει να συλλέγονται, και να ψεκάζονται στο άκρο του αγρού που έγινε η εφαρμογή, ή να διατίθενται με ασφάλεια.

Συνδυαστικότητα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού λτ. / στρ.	κ.εκ./στρ.		
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό ΟΣΠΡΙΑ: Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: Βαμβάκι, Σόγια ΠΑΤΑΤΑ	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150-300		
Ηλιάνθος	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας.	
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150		
Ελαιοκράμβη	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150		
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150		
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150-300		

Παρατηρήσεις:**1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Ετήσια ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Avena sp.* (Αγριοβρώμη), *Bromus sp.* (Βρόμος), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa phyllorogon* (Μουχρίτσα), *Hordeum vulgare* (Κριθάρι), *Lolium sp.* (Ηρες), *Oryza rufipogon*, *Phalaris sp.* (Φαλαρίδες), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum aestivum* (Σιτάρι).

Πολυετή ζιζάνια: *Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ρίζωμα).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια ζιζάνια: *Setaria sp.* (Σετάρειες), *Poa annua* (ετήσια Πόα).

Πολυετή ζιζάνια: *Cynodon dactylon* (Αγριάδα).

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα

2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.

3. Χρόνος εφαρμογής:

Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και 125 .εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις.

Η *Poa annua* καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα.

4. Μη ψεκάζετε τον Ηλιάνθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.

5. Μη ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

6. Μη ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα.

7. Κατά την εφαρμογή του **Targa 5 EC** σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλιάνθου, να μην αναμειγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<ul style="list-style-type: none"> - Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. - Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. - Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. - Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. - Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. - Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. - Μη χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Targa 5 EC.
--	--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν απαιτείται

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Δεν απαιτείται

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.
Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

- Η μέγιστη δόση στον ηλιάνθο θα πρέπει να είναι 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
- Στις καλλιέργειες φασόλια με λοβό και μπιζέλια χωρίς λοβό ενδέχεται να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Γι' αυτό συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

9 Σήμανση σκευάσματος:



GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
KINΔYNOΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
“Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την εφαρμογή”.
“Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό”.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe8 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι ≥ 400 κ.εκ /στρέμμα και **5 μέτρων** από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι < 400 κ.εκ. /στρέμμα.

12 Πρώτες βοήθειες–αντίδοτο:

Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, καλέστε ιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ιατρό.
Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία (απομόλυνση – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με το Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό	21
Ζαχαρότευτλα	60
Όσπρια (Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), Ηλιάνθος, Πατάτα, Βαμβάκι	45
Ελαιοκράμβη, Σόγια	90

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύστε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-30°C. Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών: Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. 7402 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl), που χορηγήθηκε με την αριθ. 84743/21.4.89 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 188126/3.9.10, 95011/23.3.11 (ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-ΦΡ), 6581/68133/1.10.12 (ΑΔΑ: Β4ΤΝΒ-Τ3Α) και 3614/39237/26.8.14 (ΑΔΑ: ΩΑ6ΓΒ-ΝΟ6) Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ