

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 19 - 12 - 2016  
Αριθ. πρωτ: 13118/142055**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)**

**Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil)  
Β. Ανάκληση της με αριθ. 6803 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SCALA 40 EC (pyrimethanil)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών Ουσιών.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
7. Την αξιολόγηση και την επανέγκριση της Ιταλίας, για την υπ' αριθμ. 8934 άδεια διάθεσης στην αγορά στο όμοιο φυτοπροστατευτικό προϊόν SCALA από Σεπτέμβριο 2015.

8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1266/144827/ 23.12.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με ακόλουθα στοιχεία:

**1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<p style="text-align: center;"><b>60586</b> <b>19/12/2016</b> <b>30/04/2019</b></p>
---

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

SCALA 40 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Pyrimethanil</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97.5 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ανιλινοπυριμιδίνες
Παρασκευαστής	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7, 8055 Zuerich, Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1) Bayer CropScience AG D-41538, Dormagen, Γερμανία  2) BASF AGRI production 76410 St.-Aubin-les-Elbeuf 7969-FRA-001 France
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 1266/144827/ 23.12.2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον ο κάτοχος δεν έχει έδρα στη χώρα)

-

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V.,  
Arnhem (NL) - Zuerich Branch  
Im Tiergarten 7,  
8055 Zuerich,  
Ελβετία

5

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος του
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
- 1) BASF Agri-Production S.A.S.  
Rue Jacquard  
Z.I. Lyon Nord  
F-69727 Genay Cedex - B.P. 73, Γαλλία
  - 2) Schirm GmbH Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία
  - 3) BASF Espanola S.L.  
Carretera N-340, km 1.156  
43006 Tarragona, Ισπανία
  - 4) Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel, Γερμανία
  - 5) Provalis S.A. - Saint Marcel - 13367 Marseille, Γαλλία
  - 6) CMPA S.A. – Z.I. 34500 Bèziers, Γαλλία
  - 7) Isagro S.r.l. - Aprilia (LT), Ιταλία;
  - 8) AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ), Ιταλία
  - 9) Zapi Industrie Chimiche S.p.A Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD), Ιταλία
-

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord F-69727 Genay Cedex - B.P. 73, France</li> <li>2. BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη</li> <li>3. Schirm GmbH Standort Schönebeck Geschwister-Scholl-Strasse 127 39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία</li> <li>4. BASF Espanola S.L. Carretera N-340, km 1.156 43006 Tarragona, Ισπανία</li> <li>5. Bayer CropScience GmbH – Wolfenbüttel, Γερμανία</li> <li>6. Provalis S.A. - Saint Marcel - 13367 Marseille, Γαλλία</li> <li>7. CMPA S.A. – Z.I. 34500 Bèziers, Γαλλία</li> <li>8. Isagro S.r.l. - Aprilia (LT), Ιταλία;</li> <li>9. AgriFormula S.r.l. – Paganica (AQ), Ιταλία</li> <li>10. Zapi Industrie Chimiche S.p.A Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD), Ιταλία</li> </ol>
---	--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

<p>Δραστική ουσία: pyrimethanil 40 % β/ο</p> <p>Βοηθητικές ουσίες 62.4 % β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1266/144827/ 23.12.2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ</p>
---

**2** Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100, 150, 200, 250, 300, 400, 750 κ.εκ., 1 λίτρο, 1,5 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

**3**

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Όλος ο εξοπλισμός του ψεκασμού, καθώς και τα μολυσμένα ρούχα, θα πρέπει να πλένονται με νερό ή κάποιο αραιό απορρυπαντικό διάλυμα και να ξεπλένονται τρεις φορές. Το ξέπλυμα του ψεκαστήρα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του Scala® 40 SC για να αποφευχθεί η δημιουργία υπολειμμάτων στα τοιχώματα του βυτίου, στα φίλτρα, τα ακροφύσια και τις σωληνώσεις. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 1100°C για 2 sec.

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

**Συνδυαστικότητα:** Το Scala® 40 SC δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης ή σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl-Al), ασβέστιο ή μαγνήσιο. Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα σκευάσματα, συστήνεται η χρήση αναδευτήρα. **Προφυλάξεις για τους χειριστές:**

Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, της φόρτωσης και της εφαρμογής να φοράτε κατάλληλα γάντια.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

**4**

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των ανιλνοπυριμιδινών, με δράση κυρίως κατά του βοτρώτη του αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς. Η βιολογική δράση του Scala® 40 SC στους ευαίσθητους παθογόνους μύκητες εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της έκκρισης υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δράσης, το Scala® 40 SC είναι αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδοκτόνα. Όσον αφορά στο φουζικλάδιο, η δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την προσβολή).

**5**

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά, Αχλαδιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i> )	110-150	75-100	150	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Scala® 40 SC μπορεί να	4/7-10



					μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο.	
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Δευτερογενείς προσβολές από <i>Aspergillus</i> spp. και <i>Penicillium</i> spp.	200-250	200	100-125	Κάνετε εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του βοτρύτη, δηλαδή, στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε μια καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.	1/-
Αμπέλι (επιτραπέζιο)						3/14
Φράουλα (αγρού)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200-250	150-200	100-125	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/7-14
Φράουλα (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	2/7-14
Μαρούλι Σκαρόλα (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστητική ανάπτυξη. Καλύψτε με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά	2/10-14

					φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος.	
Τομάτα, Μελιτζάνα (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Πιπεριά (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι) (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Καρότο (αγρού)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria dauci</i> ) Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	200	200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων.	2/10-14
Κρεμμύδι (αγρού)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis spp.</i> )	200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων.	3/10
Φασολάκι (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150-200	150-200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	2/10-14
Κυκλάμινο (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> )	150-225	100-150	-	Κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/7-10
Παρατηρήσεις: Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <a href="#">Παράρτημα II</a> .						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την ορθή στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας, συνιστάται ο περιορισμός του μέγιστου αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με Scala® 40 SC σε αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα του φάσματος δράσης και η χρήση του Scala® 40 SC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-

τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των

καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια


στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στη περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή πριν περάσουν 24 ώρες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Όταν το Scala® 40 SC εφαρμόζεται σε προστατευμένη καλλιέργεια (θερμοκήπιο) και με σχετική υγρασία άνω του 80%, απαιτείται αερισμός του χώρου για να αποφευχθεί πιθανή εκδήλωση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

**9** Σήμανση  
σκευάσματος:



**10** Φράσεις H

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Φράσεις P

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διατηρείτε τη συσκευασία καλά κλεισμένη.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά και καλλωπιστικά φυτά.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του, ή έχει σπασμούς

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	56
Αμπέλι	21
Φράουλα (Α+Θ)	3
Μαρούλι, Σκαρόλα (Α+Θ)	14
Τομάτα, Μελιτζάνα(Α+Θ), Πιπεριά (Θ)	3
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ)	3
Καρότο (Α)	14
Κρεμμύδι (Α)	14
Φασολάκι (Θ)	14
Κυκλάμινο (Α+Θ)	Δ.Ε.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B**

Ανακαλούμε τη με αριθ. 6803 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SCALA 40 SC και συγκεκριμένα:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι την (20-03-2017).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης μέχρι την (19-06-2017).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες μέχρι την (18-06-2018).
4. Για τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (18-06-2018) η ευθύνη και οι δαπάνες διαχείρισης βαρύνουν τον κάτοχο της έγκρισης.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

## Γ

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**