



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 4 - 1 - 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 10436/114112

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ

Λ.Ανθούσας
 15349 Ανθούσα Αττικής
 Τ.Κ.15349

E-mail:

voula.kalliakaki@syngenta.come-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ:

Α Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (δ.ο. S-metolachlor+ Terbutylazine).

Β. Ανάκληση της με αριθμό 7727 άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των

οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών s-metalchlor
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας terbuthylazine.
8. Την από 20/7/2016 αξιολόγηση του από την εισηγήτρια χώρα Πορτογαλία.
9. Την με αρ. πρωτ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
10. Τις με αρ. πρωτ. . 13683/159795/23/12/2013 και 10436/114412/14-10-2016 αιτήσεις της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE** της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70194
4-1-2017
31 - 7 - 2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE

1.2.β Μορφή:

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Terbuthylazine
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % min β/ο
Χημική ομάδα	ομάδα τριαζίνες
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): -Syngenta Crop Protection Inc. 3905 Highway 75 River Road, PO Box 11 St. Gabriel, LA 70776 USA -OXON Italia SpA Strada Prov.le Km 2.6 27030 Mezzana Bigli Italy
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ. . 13683/159795/23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	S-metolachlor
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96 % min β/ο
Χημική ομάδα	ομάδα χλωροακεταμίδια
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG Switzerland

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): CABB AG CH-4133 Pratteln Switzerland
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αρ. πρωτ. 13683/159795/23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττική
ΑΜΕ
Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττική
ΑΜΕ:
Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Syngenta Production France S.A.S.
Usine d`Aigues-Vives
Route de la Gare
B.P. 1
F 30670 Aigues-Vives
France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
- Syngenta Hellas AEBE
Οινόφυτα Βοιωτίας
-Syngenta Production France S.A.S.
Usine d`Aigues-Vives
Route de la Gare
B.P. 1
F 30670 Aigues-Vives
France

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:
S-metolachlor: 31,25% β/ο +
Terbuthylazine: 18,75% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 51,52% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αρ. πρωτ. . 13683/159795/23/12/2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Part C της αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	1 λίτρο, 5, 10 και 20 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2.	Μπιτόνια	120 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες**

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 20-30 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών (είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε καθαρό νερό).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, μάσκα, ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση, κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κατά την εφαρμογή του σκευάσματος και όταν έρχεστε σε επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και τον ηλιάνθο. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών. Το terbutylazine δρα ως παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ηλίανθος	Ευαίσθητα: -Βλήτα (<i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Amaranthus blitoides</i>)	400	--	20-30	Προφυτρωτικά (BBCH 00-11)	1 εφαρμογή
Αραβόσιτος	-Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) -Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) - Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>) -Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) -Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) -Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) -Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleracea</i>) -Σετάρια (<i>Setaria viridis</i> , <i>Setaria verticilata</i>) -Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) -Βέλιουρας (από σπόρο) (<i>Sorghum halepense</i>) -Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) Μετρίως ευαίσθητα: - Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>)	400- 450	--	20-30	α) Προσπαρτικά σε ξηρό έδαφος με ενσωμάτωση μέσα σε μία δύο ημέρες (3-5 εκ.). Η εφαρμογή αυτή προτιμάται σε περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση. β) Προφυτρωτικά (1-4 ημέρες μετά την σπορά αλλά πριν το φύτευμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων). (BBCH 00-10)	

Ηλίανθος	Ευαίσθητα: -Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) -Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Amaranthus blitoides</i>)	400	--	20-30	Μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο του 4 ^{ου} φύλλου (BBCH 11-14)
Αραβόσιτος	-Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) -Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleracea</i>) -Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) -Σετάρια (<i>Setaria verticilata</i>) Μετρίως ευαίσθητα: -Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>) -Σετάρια (<i>Setaria viridis</i>) -Βέλιουρας (από σπόρο) (<i>Sorghum halepense</i>) -Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) -Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) --Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) -Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>)	350- 400	-	20-30	Μεταφυτρωτικά έως το 4 ^ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14), ή όταν οι μουχρίτσες και τα άλλα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων ενώ τα πλατύφυλλα είναι σε στάδιο 1-3 φύλλων.

Παρατήρηση

1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε βαριά εδάφη ή σε υψηλούς πληθυσμούς ζιζανίων.
2. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
3. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα συνίσταται πότισμα σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά αραβόσιτου και σόργου.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας ή σε πολύ φτωχά εδάφη να μη σπέρνονται χειμερινά σιτηρά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε προστατευτικά υποδήματα, γάντια, μάσκα, ολόσωμη φόρμα.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Μπορεί να εμφανιστούν ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Προσοχή

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει S-metolachlor και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / Μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPε3:, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων τα 5 ναι είναι φυτικές ζώνες ανάσχεσης.

«ΕUΗ401-Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως.»

12 Πρώτες βοήθειες -

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Αντίδοτο	<p>Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:</p> <p>Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)</p> <p>P302/352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε</p> <p>P305/351/338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.</p> <p>.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.</p> <p>ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377</p>
----------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Καλαμπόκι Ηλιάνθος	Δεν ορίζεται -(καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής).

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B **Ανακαλούμε** τη με αριθ. **7727** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **116858/12-3-2008** Απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (έως τις 4-4-2017).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 4-7-2017).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 4-7-2018).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 4-7-2018 , θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού

Γ**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ