



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

31 - 1 - 2017

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 9731/106065 π. ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ.Κώδ. : 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161Προς: Dow AgroSciences Export SAS
Γαλλίας
Δια μέσου της εταιρείας
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
e-mail: vellis@efthymiadis.gre-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PINDAR (δ.ο. Penoxsulam + Triclopyr)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μάϊου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών Penoxsulam.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 878/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Αυγούστου 2014 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης των δραστικών ουσιών triclopyr.
8. Την με αριθμό 16580 έγκριση της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας καθώς και τη σχετική αξιολόγηση.
9. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7384/81037/1-7-2013 και 9731/106065/29-6-2016 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PINDAR** της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70198
31-01-2017
30-4-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

PINDAR
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Penoxsulam
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Penoxsulam: 980 g/kg Min
Χημική ομάδα	triazolopyrimidine sulfonamides

Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville rd., Indianapolis, 46268 ΗΠΑ <u>Διεύθυνση στην Ευρώπη:</u> Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία, 371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne Γαλλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): The Dow Chemical Company Michigan Division Midland, Michigan 48667-0001- ΗΠΑ Τηλ.: (001) 989-636-3736 Facsimile (001) 989-638-3907 Contact: Plant Production Leader (Superintendent)
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Penoxsulam όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7384/81037/1-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Triclopyr
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Triclopyr 960 g/kg min (as triclopyr-butotyl ester)
Χημική ομάδα	Pyridine
Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville rd., Indianapolis, 46268 ΗΠΑ <u>Διεύθυνση στην Ευρώπη:</u> Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία, 371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): The Dow Chemical Company Michigan Division Midland, Michigan 48667-0001- ΗΠΑ Τηλ.: (001) 989-636-3736 Facsimile (001) 989-638-3907 Contact: Plant Production Leader (Superintendent)
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Triclopyr όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7384/81037/1-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Dow AgroSciences Export SAS
371 Rue Ludwig Van Beethoven
06560 Valbonne, Γαλλίας
Contact Person : Mrs. Fannie Tsali
Τηλ. +33 493 956127
Fax: +33 493 9565 95
e-mail: ftsali@dow.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: vellis@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow	AgroSciences	LLC
9330	Zionsville	rd.,
Indianapolis, 46268		
ΗΠΑ		
<u>Διεύθυνση στην Ευρώπη:</u>		
Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία,		
371, rue Ludwig van Beethoven – 06560		
Valbonne Γαλλία		

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

<p>1) Dow Agro Sciences ITALIA SRL S S 11, Km. 190.2 24050 Mozzanica, Ιταλία. Telephone: 39-0363324324 Contact: Marano, Carmelo (site leader) Email: cmarano@dow.com</p> <p>2) Dow AgroSciences S.A.S. France 8 Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim, Γαλλία Τηλ.: +33 388535353 (Reception) Contact: the site leader</p> <p>3) Diachem S.p.A S.S. Padana Superiore, Km 185 24043 Caravaggio (BG), Ιταλία Τηλ. +39 0363 3556 x 11 Contact Pietro Casti Email: Pietro.casti@diachemagro.com</p>

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

<p>1) Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022</p> <p>2) Dow Agro Sciences ITALIA SRL S S 11, Km. 190.2 24050 Mozzanica, Ιταλία</p> <p>3) Dow AgroSciences S.A.S. France 8 Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim, Γαλλία</p> <p>4) Diachem S.p.A S.S. Padana Superiore, Km 185 24043 Caravaggio (BG), Ιταλία</p> <p>5) Torre S.r.l. Torrenieri, Montalcino (Siena), Ιταλία</p>
--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:
Penoxsulam 1,6% β/ο (=16 g/l)
Triclopyr 12% β/ο (=120 g/l)
σε μορφή Triclopyr-butotyl 16,7% β/ο (=167 g/l)
Βοηθητικές ουσίες 80,976 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7384/81037/1-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Πορτογαλίας.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	-Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες, Δοχεία, Βαρέλια	250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ., 1 λίτρο, 1.25 λίτρα, 1.5 λίτρα, 2 λίτρα, 2,5 λίτρα, 3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 3.75 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 6 λίτρα, 7.5 λίτρα, 10 λίτρα, 12 λίτρα, 15 λίτρα, 20 λίτρα, 25 λίτρα, 50 λίτρα και 100 λίτρα	PET / F-HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή με ομοιόμορφο, καθολικό ψεκάσμο φυλλώματος, στην καλλιέργεια του ρυζιού με 15-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

α) Εφαρμογή είτε σε αποξηραμένα «τηγάνια»: εφαρμόστε το **PINDAR** αμέσως μόλις ο ορυζώνας έχει αποστραγγιστεί και κατακλύστε πάλι 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή.

β) Εφαρμογή είτε σε ορυζώνες που έχουν σπαρθεί σε ξηρό έδαφος: εφαρμόστε το **PINDAR** σε ξηρό έδαφος 1-2 ημέρες πριν κατακλύσετε με νερό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκάσμου. Ψεκάστε αμέσως μετά την προετοιμασία του διαλύματος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας κατά την εφαρμογή σε άλλες καλλιέργειες εκτός από το ρύζι, τα ψεκαστικά μηχανήματα (εξωτερικά και εσωτερικά) πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά.

1. Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάζουμε τελείως το δοχείο. Συνιστάται καθαρισμός από υπολείμματα του σκευάσματος εξωτερικά του ψεκ. μηχανήματος με άφθονο καθαρό νερό.
2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό και ξεπλύνετε βραχίονες και σωληνώσεις χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Αδειάστε εντελώς το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος.
3. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε απορρυπαντικού στην συνιστώμενη δόση. Ανακινείστε και ξεπλύνετε του βραχίονες και τις σωληνώσεις με το καθαριστικό διάλυμα. Προσθέστε νερό μέχρι να γεμίσει πλήρως το ψεκαστικό μηχανήμα και ανακινείστε το καθαριστικό διάλυμα για 15 λεπτά. Ξεπλύνετε τους βραχίονες και τις σωληνώσεις μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος.
4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαριστούν χωριστά με διάλυμα που περιέχει απορρυπαντικό στην συνιστώμενη δόση.

Συνδυαστικότητα: Το **PINDAR** δεν απαιτεί συνδυασμό με άλλες βοηθητικές-προσκολλητικές ουσίες. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα. Το PINDAR μπορεί να εφαρμοστεί χρονικά πριν από την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες propanil ή bentazone, σε ένα πρόγραμμα που προβλέπει την εναλλαγή των σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Το PINDAR είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.</p> <p>Το penoxsulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase), και δρα παρεμποδίζοντας την βιοσύνθεση αμινοξέων. Το triclopyr έχει δράση όμοια με αυτή των συνθετικών αυξινών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Το προϊόν απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και εν μέρη από τις ρίζες και μεταφέρεται προς τους μεριστωματικούς ιστούς. Η ανάπτυξη των ζιζανίων επιβραδύνεται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται 5-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, ενώ η καταπολέμηση των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μετά από 3-4 εβδομάδες.</p>
---------------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ/100 λιτ. νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Ρύζι	<p><u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Μουχρίτσες (<i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Echinochloa</i> spp.), Αμάνια (<i>Ammania coccinea</i>), Μοσχοκύπερη (<i>Cyperus difformis</i>), Ετερανθέρα (<i>Heteranthera reniformis</i>), Βολβόσχοινο (<i>Bolboschoenus maritimus</i>), Σκίρπος (<i>Schoenoplectus mucronatus</i>), <i>Bidens frondosa</i></p> <p><u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Κίτρινη κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>)</p>	250	-	15-40*	<p>Εφαρμογή στο ρύζι από τα 2 φύλλα έως το στάδιο δημιουργίας της ανθήλης ή στάδιο πράσινου δακτυλίου (Μάιος-Ιούνιος). BBCH 12-31</p> <p>Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της Μουχρίτσας και των λοιπών ζιζανίων**</p>	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Οι επιδόσεις του PINDAR δεν επηρεάζονται από τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος.

** -Για τον «κόκκινο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1^ο φύλλο έως τα 1-2 αδελφία.

-Για τον «άσπρο» βιότυπο Μουχρίτσας εφαρμογή από το 1^ο φύλλο έως τα 3-4 φύλλα και πάντα πριν την αρχή του αδελφώματος.

-Για την καταπολέμηση των Cyperaceae και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από τα 1-2 φύλλα έως τα 4-5 φύλλα των ζιζανίων.

Μην ψεκάσετε όταν φυσάει άνεμος με ταχύτητα μεγαλύτερη από 3-5 μέτρα/δευτερόλεπτο

Μέγιστη συνιστάμενη ταχύτητα ελκυστήρα: 6-8 km/ώρα

Μέγιστη συνιστάμενη πίεση 3 bar.

Κατά προτίμηση ψεκάστε το πρωί, όταν η θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή και η υγρασία δεν είναι πολύ χαμηλή (σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα τα μικρότερα σταγονίδια του ψεκαστικού νέφους να παρασυρθούν λόγω εξάτμισης).

Η αποτελεσματικότητα του **PINDAR** δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Βροχόπτωση 4 ώρες μετά τον ψεκασμό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του **PINDAR**.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΜΩΔΗ ΕΔΑΦΗ

Αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

-1 μέτρου για σιτηρά και αραβόσιτο.

-5 μέτρων για μηδική, ηλιάνθο, αμπέλι, σόγια, ζαχαρότευτλα, και οπωροφόρα

-15 μέτρων για τομάτα, πεπόνια.

Εάν χρησιμοποιείτε ακροφύσια μειωμένης διασποράς η ζώνη προστασίας σε πεπόνια και τομάτα μπορεί να μειωθεί στα 5 μέτρα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το **PINDAR** περιέχει 2 δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να εφαρμόζεται μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο. Εφαρμόστε τις γενικές αρχές διαχείρισης ανθεκτικότητας (εφαρμογές όταν τα ζιζάνια είναι στο πιο ευαίσθητο στάδιο και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το **PINDAR**, στο ίδιο χωράφι μπορεί να επανασπαρεί ρύζι μετά από 3 εβδομάδες και αφού προηγηθεί μια πολύ επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά από εφαρμογή του **PINDAR** στο ρύζι, και σύμφωνα με την ορθή πρακτική αμειψισποράς, είναι δυνατή η σπορά των ακόλουθων καλλιεργειών: μαλακό ή σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σόγια, ηλιάνθος, καλαμπόκι.

Να μη σπαρθεί άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω, πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του PINDAR.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα


Μη εισέρχετε στην περιοχή όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.


Το PINDAR είναι εκλεκτικό σε όλες τις κύριες καλλιεργούμενες ποικιλίες ρυζιού (τύπου indica και japonica) όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν το είδος του εδάφους ή οι καλλιεργητικές πρακτικές. Εντούτοις συνιστάται να μην ψεκάσετε αν η καλλιέργεια είναι σε συνθήκες καταπόνησης που οφείλονται στο κρύο ή την ξηρασία, σε προσβολές παρασίτων ή σε θρεπτική ανεπάρκεια. Εάν παραστεί ανάγκη εφαρμογής κάτω από αντίξοες συνθήκες, μπορεί να εμφανιστεί μια προσωρινή κάμψη της ανάπτυξης της καλλιέργειας η οποία όμως δεν θα επηρεάσει το τελικό προϊόν στη συγκομιδή.

9 Σήμανση σκευάσματος:


ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spε3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους αφήστε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς 50%.

12

Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

P302/352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

P305/351/338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.☒

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέστε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα. Μη χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77-93-777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από το ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ:

Μελέτη σταθερότητας κατά την αποθήκευση 2 ετών σε PET and F-HDPE

Και εντός 4 ετών μελέτες «Paddy dissipation in European rice production areas (at least 2 sites) to generate DT50 data under realistic conditions»

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊστάμενη της
Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ