

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)

Αθήνα, 16.08.2017  
Αριθ. πρωτ: 3590/35393

Προς: OXON ITALIA, SpA  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία

(δια του υπευθύνου επικοινωνίας  
Απόστολο Σαμούδη - SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ)

**ΘΕΜΑ:** "Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
**BISMARK** (clomazone 5.5% β/ο + pendimethalin 27.5% β/ο)

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τις δραστικές ουσίες clomazone και pendimethalin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες clomazone και pendimethalin.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

8. Την αξιολόγηση και την έγκριση από την Ιταλία του όμοιου σκευάσματος **BISMARK** (αριθμ. έγκρισης 16364).
9. Τις με αριθμ. 13096/141734/16.12.2016 και 3590/35393/28.03.2017 αιτήσεις της εταιρείας OXON ITALIA SpA, διά του υπευθύνου επικοινωνίας κ. Απόστολο Σαμούδη - SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BISMARK** της εταιρείας OXON ITALIA, SpA, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70234</b>
<b>16.08.2017</b>
<b>31.07.2019</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>BISMARK</b>
Μικροκάψουλες σε αιώρημα (CS)

**1.3 Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Clomazone</b>
------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

96% β/β min
-------------

Χημική ομάδα

Ισοξαζολιδινόνες
------------------

Παρασκευαστής

<b>Oxon Italia SpA</b> Via Sempione, 195 20016 Pero (Milan), Ιταλία
---

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. Oxon Italia S.p.A.**  
Strada Prov.le Km 2,6  
Mezzana Bigli (PV)  
27030, Ιταλία

**2. Shandong Cynda Chemical Co Ltd**  
Economic Development Area  
Boxing Country  
Shandong, Κίνα

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας clomazone όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 13096/141734/16.12.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**pendimethalin**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

90% β/β min

Χημική ομάδα

Δινιτροανιλίνες

Παρασκευαστής

**BASF SE**  
Crop Protection Division,  
P.O. Box 120, Ludwigshafen, Γερμανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**BASF Corporation Agricultural Products,**  
Hannibal Plant 3150 Highway JJ Hannibal  
(Palmyra), MO 63461 ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pendimethalin όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 100637/13.04.2004 αίτηση της εταιρείας BASF SE. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**OXON ITALIA, SpA**  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία  
Τηλ.: +39 02 35378234  
Fax: +39 (02) 3390 275  
E-mail: CPalladini@oxon.it

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Απόστολος Σαμούδης  
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ  
Βασιλέως Κων/νου 32  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834  
Fax: 210 5223 139  
E-mail: info@sipcam.gr

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**  
Βασιλέως Κων/νου 32  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834  
Fax: 210 5223 139  
E-mail: info@sipcam.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Sipcam SpA**  
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO),  
Ιταλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Sipcam SpA**  
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO),  
Ιταλία
- 2. Sipcam Inagra, S.A.**  
Ctra. Mareny Blau, s/n, Sueca (Valencia), Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. SIPCAM SpA**, Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία
- 2. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ**, Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής
- 3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**, Μάνδρα Αττικής
- 4. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**, Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 56403

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: pendimethalin 27.5% β/ο  
clomazone 5.5% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 67,60 β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 13096/141734/16.12.2016 αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2

**Συσκευασίες**

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50, 100, 250 και 500 κ. εκ., 1, 2 και 2.5 λίτρα	COEX
2.	Μπιτόνι	5, 10 και 20 λίτρα	COEX

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το 30-50% του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος συνεχίζοντας την ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.. Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

## 4

## Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ευρέως φάσματος προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με υπολειμματική δράση για την αντιμετώπιση αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζανίων σε πολλές καλλιέργειες. Το BISMARK είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών (clomazone + pendimethalin). Το clomazone είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων και μετακινείται στο πάνω μέρος του φυτού. Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών. Το pendimethalin δρα επηρεάζοντας τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

## 5

## 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
<b>Ρύζι (ξηρή σπορά) (ORYSA)</b>	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-300		20-40	Προφυτρωτικά	1
<b>Σόγια (GLXMA)</b>	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-250		20-40	Προφυτρωτικά	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πατάτα (SOLTU)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	150-200		20-40	Προφυτρωτικά μέχρι και το παράχωμα, αλλά πριν το φύτευμα της πατάτας	1
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	250-300		20-40	Πριν τη μεταφύτευση	1
Όσπρια (Φασόλια, Κουκιά) (PHSVX, VICFX)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	150-200		20-40	Προφυτρωτικά	1
Αρακάς, Φασολάκι (PIBSX, PHSVX)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	150-200		20-40	Προφυτρωτικά	1
Καρότο (DAUCS)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	150-200		20-40	Προφυτρωτικά	1
Μάραθος (FOEVU)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	150-200		20-40	Πριν τη μεταφύτευση Προφυτρωτικά	1
Σπαράγγι (ASPOF)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	200-300		20-40	Μετά τη συγκομιδή και πριν την αναβλάστηση	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	150-200		20-40	Προφυτρωτικά ή μέχρι το στάδιο των δύο εκπτυγμένων φύλλων	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	120-150		20-40	Προφυτρωτικά	1
Κόλιανδρο (καλλιέργεια με σπόρους) (CORSA)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	150-200		20-40	Προφυτρωτικά	1

**Παρατηρήσεις:****\* Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:**

*Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο - DIGSA), *Panicum dichotomiflorum* (πάνικο διχοτομικό- PANDI), *Setaria viridis* (σετάρια-SETVI), *Sorghum halepense* (βέλιουρας-SORHA).

**\* Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:**

*Abutilon theophrasti* (αγριοβαμβακιά-ABUTH), *Galinsoga parviflora* (καλινσόγκα-GASPA), *Solanum nigrum* (αγριοντοματιά-SOLNI), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα-GALAP), *Mercurialis annua* (σκαρολάχανο-MERAN), *Portulaca oleracea* (αντράκλα-POROL), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά-POLPE), *Chenopodium album* (λουβουδιά-CHEAL), *Fallopia convolvulus* (άγριο φαγόπυρο-POLCO), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα-CAPBP), *Senecio vulgaris* (μαρτιακός-SENVU), *Stellaria media* (στελλάρια-STEME), *Sonchus oleraceus* (ζωχός-SONOL), *Veronica persica* (βερόνικα-VERPE).

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

*Amaranthus retroflexus* (βλήτο τραχύ-AMARE), *Datura stramonium* (τάτουλας-DATST), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα- ECHCG), *Diploaxis erucoides* (άγρια ρόκα-DIPER).

**Παρατηρήσεις:**

1. Ψεκάστε σε καλά προετοιμασμένο επίπεδο έδαφος, χωρίς σβώλους.
2. Η δράση του BISMARK στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται άρδευση περίπου 10 mm νερού για την ενσωμάτωση – ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.
3. Ομοιόμορφη σπορά σε βάθος τουλάχιστον 3-4 cm για όλες τις καλλιέργειες.
4. Καθυστερημένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα λεύκανσης στην καλλιέργεια,

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χωρίς επίδραση στην παραγωγή.

5. Σε ελαφριά εδάφη για όλες τις καλλιέργειες, χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες δόσεις,

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Να μην χρησιμοποιείται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία <1.5%.

Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.

Η εφαρμογή του να γίνεται με ήπιο καιρό και απουσία ανέμου.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας  
- σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε νέες καλλιέργειες για 6 μήνες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος εκτός των ακόλουθων εξαιρέσεων:

- Επανασπορά ρυζιού σε ξηρό έδαφος σε περίπτωση αποτυχίας της αρχικής σποράς. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός με BISMARCK.
- Σπορά σόγιας, καρότου, μπιζελιού, φασολιών, κουκιών, φάβας, αραβόσιτου ή φύτευσης πατάτας ή μεταφύτευσης καπνού και πιπεριάς.

Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (24 ώρες).

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου



GHS07



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10

Δηλώσεις  
επικινδυνότητας**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Να φοράτε κατάλληλα γάντια και φόρμα εργασίας κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».

«Να φοράτε φόρμα εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».

«Ξεπλύνετε καλά με σαπούνι και νερό τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα δοχεία που χρησιμοποιήσατε για την ανάμιξη και εφαρμογή μετά τη χρήση».

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1:** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες: πατάτα, φασόλι, φασολάκι, αρακά, κουκιά, καρότο, κόλιανδρο, μάραθος, ελαιοκράμβη, αραβόσιτο, **15 μέτρων** για την καλλιέργεια της σόγιας και **20 μέτρων** για τις καλλιέργειες του ρυζιού, του καπνού και του σπαραγγιού από τα επιφανειακά ύδατα.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Γενικές οδηγίες:** Απαιτείται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα σας χωρίς κατάποση, μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777.

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όσπρια (Φασόλια, Κουκιά), Αρακάς, Φασολάκι	60
Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Δοκιμή αιωρηματικότητας (suspensibility test) μετά από αποθήκευση, σε συγκεντρώσεις διαλύματος του σκευάσματος 0.38-0.5 και 1.5% ο/ο.
2. Μελέτες φυτοτοξικότητας κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια αρχή αξιολόγησης.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**