



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.07.2017
Αριθμ. πρωτ: 6259/61062

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη, Ο. Μελιτά
Τηλέφωνο: 210 92 87 254, 210 92 87 244
e-mail: dpitarokili@minagric.gr
omelita@minagric.gr

Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑΛΙΑ, SpA, Ιταλία
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,
19400 Κορωπί
E-mail: info@sipcam.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **SH 1634 (δ.ο terbutylazine 12.5% β/ο + pendimethalin 25% β/ο)**».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **pendimethalin**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/841 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* στέλεχος: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazate, bromoxynil, carfentrazone ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumioxazine, foramsulfuron, *Gliocladium catenulatum* στέλεχος: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-m, methoxyfenozide, milbemectin, oxasulfuron, **pendimethalin**, phenmedipham, pymetrozine, s-metolachlor και trifloxystrobin.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 820/2011 της επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **terbutylazine**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
9. Τη με αριθμό έγκρισης 70195/30.01.2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος **AXION COMBI**.
10. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Την με αριθμό πρωτ. 6259/61062/06.06.2017 αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας OXON ITALIA, SpA.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SH 1634** της εταιρείας OXON ITALIA, SpA, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70224
13.07.2017
31.07.2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

SH 1634
Μίγμα εναιωρήματος μικροκαψουλών και συμπυκνωμένου αιωρήματος (ΖC)

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική Ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

terbuthylazine

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Τριαζίνες

Παρασκευαστής

OXON Italia S.p.A – Via Sempione 195 20016, Pero (MI) Ιταλία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

OXON Italia S.p.A.Strada Prov.le Km 2.6
27030 Mezzana Bigli, Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 14327/163135/23.12.2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς AXION COMBI.

Δραστική Ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

pendimethalin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

92 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Δινιτροανιλίνες

Παρασκευαστής

BASF Agro B.V.,
Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7,
8055 Zurich, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF CorporationHannibal Plant 3150 Highway JJ Hannibal (Palmyra), MO 63461,
Η.Π.Α.**2. Finchimica Spa**

Via Cimarosa 4. MILANO Lombardy 20144, Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pendimethalin όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 13.4.2004 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 100637) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

OXON ITALIA, SpAVia Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία
Τηλ.: +39 02 35378234, Fax: +39 02 3390275
E-mail: CPalladini@oxon.it

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕΒασιλέως Κωνσταντίνου 32,
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,
 Τ.Κ. 19400 Κορωπί
 Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
 E-mail: info@sipcam.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

OXON ITALIA, SpA
 Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SIPCAM SpA,
 Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM SpA**
 Via Vittorio Veneto 81,
 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία
2. **ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ**
 Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής
3. **ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**
 Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 56403

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: **terbuthylazine:** 12.50 % (β/ο)
pendimethalin: 25.00 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: **65.09 % (β/β)**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 12265/133397/29.11.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς AXION COMBI.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1 λίτρο	HDPE
2	Μπιτόνια	3, 5, 6, 10, 12 και 20 λίτρα	HDPE

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ευρέως φάσματος προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση ετήσιων ζιζανίων (αγρωστωδών και πλατύφυλλων). Είναι μίγμα των δραστικών ουσιών terbutylazine που ανήκει στην ομάδα των τριαζινών και pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών.

Η terbutylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Η pendimethalin παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	1
Βαμβάκι GOSHE	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* <i>Cynodon dactylon</i> (Αγριάδα)	400	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	1
		600	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	1

Παρατηρήσεις:**1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Καλαμπόκι**

Πολύ Ευαίσθητα: *Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι) POLAV, *Polygonum convolvulus* (Πολύγωνο) POLCO, *Portulaca oleracea* (Αντράκλα) POROL, *Veronica persicaria* (Βερόνικα).

Ευαίσθητα:

Amaranthus retroflexus (Τραχύ Βλήτο) AMARE, *Chenopodium album* (Λουβουδιά) CHEAL, *Datura stramonium* (Τάτουλας) DATST, *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα) ECHCG, *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά) POLPE, *Setaria spp.* (Σετάρια) SETSS, *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά) SOLNI, *Xanthium spp.* (Αγκάθι) XANSS.

Μετρίως ευαίσθητα:

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά) ABUTH, *Euphorbia prostrata*, *Heliotropium europaeum* (κοινό ηλιοτρόπιο) HEOEU, *Solanum physalifolium* SOLPS

Βαμβάκι**Ευαίσθητα:**

Amaranthus retroflexus (Τραχύ Βλήτο) AMARE, *Chenopodium album* (Λουβουδιά) CHEAL, *Datura stramonium* (Τάτουλας) DATST, *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά) POLPE, *Portulaca oleracea* (Αντράκλα) POROL, *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά) SOLNI, *Xanthium strumarium* (Αγριομελιτζάνα) XANST, *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα) ECHCG

Μετρίως ευαίσθητα:

Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά) ABUTH, *Sorghum halepense* (Βέλιουρας) SORHA.

**Cynodon dactylon* CYNDA(Αγριάδα /στη δόση των 600 κ. εκ./στρ.).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. Η δράση του SH 1634 στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός 2 εβδομάδων, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών.

Διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών θα πρέπει να παρέλθει από την εφαρμογή του προϊόντος (ακόμη και στις περιπτώσεις αποτυχίας της αρχικής καλλιέργειας αραβοσίτου ή βαμβακιού) για τη σπορά άλλων καλλιεργειών, εκτός βέβαια από τις καλλιέργειες για τις οποίες συνιστάται (αραβόσιτος και βαμβάκι) καθώς και φασόλι.

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει καλή κατεργασία του εδάφους πριν τη σπορά τους.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Στο βαμβάκι, κάτω από δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης των φυτών μπορεί να εμφανισθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας χωρίς επίπτωση στην παραγωγή.

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες αραβοσίτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9 Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει pendimethalin και 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια εντός 7 ημερών οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αραβόσιτου και μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό, σε άνετη θέση άνετα και καλύψτε τον καλά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό, καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Αραβόσιτος, Βαμβάκι	Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

1. Η παρούσα άδεια θα ανακληθεί εάν ο κάτοχος της έγκρισης δεν υποβάλει στη ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμό πρωτ. **12265/133397/30.01.2017** Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος **AXION COMBI** και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η ίδια απόφαση.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ