



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13 - 07 - 2017
Αριθ. πρωτ: 5414/53378

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσας
Τ.Κ.15349 Ανθούσα Αττικής
e- mail: voula.kalliakaki@syngenta.com
leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CLICK PRO (δ.ο. mesotrione 5% β/ο + terbuthylazine 32,6% β/ο).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών Mesotrione.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) με αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας terbuthylazine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.
8. Την υπ' αριθ. 6718/65430/16-06-2017 Απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αρ. 70215 οριστική έγκριση στο προϊόν αναφοράς **CALARIS PRO** (ΑΔΑ: 62Π34653ΠΓ-οΘΟ), όπως ισχύει σήμερα.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 5414/53378/16-05-2017 και 6640/64925/15-06-2017 αιτήσεις της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CLICK PRO** της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70221
13-07-2017
31-07-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

CLICK PRO
Πυκνό εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Mesotrione
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92 % (β/β) min
Χημική ομάδα	ΤΡΙΚΕΤΟΝΕΣ
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG CH 4002 – Basel Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1. Syngenta Crop Protection Monthey SA Route de l'Île au Bois CH-1870 Monthey Ελβετία 2. Shenyang Sciencreat Chemicals Co. Ltd. Shenyang Liaoning, P.R. Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ. 1105/14457, 05/02/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Πορτογαλίας για το φ.π. CALARIS PRO.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Terbuthylazine
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % (β/β) min
Χημική ομάδα	τριαζίνες
Παρασκευαστής	Syngenta Crop Protection AG CH 4002 – Basel Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1. Syngenta Crop Protection Inc. 3905 Highway 75 River Road, PO Box 11 St. Gabriel, LA 70776 ΗΠΑ 2. OXON Italia SpA Strada Prov.le Km 2.6 27030 Mezzana Bigli Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας terbuthylazine όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ. 1105/14457, 05/02/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Πορτογαλίας για το φ.π. CALARIS PRO.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσης- Ανθούσα Αττικής
Τ.Κ. 15349
Τηλ.: 210 6666612-13
Fax: 210 6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσης- Ανθούσα Αττικής
Τ.Κ. 15349
Τηλ.: 210 6666612-13
Fax: 210 6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσης- Ανθούσα Αττικής
Τ.Κ. 15349
Τηλ.: 210 6666612-13
Fax: 210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG
CH 4002 – Basel
Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

1. Syngenta Production France S.A.S.
Aigues-Vives Usine
Route de la Gare
F-30670
Aigues-Vives
Γαλλία
2. Chemark KFT
8182 Peremarton
Gyartelep Tulipan utca
Ουγγαρία
3. Sipcam SpA
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO)
Ιταλία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Agro S.A.S
Aigues-Vives Production
Route de la Gare
F-30670
Aigues-Vives
Γαλλία
2. Chemark KFT
8182 Peremarton
Gyartelep Tulipan utca
Ουγγαρία
3. Sipcam SpA
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO)
Ιταλία
4. Syngenta Hellas AEBE
Οινόφυτα-Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Mesotrione 5% β/ο
Terbutylazine 32,6 β/ο
Βοηθητικές ουσίες 64,34 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη αρ. πρωτ. 1105/14457, 05/02/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Πορτογαλίας για το φ.π. CALARIS PRO.

2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο (Canister)	1,5,10,20 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα με ψεκαστήρες όλων των τύπων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 3 Atm. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου νερού και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Με συνεχή ανάδευση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τη χρήση, πλύνετε το ψεκαστικό εξοπλισμό καλά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε δύο με τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:-

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, ευρέως φάσματος ζιζανιοκτόνο επαφής με υπολειμματική δράση για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Το CLICK PRO είναι διασυστηματικό σκεύασμα και απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα.

Το mesotrione αναστέλλει τη δράση της 4-HPPD και έτσι παρεμποδίζει τη σύνθεση των καροτινοειδών και η Terbutylazine δρα σαν παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	230	--	20-40	Προφυτρωτικά ή Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων (BBCH 00-13)	1

Παρατηρήσεις:

1) ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*, ABUTH), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE), Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL), Τάτουλας (*Datura stramonium*, DATST), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, POLPE), Γλιστρίδα (*Portulaca oleraceae*, POROL), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*, SOLNI), *Ambrosia artemisiifolia* (AMBEL), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*, CAPBP), *Xanthium sp* (XANSS), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*, DIGSA), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, ECHCG), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*, SINAR).

Μετρίως ευαίσθητα: Κεχρί (*Panicum dichotomiflorum*, PANDI), Σετάρια (*Setaria viridis* SETVI, *Setaria verticillata*, SETVE).

2) ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ευαίσθητα: Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*, ABUTH), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, AMARE), Λουβουδιά (*Chenopodium album*, CHEAL), Τάτουλας (*Datura stramonium*, DATST), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, POLPE), Γλιστρίδα (*Portulaca oleraceae*, POROL), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*, SOLNI), *Ambrosia artemisiifolia* (AMBEL), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*, CAPBP), Γκαλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*, GASPA), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*, MERAN), Στελλάρια (*Stellaria media*, STEME), *Xanthium sp.* (XANSS), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*, POLAV), Πολύγωνο (*Polygonum convolvulus*, POLCO), Κεχρί (*Panicum dichotomiflorum*, PANDI), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*, SINAR), Ηλίανθος (*Helianthus annuus*, HELAN).

Μετρίως ευαίσθητα: Σετάρια (*Setaria viridis* SETVI, *Setaria verticillata*, SETVE).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γλυκό καλαμπόκι, καλαμπόκι για σποροπαραγωγή και ποπ-κορν.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλιάνθος, πατάτα, τεύτλα, κρεμμύδι, σπανάκι, μπιζέλι, φασόλι, μηδική και σόγια, αφού προηγηθεί βαθειά άροση.

- να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και φάβα πριν περάσουν τουλάχιστον 24 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Όταν εισέρχεστε να φοράτε προστατευτικά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα, κάλτσες και παπούτσια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν εμφανίζεται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Υπάρχει περίπτωση να εμφανισθούν πολύ ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επιδρούν στην απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

10

**Δηλώσεις
Επικινδυνότητας:**

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μείωση/ αύξηση σωματικού βάρους και κατανάλωσης τροφής), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

EUH 208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11

**Δηλώσεις
Προφύλαξης:**

P102: Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.

SP1: Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε μόνο ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση $\geq 50\%$.

SPe3: Για να προστατέψετε τα **φυτά μη στόχους** να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση $\geq 90\%$ ή
να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά και σε συνδυασμό να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση $\geq 50\%$ ή
να αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

SP3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να διατηρήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείτε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μη προκαλέσετε εμετό.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377.

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος	Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών:

Στο [Παράρτημα III](#) του προϊόντος αναφοράς CALARIS PRO καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ