

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.02.2017
Αριθ. πρωτ: 10848/118620 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: Fine Agrochemicals Limited
Δια μέσου της
Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **FALGRO TB (δ.ο. Gibberellic acid)**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37 και 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι δραστικές ουσίες **gibberellic acid** και gibberellin.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 9379/119137/02-11-2015 (ΦΕΚ 2367/τΒ'/4-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Τις υπ' αρ. 8070/81441/18-7-2013 και 10848/118620/25-10-2016 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. για την Έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος στην αγορά.
9. Την Έκθεση Αξιολόγησης της αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Γαλλίας που είναι αναρτημένη στο circa bc καθώς και την υπ' αρ. 2160383 Άδεια Κυκλοφορίας του σκευάσματος στην Γαλλία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FALGRO TB** (δ.ο. Gibberellic acid) της εταιρείας **Fine Agrochemicals Limited** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8265

20.02.2017

31.08.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FALGRO TABLET

1.2.β Μορφή:

TB (υδατοδιαλυτά δισκία)**1.3 Δραστικές ουσίες**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Gibberellic acid (GA₃)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

90% w/w min

Χημική ομάδα

Gibberellins

Παρασκευαστής

Fine Agrochemicals Limited

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd,
Zhejiang, No.598 Xishan Road, Haining, Zhejiang, China
Telephone no.: +86 5737070287
Fax no: +86 572 7026183

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Gibberellic acid (GA₃)** είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρησης του gibberellic acid στο Annex I.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Fine Agrochemicals Limited
 P.C. Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK
 Tel.: +44 (0) 1905 361800
 Fax: +44 (0) 1905 361810
 E-mail: iainw@fine.eu

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χελλαφάρμ ΑΕ.
 Φλέμιγκ 15
 151 23 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6800900
 Fax: 210 6833488
 E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Χελλαφάρμ ΑΕ.
 Φλέμιγκ 15
 151 23 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6800900
 Fax: 210 6833488
 E-mail: info@hellafarm.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Fine Agrochemicals Limited

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 Amerilabs Technologies Inc,
 2765 Niagara Lane North,
 Plymouth, MN 55447, USA
 Person to contact: Terry Wehling
 Telephone no.: 763 412 4872
 Fax no.: 763 525 1285

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1. Amerilabs Technologies Inc,
 2765 Niagara Lane North,
 Plymouth, MN 55447, USA
 2. Χελλαφάρμ Α.Ε., Στυλίδα Φθιώτιδας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Gibberellic acid: 18.37% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 79.59 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στον εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|-----------|--------------|---|
| 1 | Σωληνάριο | 10 ταμπλέτες | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
| 2 | Σακίδιο | 1 ταμπλέτα | Χαρτί, πλαστικό χαμηλής πυκνότητας (LDPE), aluminium, surlyn (resine polymeric) |
| 3 | Σακίδιο | 2 ταμπλέτες | Χαρτί, πλαστικό χαμηλής πυκνότητας (LDPE), aluminium, surlyn (resine polymeric) |

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής,

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα εκτός από το Perlan.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: (βλπ σημείο 11).

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία για αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωσης της ποιότητας, πρωίμηση παραγωγής στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, αχλαδιά, αγκινάρα και καλλωπιστικά θερμοκηπίου. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| 5 | | 5.1 Φάσμα δράσης | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα επεμβάσεων ☒ |
| | | γρ. προϊόντος / στρ. | γρ. προϊόντος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα | | |
| Αμπέλι επιτραπέζιο Άσπερμες ποικιλίες (Sultanina, Thompson...) | Επιμήκυνση βότρυ | 4,41-14,7 (0,9-3 ταμπλέτες) | 14,7 (3 ταμπλέτες) | 30-100 | Ψεκασμός πριν την άνθηση σε βλαστούς 4-8 εκ. (BBCH 53-57) | 1 |
| | Αραίωση βότρυ | | | | Ψεκασμός στο 30-40% της άνθησης | 1 |
| | Αύξηση μεγέθους ραγών | 14,7 (3 ταμπλέτες) | 14,7 (3 ταμπλέτες) | 100 | Ψεκασμός από την καρπόδεση ωσότου οι ράγες αποκτήσουν διάμετρο 3-4 χιλιοστά . (BBCH 71-79). Επανάληψη μετά από 8 μέρες για ομοιογενές μέγεθος ραγών | 2/8 |
| | Αύξηση καρπόδεσης και πρωίμηση παραγωγής | 14,7 (3 ταμπλέτες) | 14,7 (3 ταμπλέτες) | 100 | Ψεκασμός κατά την πλήρη άνθηση (BBCH 65). Επανάληψη μετά από 5-12 μέρες | 2/5-12 |
| Αμπέλι οινοποιήσιμο | Αύξηση μήκους των βοτρυών | 1,23-2,45 (0.25-0.5 ταμπλέτες) | 2,45-4,9 (0,5-1 ταμπλέτες) | 50 | Ψεκασμός πριν την άνθηση σε βλαστούς 10-15 εκ. (BBCH 53-57) Η εφαρμογή επιδρά στο μήκος των βοτρυών καθιστώντας τους λιγότερο συμπαγείς και συνεπώς λιγότερο ευπαθείς σε προσβολές από βοτρυτή | 1 |
| Σουλτανίνα για σταφίδα | Αύξηση μεγέθους ραγών | 2,45-4,9 (0,5-1 ταμπλέτα) | 2,45-4,9 (0,5-1 ταμπλέτα) | 100 | Ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν διάμετρο 3 χιλιοστά (BBCH 79) | 1 |
| Κορινθιακή σταφίδα | Περιορισμός ανθόπτωσης και καρπόπτωσης | 2,45 (0.5 ταμπλέτα) | 2,45 (0.5 ταμπλέτα) | 100 | Ψεκασμός κατά την πλήρη άνθηση (BBCH 65) | 1 |
| Πορτοκαλιά | Καθυστέρηση ωρίμανσης & βελτίωση της ποιότητας του φλοιού των καρπών | 4,9-9,8 (1-2 ταμπλέτες) | 4,9-9,8 (1-2 ταμπλέτες) | 100 | Ψεκασμός πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος των καρπών (BBCH 79-81) | 1 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------|--|---------------------------------|
| Μανταρινιά | Βελτίωση καρπόδεσης | 4,9 (1 ταμπλέτα) | 4,9 (1 ταμπλέτα) | 100 | Ψεκασμός από την πλήρη άνθηση ως τα 2/3 της πτώσης των πετάλων. (BBCH 65 - 73). Επανάληψη όταν κριθεί αναγκαίο, ειδικά αν η περίοδος ανθοφορίας είναι μεγάλη | 2 (μεσοδιάστημα 10-30 μέρες) |
| Λεμονιά | Καθυστέρηση ωρίμανσης, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών & αύξηση μεγέθους και βάρους καρπών | 4,9-9,8 (1-2 ταμπλέτες) | 4,9-9,8 (1-2 ταμπλέτες) | 100 | Ψεκασμός πριν την έναρξη αλλαγής του χρώματος των καρπών | 1 |
| Αχλαδιά | Βελτίωση καρπόδεσης, | 1,47-5.88 (0,3-1.2 ταμπλέτες) | 1,47-5.88 (0,3-1.2 ταμπλέτες) | 100 | Ψεκασμός κατά την άνθηση (20-30% ανοιχτά άνθη ως τέλος άνθησης) σε ποικιλίες με χαμηλή καρπόδεση (BBCH 69). Η μεγάλη δόση (1.2) χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται μόνο του και η μικρή (0.3) όταν εφαρμόζεται ως μίγμα βυτίου με το σκεύασμα PERLAN. | 1 |
| Αγκινάρα υπαίθρου | Πρωίμιση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας και ποσότητας παραγωγής | 1.96 - 9.8 (0.4-2 ταμπλέτες) | 4,9-9,8 (1-2 ταμπλέτες) | 40-100 | Έναρξη ψεκασμών κατά το σχηματισμό του κεντρικού άνθους BBCH 11-19 (1-2 πραγματικά φύλλα). Επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 15-20 μέρες. | 3 (μεσοδιάστημα 15-20 μέρες) |
| Καλλωπιστικά θερμοκηπίου | Προώθηση της βλαστικής ανάπτυξης, πρωίμιση και αύξηση ανθοφορίας | 9,8-78,4 (2-16 ταμπλέτες) | 9,8-78,4 (2-16 ταμπλέτες) | 100 | Κατά τη βλαστική ανάπτυξη ως την έναρξη της ανθοφορίας ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα BBCH 13-62) | 1 |

Παρατηρήσεις:

1. Στο επιτραπέζιο αμπέλι η προσθήκη προσκολλητικού ως μίγμα βυτίου, μπορεί να βελτιώσει την διείδυση και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. Στην Σουλτανίνα και στην Κορινθιακή σταφίδα ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται τις ψυχρές ώρες της ημέρας. Προσθέστε προσκολλητικό στο βυτίο ψεκασμού.
3. Στις πολύ ευπαθείς ποικιλίες οινοποιήσιμων αμπελιών (π.χ. Riesling) χρησιμοποιήστε τη μικρότερη δόση.
4. Στην αγλαδιά, πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα οι καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, έλεγχος ζωηρότητα των δέντρων και λίπανση) ανάλογα με το μέγεθος της καρποφορίας. Υψηλές δόσεις Falgro, μπορούν να επηρεάσουν το σχήμα των καρπών (επιμήκυνση) και να μειώσουν την άνθηση κατά την επόμενη καλ/κή περίοδο.
5. Στην αγκινάρα, πρέπει να αυξηθεί η αζωτούχος λίπανση και το πότισμα για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
6. Στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης για τον καθορισμό της δόσης (καλ/γεια, ποικιλία, και τοπικές συνθήκες)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Για τα εσπεριδοειδή, το ιδανικό pH του ψεκαστικού διαλύματος για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης της δραστικής ουσίας κυμαίνεται από 4-5.5.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λιγότερο από 2 βδομάδες από την εφαρμογή θερινού πολτού γιατί επηρεάζεται αρνητικά η απορρόφησή του.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

| | |
|--|--|
| - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας | Δεν απαιτείται |
| - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν | Δεν απαιτείται |
| - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. | Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων |

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ευπαθείς ποικιλίες εσπεριδοειδών όπως οι Turkey, Valencia και Bhihinnia Navel, όταν οι συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων δεν είναι ευνοϊκές. Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητων επιδράσεων στις ακόλουθες ευαίσθητες ποικιλίες αμπελιού και αγκινάρας:
Επιτραπέζιο αμπέλι: Centennial seedless & Sugraone
Οινοποιήσιμο αμπέλι: Sylvaner & Weissburgunder
Αγκινάρα: Romanesco

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Τοξικό για τα ωφέλιμα έντομα στο θερμοκήπιο. Αποφύγετε την έκθεσή τους στο προϊόν.»
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.»
Sp1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε υγρά. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ρίξτε τρεχούμενο νερό στα μάτια επί 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική παρακολούθηση αν εμφανιστεί ερεθισμός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1. Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Δεν απαιτείται | - |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική & απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

*Μελέτες/πειράματα για την υποστήριξη των χρήσεων στις καλλιέργειες: Αχλαδιά, Επιτραπέζιο Σταφύλι (Αραίωμα, Αύξηση καρπώδεσης και πρωίμιση της παραγωγής), Σταφίδα, Καλλωπιστικά (εκτός ειδών *Spathiphyllum* και *Chrysanthemums*).*

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ