



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22 / 03 / 2017
Αριθ. πρωτ: 2632/30746 π. ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι

Τηλέφωνο: 210 92 87161

Email technical@alfagro.gr

e-mail: chpanagopoulou@mianagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60256 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BUMPER 25 EC (δ.ο. propiconazole 25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες captan, propiconazole και spiroxamine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τη με αριθμό πρωτ. 129966/24.06.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60256 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BUMPER 25 EC (δ.ο. propiconazole 25% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αρ. πρωτ. 2632/30746/10-3-2016 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (Μ.Φ.Ι.)
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

7. Τη με αριθμό πρωτ. 2236/27052/9-3-2015 και 2519/29344/8.3.2016 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60256 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BUMPER 25 EC (δ.ο. propriconazole 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 129966/24.06.2009 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13.1 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./στρέμμα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i>) Χρήσεις ήσσονος σημασίας Κλαδοσποπίαση (<i>Cladosporium carophilum</i>) Σκωρίαση (<i>Tranzschelia prunispinos</i>)	45	20-30	100-150	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής έως την πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας	3 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula/Erysiphe necator</i>)	20	10-20 (πριν-μετα την ανθηση)	50-100	Από το στάδιο που οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. Μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας	3 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Σιτάρι	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia spp</i>) Σεπτορίαση (<i>Septoria spp</i>)	50	--	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Σίκαλη Κριθάρι	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i>) Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium</i>)	50	--	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται

	<i>secalis</i>)					
Βρώμη	Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)	50	--	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-21 ημέρες εφ' όσον απαιτείται
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	15	10-15	100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	6 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες εφ' όσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- 1) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.
- 2) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BUMPER 25EC

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια, Σταφύλια	14
Σιτάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Κριθάρι	42
Τριανταφυλλιά	-

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 129966/24.06.2009 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ