

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.03.2017
Αριθ. πρωτ: 3593/35423

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκίλη
Τηλέφωνο: 210 92 87 254
e-mail: dpitarokili@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
ANTRACOL PLUS (propineb 70% β/β)”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες propineb.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".
8. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος ANTRACOL 70 WG στην Ιταλία (αριθμ. έγκρισης: 14488).
9. Την με αριθμ. 4247/48897/21.04.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ANTRACOL PLUS** της εταιρείας **Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60611
28.03.2017
31.01.2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

ANTRACOL PLUS
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική Ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

propineb

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

70 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Διθειοκαρβαμικά

Παρασκευαστής

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, Γερμανία
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Bayer CropScience AG Alte Heerstrasse 41538 Dormagen, Γερμανία
--

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας propineb όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 21.04.2016 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 4247/48897) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι
ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685
Τ.Κ. 151 25
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
E-mail: www.bayercropscience.gr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

-

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης.

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen, Γερμανία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer CropScience (China) Co.Ltd.
No.5 Road, Hangzhou Economic & Technological,
Development Zone
Hangzhou, 310018, Κίνα
2. Bayer CropScience Limited
Plot No.: 66/1 to 75/2 G.I.D.C. Indl. Estate, Himatnagar –
383001, Dist. Sabarkantha
Gujarat, Ινδία
3. Bayer AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen, Γερμανία
4. Exwold Technologies Ltd
PO Box 270, Brenda Road
Hartlepool TS25 2BW
Ηνωμένο Βασίλειο
5. Kwizda Agro GmbH
Kwizdaallee 1
2100 Leobendorf, Αυστρία
6. Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Marle Rue Cyrille
Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, Γαλλία
7. SBM Formulation S.A.
Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621
34535 Beziers Cedex, Γαλλία
8. Schirm GmbH
Standort Lübeck
Mecklenburger Strasse 229
23568 Lübeck, Γερμανία
9. Bayer SAS
Bayer CropScience
Industrial Operations – Villefranche
1 avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche-Limas, Γαλλία
10. Agraform LLC
133 East Krauss Street
St Louis, MO 62111, ΗΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Bayer CropScience S.L.,
Ctra. Madrid-Valencia. Km. 342,
46930-Quart de Poblet (Valencia), Ισπανία
2. Bayer AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen, Γερμανία
3. Exwold Technologies Ltd
PO Box 270, Brenda Road
Hartlepool TS25 2BW
Ηνωμένο Βασίλειο
4. Kwizda Agro GmbH
Kwizdaallee 1
2100 Leobendorf, Αυστρία
5. Bayer SAS, Bayer CropScience Site de Marle Rue Cyrille
Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, Γαλλία
6. SBM Formulation S.A.
Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621
34535 Beziers Cedex, Γαλλία
7. Schirm GmbH
Standort Lübeck
Mecklenburger Strasse 229
23568 Lübeck, Γερμανία
8. Bayer SAS
Bayer CropScience
Industrial Operations – Villefranche
1 avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche-Limas, Γαλλία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: propineb 70% β/β
 Βοηθητικές ουσίες : **23,08% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αίτηση για οριστική έγκριση με ημερομηνία 21.04.2016 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 4247/48897) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	100, 200, 250, 400, 500, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 και 25 κιλά.	Al-composite foil (paper/LDPE/Al/LDPE).
2.	Σακούλα εντός χαρτοκουτίου	100, 200, 250, 400 και 500 γρ., 1, 1,5, 2, 2x1, 2,5, 3, 4, 2x2, 5, 2x2,5, 6, 2x3, 8, 2x4, 10, 2x5, 12, 2x6, 8 κιλά, 2x4, 15, 2 x 7,5, 20, 2x10, 25 και 2x12,5 κιλά.	Εσωτερική σακούλα Al-composite foil (paper/LDPE/Al/LDPE) σε χάρτινο κουτί.

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το ANTRACOL 70 WG είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία proprineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Δρα σε περισσότερες από μία θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων..

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	γρ/100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>), Φόμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	150-200	150-200	100	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>), Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> spp.)	225	150	150	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν την άνθηση και 1 αμέσως μετά την άνθηση*	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα (Υ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>), Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>), Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium fulvum</i>)	200	200	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα (Θ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>), Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>), Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium fulvum</i>)	200-300	200	100-150	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Αγγούρι (Θ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200	200	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκύθι (Θ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200	200	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200	200	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>), Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	200	-	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- 1) *Ο μέγιστος όγκος νερού ανά στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση ανά 100 λιτ. νερό, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
- 2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτές εφαρμόζονται.
- 3) **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ANTRACOL PLUS.**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Μην εφαρμόζετε όταν φυσάει.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

--

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

GHS08

GHS09

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη (θυρεοειδή, περιφερικού νευρικού συστήματος) στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής και κατάποσης.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ208: Περιέχει hexamethylentetramine, propineb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/συγκεντρώσεις σταγονιδίων /εκνεφώματα.
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε απξέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της μηλιάς.
Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απξέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι τη μη γεωργική γη για την καλλιέργεια της μηλιάς.

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400).

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτώματα: Δέρμα: Ερύθημα, δερματίτιδα, ευαισθητοποίηση.

Μάτια: ερεθιστική επιπεφυκίτιδα, ευαισθητοποίηση.

Αναπνευστικό σύστημα: ερεθισμός των ανώτερων αεραγωγών, ασθματική βρογχίτιδα, ευαισθητοποίηση.

ΚΝΣ: αταξία, κεφαλαλγία, σύγχυση, κατάθλιψη, ελάττωση αντανακλαστικών.

Antabuse effect: Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση παράλληλης ή προηγούμενης πρόσληψης αλκοόλ και εκδηλώνεται με ναυτία, έμετο, εφίδρωση, έντονη δίψα, καρδιακούς πόνους, ταχυκαρδία, θολή όραση, ζάλη, ορθοστατική υπόταση.

Μετά από μερικές ώρες το πρόσωπο γίνεται χλωμό και η υπόταση επιδεινώνεται μέχρι την κατάρρευση και την απώλεια συνείδησης.

Θεραπεία: Συμπτωματική.

Συνιστάται αυστηρά η αποχή από το αλκοόλ για 1-2 εβδομάδες λόγω ενίσχυσης των συμπτωμάτων (antabuse effect).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	60 ημέρες
Τομάτα (Θ)	28 ημέρες
Πατάτα	14 ημέρες
Τομάτα (Υ), Πεπόνι, Καρπούζι	14 ημέρες
Αγγούρι, Κολοκύθι (Θ)	3 ημέρες
Μηλιά	Τελευταία εφαρμογή αμέσως μετά την άνθηση

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15

Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16

Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,

Z. ΖΩΓΡΑΦΟΣ