

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.03.2017
Αριθ. πρωτ: 3766/37073

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 92 87 254
e-mail: dpitarokili@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττικής

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 60265 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Ortiva Opti 8/40 SC** (azoxystrobin 8% + chlorothalonil 40% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις”.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 51 και 45 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστικές ουσίες azoxystrobin και chlorothalonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, όπως ισχύει.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 262/04.03.2016 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με το συνημμένο σ' αυτό Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων υπολειμμάτων.
6. Την έγκριση από τη Γαλλία του όμοιου σκευάσματος AMISTAR OPTI (αριθμ έγκρισης 2100179/06.03.2013).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Την από 10.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑ&Τ.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις από 25.11.2015 και 15.04.2016 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60265** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Ortiva Opti 8/40 SC** (azoxystrobin 8% + chlorothalonil 40% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθ. 180977/11.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (χρήση ή σσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
-Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Τομάτα (Βιομηχανική)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	200-250	-	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται..

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

-Κολοκύθι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστη μα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ρεβίθι (ήσσονος σημασίας)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> Περονόσπορος (<i>Peronospora viciae</i>) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe pisi</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>) Σκωρίαση <i>Uromyces sp.</i>	250	-	30-60	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών (έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή
Αρακάς (ήσσονος σημασίας)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> Περονόσπορος (<i>Peronospora viciae</i>) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	250	-	30-60	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών (έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή.(προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη(συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας). Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αρακά και ρεβυθιού από τη χρήση του σκευάσματος». 						

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική).

Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	3
Τομάτα (Βιομηχανική)	3
Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	3
Κολοκύθι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	3
Ρεβίθι	14
Αρακάς	35

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό».
«Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής».
«Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει».
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, στα οποία να περιλαμβάνεται μία φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων.

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 180977/11.02.2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **60265** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ORTIVA ΟΡΤΙ 8/40 SC** (azoxystrobin 8% β/ο + chlorothalonil 40% β/ο), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ