

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 - 05 - 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 5826/56878

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας  
 15349 Ανθούσα Αττική  
 Τ.Κ.15349

E-mail:

[voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CALLISTO PLUS (δ.ο. Mesotrione+Dicamba).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών Mesotrione.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) με αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών dicamba.
8. Την από 29/4/2016 αξιολόγηση του από την εισηγήτρια χώρα Γαλλία κα τη με αριθμό 2160248έγκριση του.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".»
10. Τις με αρ. πρωτ. 10231/102205/4-10-2012 και 10925/126076/16-10-2013 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1Α** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CALLISTO PLUS** της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70211
24/5/2017
31/7/2018

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

CALLISTO PLUS
---------------

1.2.β Μορφή:

SC - Πυκνό Εναιώρημα
----------------------

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Mesotrione</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92% (β/β) min
Χημική ομάδα	τρικετόνες
Παρασκευαστής	<b>Syngenta Crop Protection AG</b> CH 4002 – Basel Ελβετίας
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>-Syngenta Crop Protection Monthey</b> Usine de Monthey CH-1870 Monthey Ελβετία <b>- Shenyang Sciencreat Chemicals Co., Ltd.</b> Xihejiubei Street 17, Chemical Industry Area, Shenyang, Liaoning PR China 110144 Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ. 10231/102205, 04/10/2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>Dicamba</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	85% (β/β) min
Χημική ομάδα	Βενζοϊκά παράγωγα
Παρασκευαστής	<b>Syngenta Crop Protection AG</b> CH 4002 – Basel Ελβετίας
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): - <b>BASF Corporation</b> Agricultural Products 14385 West Port Arthur Road Beaumont, Texas 77705 United States
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας dicamba όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ. 10231/102205-04/10/2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Syngenta Hellas AEBE**

Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττική  
Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13  
Fax:210 6665777  
E-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Syngenta Hellas AEBE**

Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττικής  
Τ.Κ.15349

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**Syngenta Hellas AEBE**

Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττική  
Τ.Κ.15349

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Syngenta Crop Protection AG,**  
CH 4002 – Basel  
Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
**Syngenta Production France S.A.S**  
Aigues-Vives Usine  
Route de la Gare - BP1  
F-30670 Aigues-Vives  
Γαλλία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
- **Syngenta Production France S.A.S**  
Aigues-Vives Usine  
Route de la Gare - BP1  
F-30670 Aigues-Vives  
Γαλλία  
- **Syngenta Hellas AEBE**  
Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστικές ουσίες:**  
**Mesotrione 5% β/ο**  
**Dicamba 12% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες 82.55 % β/β**  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με τη αρ. πρωτ. 10231/102205, 04/10/2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ	HDPE/PA PET f-HDPE HDPE
2	Μπιτόνι	1 λίτρο, 5 λίτρα, 20 λίτρα	HDPE/PA PET f-HDPE HDPE

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερού στο στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:--**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Περιέχει τα δραστικά συστατικά mesotrione το οποίο ανήκει στη ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD και το dicamba το οποίο ανήκει στην ομάδα των Βενζοϊκών παραγώγων. Το σκεύασμα απορροφάται από το στέλεχος, τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστέλλοντας την ανάπτυξη του.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	<b>Ευαίσθητα ζιζάνια</b> <b>Αγριοβαμβακιά</b> <i>Abutilon theophrasti</i> ABUTH <b>Βλήτο</b> <i>Amaranthus retroflexus</i> AMARE <b>Λουβουδιά</b> <i>Chenopodium album</i> CHEAL <b>Αγριοπιπεριά</b> <i>Polygonum persicaria</i> POLPE <b>Αγριοτοματιά</b> <i>Solanum nigrum</i> SOLNI <b>Μεγάλη περικοκλάδα</b> <i>Calystegia sepium</i> CAGSE <b>Τάτουλας</b> <i>Datura stramonium</i> DATST <b>Αγριομελιτζάνα</b> <i>Xanthium spp</i> XANSS <b>Κίρσιο</b> <i>Cirsium arvense</i> CIRAR  <b>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια</b> <b>Πολύgono</b> <i>Polygonum convolvulus</i> POLCO <b>Λαπάτσα</b> <i>Polygonum lapathifolium</i> POLLA	200	--	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά Από τα 2 μέχρι τα 9 φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19)	1

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	<b>Περικοκλάδα</b> <i>Convolvulus arvensis</i> CONAR <b>Ραπανίδα</b> <i>Raphanus</i> <i>raphanistrum</i> RAPRA <b>Μαρτιάκος</b> <i>Senecio vulgaris</i> SENVU					
--	--	--	--	--	--	--

## Παρατηρήσεις:

- Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σπαστή εφαρμογή του σκευάσματος με 2 εφαρμογές: Η πρώτη στο στάδιο ανάπτυξης 2 μέχρι 6 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 12-16) με 130 κ.εκ/στρ και η δεύτερη στο στάδιο ανάπτυξης των 8 με 9 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 18-19) με 70 κ.εκ/στρ.
- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
- Να γίνεται εναλλαγή εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Αποφύγετε την τυχαία επαφή του σκευάσματος CALLISTO PLUS ή τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους προς γνωστές ως ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες : μηδική, τεύτλα, μουστάρδα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αρακάς, καλλιέργειες ψυχανθών, τριφύλλι, πατάτα, σόγια, καπνός, καλλιέργειες λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών, αμπέλι και οπωροφόρα δέντρα.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο καλαμπόκι την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθιά άροση.



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Απαιτείται άροση πριν από τη σπορά/φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Οι εργάτες να μην εισέρχονται σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκασμένη φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα Callisto Plus, δεν είναι φυτοτοξικό στο καλαμπόκι όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



Προσοχή

GHS09

**10** Φράσεις H

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH 208** Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH 401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## 11 Φράσεις P

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.  
**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501** Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  
**SP1:** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία ασφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από την μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους 75%.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη φυτικής ανάσχεσης 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**  
**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Καλαμπόκι</b>	Δεν ορίζεται. Τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στα 9 φύλλα της καλλιέργειας.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- an analytical method and its ILV (with no hydrolysis step) is required for the determination of dicamba only in dried commodities ;
- an analytical method and its ILV (with no hydrolysis step) is required for the determination of dicamba only in animal matrices ;
- a confirmatory method is required for the determination of the metabolite 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid (NOA 414746) in drinking and surface water;

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ