



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 7 - 2017
Αριθ. πρωτ: 6496/63087

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: : technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STARSHIP 10 SC (δ.ο. mesotrione).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/950 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών mesotrione.
7. Τη με αριθμό 2170361 έγκρισή του στην Γαλλία και την σχετική αξιολόγηση.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τη με αρ. πρωτ. 9784/112046/15-10-2015 και 6496/63087/12-6-20017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **STARSHIP 10 SC (δ.ο. mesotrione)** της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70232
28-07-2017
31-07-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

STARSHIP 10 SC
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Mesotrione
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τρικετόνες
Παρασκευαστής	<p>ADAMA Agan Ltd. Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, Israel Mrs Geula Dagan Tel.: +972 7 3232 1330 Fax: +972 7 3232 1505 Email: Geula.dagan@ma-industries.com</p> <p>European address ADAMA Agriculture BV. c/o Feinchemie Schwebda GmbH Edmund Rumpfer Str. 6 51149 Köln, Germany Mr. Wolfgang Busch Tel.: +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com</p>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:</p> <p>1. SHANGYU NUTRICHEM CO Ltd Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone Shangyu, Zhejiang Province 312369, China</p> <p>2. SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co,Ltd No. 518, Yongxin Road, Binbel Town, Binzhou, Shandong, China</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως έχουν κατατεθεί με το με αρ. πρωτ. 9784/112046/15-10-2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
 Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα):

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
 Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Agan Ltd.
 Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,
 Ashdod 77102, Israel
 Mrs Geula Dagan
 Tel.: +972 7 3232 1330
 Fax: +972 7 3232 1505
 Email: Geula.dagan@ma-industries.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
 επιχείρησης:
ADAMA Agan Ltd.
 Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,
 Ashdod 77102, Israel

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
 επιχειρήσεων:
1. ADAMA Agan Ltd.
 Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,
 Ashdod 77102, Israel

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
 32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Mesotrione** 10% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 90 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τα με αριθ. πρωτ. 9784/112046/15-10-2015 και 6496/63087/12-6-20017 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50, 75, 100, 250, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900 κ.εκ και 1 λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15 & 20 λίτρων	Πλαστικό ΗΜW(HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με πίεση 2-3 Atm, υπό συνεχή ανάδευση, με μπεκ τύπου σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.

Συνδυαστικότητα:

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό - Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

5 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	150	8-40	Μία εφαρμογή - Προφυτρωτικά ή νωρίς Μεταφυτρωτικά , όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75	8-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά , όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων	1
Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75	8-40	Μία εφαρμογή - Προφυτρωτικά ή νωρίς Μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων	1
Σόργο (SORVU)	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50	8-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά , όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2- 9 φύλλων	2/10

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το φύτεμα τους μέχρι τα 6 φύλλα.
2. Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε μικρού σταδίου ζιζάνια και σε χαμηλούς πληθυσμούς.
3. Εναλλακτικά για την μεταφυτρωτική εφαρμογή στον αραβόσιτο μπορούν να γίνουν 2 εφαρμογές με δόση 75 κ.εκ./στρ. (συνολικά 150 κ.εκ./στρ.) και μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

Στον αραβόσιτο με προφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 150 κ.εκ./στρ:

Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (ABUTH)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)

Τάτουλας (*Datura stramonium*) (DATST)

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)

Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME)

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια

Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) (MERAN)

Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)

Στο γλυκό καλαμπόκι με προφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 75 κ.εκ./στρ:

Ευαίσθητα ζιζάνια

Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME)
 Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (ABUTH)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)
 Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)
 Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια
 Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)

Στον αραβόσιτο και στο γλυκό καλαμπόκι με μεταφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 75 κ.εκ/στρ

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (ABUTH)
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)
 Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*) (XANST)
 Βλήτο (*Amaranthus spp*) (AMASS)
 Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)
 Λουβουδιές (*Chenopodium album, Chenopodium hybridum*) (CHEAL,CHEHY)
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια
 Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME)

Στον αραβόσιτο με τη μεταφυτρωτική εφαρμογή στη δόση 150 κ.εκ/στρ καταπολεμούνται επιπλέον :

Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγριοπανσές (*Viola arvensis*) (VIOAR)
 Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME)
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) (DIGSA)
 Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) (MERAN)
 Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*) (POLAV)

Στον αραβόσιτο με τη σπαστή μεταφυτρωτική εφαρμογή 2 x 75 κ.εκ./στρ καταπολεμούνται πέραν των παραπάνω:

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHCG)

Στο σόργο με μια μεταφυτρωτική εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ/στρ :

Ευαίσθητα ζιζάνια

Βλήτα (*Amaranthus spp*) (AMASS)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια
 Αγριοπανσές (*Viola arvensis*) (VIOAR)

Στο σόργο με τη διπλή μεταφυτρωτική εφαρμογή 2 x 50 κ.εκ./στρ καταπολεμούνται επιπλέον:

Ευαίσθητα ζιζάνια

Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) (DIGSA)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Συνιστάται εναλλαγή του **STARSHIP** με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης
 Να μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Να αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες όπως λινάρι, πατάτα, ζαχαρότευτλα, αρακάς, κουκιά, ελαιοκράμβη, ηλίανθο, σόγια, τριφύλλια, σπανάκι και άλλα λαχανικά.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:


Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι στην ίδια καλλιεργητική περίοδο μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος εφόσον εφαρμόστηκε η μέγιστη δόση 150 κ.ε.κ/στρ. και γλυκό καλαμπόκι ή σόργο εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι χαμηλές δόσεις 75 ή 50 κ.ε.κ/στρ αντίστοιχα.
 Να μην σπέρνονται φασόλι, μπιζέλι, ηλίανθος, μηδική, σόγια, ψυχανθή και εαρινή ελαιοκράμβη.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-Σε πρόγραμμα αμειψισποράς στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε) καθώς και ελαιοκράμβη και ηλίανθος αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
 -να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, μπιζέλι, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες αν εισέλθουν στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό, να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και ανθεκτικά υποδήματα

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	<p>Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.</p> <p>Στο σόργο μπορεί να προκαλέσει λεύκανση και μείωση της ζωηρότητας. Το φαινόμενο είναι παροδικό και ξεπερνάτε μετά το πρώτο μήνα, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση.</p>
9	Εικονογράμματα κινδύνου- Προειδοποιητικές λέξεις:	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>GHS09</p> </div> </div>
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> <p>EUH401: «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>

Δηλώσεις
προφυλάξεις:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή»
 «Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με χρήση ψεκαστήρων τύπου σκούπας».
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα στον αραβόσιτο και 10 μέτρων με φυτική κάλυψη από κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα στον γλυκό αραβόσιτο.

Spe3: Για να προστατέψτε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη από μη γεωργική γη:
Στον Αραβόσιτο με δόση 1x150 κ.εκ./στρ:

- **10 μέτρων** σε συνδιασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
- **5 μέτρων** σε συνδιασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Στον Αραβόσιτο με δόση 2x75 κ.εκ./στρ και στο Γλυκό Καλαμπόκι με δόση 1x 75 κ.εκ./στρ:

- **10 μέτρων**, ή
- **5 μέτρων** σε συνδιασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
- χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Στο Σόργο:

- **5 μέτρων**, ή
- χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος, Γλυκό Καλαμπόκι, Σόργο	Δεν ορίζεται Τελευταία εφαρμογή στο στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) της καλλιέργειας.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Analytical method and its ILV for determination residues in animal matrices should be provided in post-authorization.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ.ΖΩΓΡΑΦΟΣ