



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15-09-2017
Αριθ. πρωτ: 9842/94092

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: **KOPPERT B.V. HELLAS M. ΕΠΕ**
Ανθέων 26
19400-ΚΟΡΩΠΙ

ΘΕΜΑ: «Επαναδιατύπωση της παρ. 5 της αριθ. 60.546 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TRIANUM-P** (δραστική ουσία: *trichoderma harzianum strain T22*)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 9842/94092/8.9.17 αίτηση της εταιρείας **KOPPERT B.V. HELLAS M. ΕΠΕ**.
4. Τη με αριθ. 1606/16641//14.2.17 Απόφαση (Β' 629) με θέμα τη «*Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Επαναδιατυπώνουμε την παρ. 5 της αριθ. 60.546 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TRIANUM-P** (δραστική ουσία: *trichoderma harzianum strain T22*), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 7326/81524/27.7.16 (Α.Δ.Α.: 73B14653ΠΓ-ΩΤΩ) Απόφασή μας, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

| 5 5.1 Φάσμα δράσης: | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος Τρόπος-Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| Τομάτα (Υ+Θ) | Pythium sp. , Fusarium sp. | Καλλιέργειες εκτός εδάφους, σε γλάστρες ή σε δίσκους σποράς: • Φυτόρια: | 6 |
| Καρότο (Υ+Θ) | Pythium sp., Sclerotinia sp. | 1,5g/m ² κατά την πρώτη εφαρμογή 0,75 g/m ² για τις επόμενες εφαρμογές (κάθε 10 εβδομάδες) | 6 |
| | | | 6 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| Αγγούρι, Πιπεριά, Λάχανο, Μπρόκολο, Πεπόνι, Μαρούλι, Φασόλι, Κρεμμύδι, Πράσο, Γογγύλι, (Υ+Θ) | Pythium sp. | <ul style="list-style-type: none"> Σε συστάδες ή γλάστρες: 30g/1000 φυτά κατά την πρώτη εφαρμογή 15g/1000 φυτά για τις επόμενες εφαρμογές (κάθε 10 εβδομάδες) Καλλιέργειες εγκατεστημένες στο έδαφος ή σε μεγάλα δοχεία: α) Καλλιέργειες σε συστάδες ή γραμμές (εποχικές): <ul style="list-style-type: none"> 30g/1000 φυτά κατά την πρώτη εφαρμογή 15g/1000 φυτά για τις επόμενες εφαρμογές (κάθε 10 εβδομάδες) Κάθε 4 εβδομάδες σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε πετροβάμβακα β) Καλλιέργειες σε συστάδες ή γραμμές (πολυετής): <ul style="list-style-type: none"> 0,3 έως 1 g/φυτό γ) Λοιπές καλλιέργειες: <ul style="list-style-type: none"> Πάνω στη γραμμή σποράς ή φύτευσης : 100-250 γρ./στρ. Καθολική εφαρμογή 250-500 γρ./στρ. | 6 |
| Σέλινο (Υ+Θ) | Μύκητες εδάφους εκτός από Pythium sp. | | 6 |
| Φράουλα (Υ+Θ) | Pythium sp. | | 6 |
| ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΥΤΑ: (Ρίγανη, Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάπαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου, Αρώνια, Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι βουνού | Pythium sp. | | 6 |
| Καλλωπιστικά (Υ+Θ) | Pythium sp. | | 6 |
| Χρυσάνθεμα (Υ+Θ) | Pythium sp., Fusarium sp. | | 6 |
| Χλοοτάπητες | Pythium sp., Sclerotinia sp. | 300 γραμ./στρέμμα κατά την πρώτη εφαρμογή και 150 γραμ./στρέμμα για τις επόμενες ανά μήνα εφαρμογές | 12 |
| Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων Οπωροφόρα δέντρα | Pythium sp. | Φυτώρια: 1,5 γραμ/τετραγωνικό μέτρο ή Στο έδαφος: 0,3–1 κιλά/1000 φυτά | 2 |
| Παρατηρήσεις: 1. Χρησιμοποιήστε αρκετό νερό για να εξασφαλιστεί η καλή διείσδυση στο έδαφος, αλλά αποφύγετε την απορροή και την υπερβολική παροχέτευση. 2. Για να αυξήσετε την πρόσφυση των σπορίων στις ρίζες, αποφύγετε την απορροή και την υπερβολική παροχέτευση τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. 3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πριν από το φίλτρο. Διασφαλίστε ότι τα φίλτρα του συστήματος άρδευσης είναι καθαρά (σπόρια μπορούν να παραμένουν προσκολλημένα στα φίλτρα). 4. Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά στο αρδευτικό σύστημα τουλάχιστον 1 ημέρα πριν και 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. | | | |

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η αριθ. 7326/81524/27.7.16 (Α.Δ.Α.: 73Β14653ΠΓ-ΩΤΩ) Απόφασή μας.

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ