



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 27-09-2017
Αριθ. πρωτ: 9170/88330**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας
(δια του κ. Γ. Γαλένου,
Αρτάκης 93,
171 24 Νέα Σμύρνη)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) IMPACT 125 SC (δρ. ουσία: flutriafol).
2. Ανάκληση της με αριθ. 6513 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία flutriafol.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 6513 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) IMPACT 125 SC (δρ. ουσία: flutriafol), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 75774/8.6.90 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 5880/63738/28.5.13 αίτηση του κ. Γ. Γαλένου, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας CHEMINOVA A/S Δανίας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 305/4376/14.1.14, 7632/74007/7.7.17 και 9170/88330/22.8.17 αιτήσεις.
12. Την αριθ. 8064/8.5.17 επανέγκριση του σκευάσματος IMPACT στην Ιταλία, κατόπιν επαναξιολόγησης με τις ενιαίες αρχές, καθώς και το αριθ. πρωτ. 10238/99435/22.9.17 έγγραφο της αρμόδιας Ιταλικής αρχής, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος.
13. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 Απόφαση (Β' 629) με θέμα τη «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) IMPACT 125 SC (δρ. ουσία: flutriafol). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.644

27-09-2017

31-05-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

IMPACT

1.2.β Μορφή:

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

| Δραστική ουσία 1 | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO | flutriafol |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | 92% (β/β) min |
| Χημική ομάδα | Ομάδα τριαζολών |
| Παρασκευαστής | CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): CalaChem Ltd , Earl's Road, Grangemouth, Falkirk, FK3 8XG, United Kingdom |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Flutriafol όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J της αίτησης που έχει κατατεθεί από τον παρασκευστή της δραστικής (Cheminova A/S), με ημερομηνία 30-5-2011 (Αρ.Πρ .ΥΑΑΤ 97238). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark

Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691

E-mail: stuart.leslie@fmc.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΝΟΣ

Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 56 12 025

e-mail: George.galenos@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΝΟΣ

Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 56 12 025

e-mail: George.galenos@fmc.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CHEMINOVA A/S

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark

2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 26, D-21683 Stade Germany

3) PHYTEUROP S.A.

Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Denmark

2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 26, D-21683 Stade Germany

3) PHYTEUROP S.A.

Zone Industrielle de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, France

4) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής

5) AGROLOGY SA, ΒΙΠΕΘ Σίνδος

6) ORANGE, 80ό χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32200 Θήβα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **flutriafol : 12,5% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες **87,18% β/β**

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Φιάλη | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 900 κ.εκ. και 1 λίτρο. | Πλαστικό HDPE |
| 2 | Φιάλη εντός χαρτοκουτίου | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 και 500 κ.εκ. | Πλαστικό HDPE, Κουτί από χαρτόνι |
| 3 | Δοχεία | 3, 4, 5, 10, 15 και 20 λίτρων | Πλαστικό HDPE |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύντε όλα τα εξαρτήματα ψεκασμού με νερό. Πλύντε το ψεκαστικό δοχείο με κατάλληλο καθαριστικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα :-

| | | |
|----------|------------------------------|---|
| 4 | Κατηγορία και τρόπος δράσης: | Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο της ομάδας των DMI's (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14. Απορροφάται από τα φύλλα και τους πράσινους ιστούς και μεταφέρεται ακροπεταλικά στα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς. |
|----------|------------------------------|---|

| 5 5.1 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
| | | κ.εκ/ στρ. (max) | κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ. | | |
| ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ (PRNPS) | Ωίδιο (<i>Podosphaera oxycanthae</i> (PODOCL), <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA)) | 25 | 15-25 | 80-150 | Ψεκασμοί από το τέλος της άνθησης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας | 2/10 |
| ΜΗΛΙΑ (MABSZ), ΑΧΛΑΔΙΑ (PYUCO) | Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN), <i>V. pyrina</i> (VENTPI)) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i> (PODOLE)) | 25 | 15-25 | 80-150 | Ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας | 2/10 |
| ΑΜΠΕΛΙ (VITVI) (οινοποιήσιμο) | Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i> (UNCINE)) | 50 | 50-75 | 40-100 | Ψεκασμοί από το στάδιο της άνθησης | 1 |
| ΤΟΜΑΤΑ (LYPES), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (SOLME), ΠΙΠΕΡΙΑ (CPSAN) (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) | Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)) | 75 | 75 | 100 | Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο της καρπόδεσης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας | 2/10 |
| ΦΡΑΟΥΛΑ (FRAAN)-Υπαίθρου | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> (SPHRMA), <i>Oidium fragariae</i> (ODOAP)) | 50 | 50-75 | 60-100 | Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο της καρπόδεσης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας | 2/10 |
| ΣΙΤΑΡΙ (CFYBI), ΚΡΙΘΑΡΙ (HORVX), | Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i> (ERYSGR)), Σκωρίαση (<i>Puccinia sp.</i> (PUCCSP)), Σεπτόρια (<i>Septoria tritici</i> (SEPTTR)), Ελμυθοσπορίωση (<i>Helminthosporium sp</i> (HELMSP)), Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium sp</i> (RHYNSP)) | 100 | - | 15-30 | Ψεκασμοί μέχρι την αρχή άνθησης | 1 |

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Μην ψεκάσετε όταν τα φυτά είναι σε στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, τροφωπενίες κλπ)
3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πάνω από 2 φορές ανα καλλιεργητική περίοδο

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**
 -Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
 -Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 -Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα περισσότερες φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, από αυτές που συνιστάται.
 -Εφαρμόζετε το προϊόν νωρίς, όταν η πίεση της προσβολής είναι μικρή.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
 Σε καταστάσεις υδατικού ή κλιματολογικού στρες σε σιτηρά, πιθανόν να εμφανιστεί χλώρωση των κορυφών των φύλλων

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261 Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια
SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
 Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P302+P352: AN ΠΙΞΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι
Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε ελαφρές περιπτώσεις, ο παθών να μείνει υπο παρακολούθηση και να κληθεί αμέσως γιατρός αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σε βαριές περιπτώσεις, καλέστε αμέσως γιατρό ή ασθενοφόρο.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.
Σε περίπτωση κατάποσης: Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό και να πιει 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα, αλλά μην προκαλέσετε εμετό. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια
Οδηγίες για τον γιατρό: Μετά την κατάποση του flutriafol, μπορεί να εμφανισθεί ναυτία, εμετός, πόνος στην κοιλιά και διάρροια.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

| Καλλιέργειες | Ημέρες |
|---|--|
| Ροδακινιά | 7 ημέρες |
| Μηλιά, Αχλαδιά | 21 ημέρες |
| Αμπέλι | 21 ημέρες |
| Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) | 3 ημέρες |
| Φράουλα (Υπαίθρου) | 3 ημέρες |
| Σιτάρι, Κριθάρι | Μη εφαρμόσιμο (μέχρι αρχή της άνθησης) |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από συνθήκες πάγου παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών:** Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:** Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:
 -Δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας από τη χώρα μας, για τις ποικιλίες αχλαδιάς κρυστάλλι ή κοντούλα.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **6513** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) IMPACT 125 SC (δρ. ουσία: flutriafol), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 75774/8.6.90 Απόφασή μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ