

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΗΜΕΙΟ 5. Παρατηρήσεις)

Αθήνα, 12 - 12 - 2017

Αριθ. πρωτ: 6497/63089

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι

E-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: 1. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **RACER 25 EC (δραστική ουσία flurochloridone)**
2. Ανάκληση της υπ' αρ. 7421 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **RACER 25 EC (δραστική ουσία flurochloridone)**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία flurochloridone.
7. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

8. Τη με αριθμ. 7421 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RACER 25 EC, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 91737/15-11-1990 Υπουργική Απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί και ανανεωθεί.
9. Την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής της Ισπανίας του Απριλίου 2016.
10. Τις υπ' αρ. 6056/65434/30-05-2013 και 6497/63089/12-06-2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **RACER 25 EC (δραστική ουσία flurochloridone)** της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

70261

12.12.2017

31.05.2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

RACER 25 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Flurochloridone

trans flurochloridone: 720-740 g/kg

cis flurochloridone: 220-240 g/kg

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Min 940 g/Kg

Χημική ομάδα

-

Παρασκευαστής

ADAMA Agan, Ltd.

Northern Industrial Zone,

P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

Dr. Tali Ehrlich

Tel.: + 972-8-6296759

Fax : + 972-8-6296848

E-mail: tali.ehrlich@ma-industries.com

European address

ADAMA Agriculture BV.

c/o Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Str. 6

51149 Köln, Germany

Mr. Wolfgang Busch

+49 2203 5039-501

E-mail: Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA Agan, Ltd.
 Northern Industrial Zone,
 P.O. Box 262, 77102 Ashdod
 Israel

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Flurochloridone**, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ, στο Part C της Έκθεσης Αξιολόγησης της Ισπανίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73
 Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax: 211 120 5572
 E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της άδειας

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Agan, Ltd.
 Northern Industrial Zone,
 P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel
 Dr. Tali Ehrlich
 Tel.: + 972-8-6296759
 Fax : + 972-8-6296848
 E-mail: tali.ehrlich@ma-industries.com

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA Agan, Ltd.
 Northern Industrial Zone,
 P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA Agan, Ltd.
 Northern Industrial Zone,
 P.O. Box 262, 77102 Ashdod
 Israel
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Διεύθυνση εργοστασίου:
 Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **flurochloridone** 25 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 73,9 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ, στο Part C της Έκθεσης Αξιολόγησης της Ισπανίας.

2

Συσκευασία(ες)**2.2 Συσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900 κ.εκ & 1 λίτρου	Πλαστικό τύπου COEX
2	Δοχείο	1.5, 2, 3, 4.5, 5 και 10 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX (PE/PA)
3	Δοχεία	15 & 20 λίτρων	Πλαστικό τύπου ΗΜWHDPE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολεόπτιλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των καρωτινοειδών που εμποδίζει τη φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πατάτα (SOLTU)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων ⁽⁴⁾	150-200	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Καρότο (DAUCS) και άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά (Κοκκινογούλια BEAVX , Παστινάκη PAVSA , Ρίζα μαϊντανού APUGR , Ραπάνια/Ραπανίδες RAPSR , Λαγόχορτα TROPS , Γουλιά BRANA , Γογγύλια BRRR)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων ⁽⁴⁾	150-300	--	20 - 30	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Σελινόριζα (APUGD)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων ⁽⁴⁾	150				
Βαμβάκι (GOSHI)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων ⁽⁴⁾	100 - 150	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
Ηλίανθος (HELAN)	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων ⁽⁴⁾	150-300	--	20 - 40	Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνετε με την εδαφική υγρασία. 2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα. 3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας. Το φαινόμενο 						

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

4) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια**Ευαίσθητα**

Δόση 100 κ.εκ/στρ

Τάτουλας (*Datura stramonium*, **DATST**),
 Ζωχος (*Sonchus oleraceus*, **SONOL**),
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*, **CHEAL**)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*, **LAMAM**),
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea*, **POROL**)

Δόση 150 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*, **ANGAR**),
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, **POLPE**),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*, **SENVU**),
 Σετάρια (*Setaria viridis*, **SETVI**),
Solanum physalifolium (**SOLPS**).

Δόση 200 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
 Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*, **MERAN**),
 Αγριοπανσές (*Viola arvensis*, **VIOAR**)
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*, **SOLNI**)

Δόση 300 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)

Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, **POLAV**),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, **ECHCG**),
 Στριγγλόχορτο (*Atriplex patula*, **ATXPA**),
 Κίτσια spuria (**KICS**),
 Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*, **MATCH**),

Μετρίως Ευαίσθητα

Δόση 100 κ.εκ/στρ

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
Solanum physalifolium (**SOLPS**),
 Σετάρια (*Setaria viridis*, **SETVI**)

Δόση 150 κ.εκ/στρ

Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, **AMARE**),
 Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*, **POLAV**),
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*, **XANST**)

Δόση 200 κ.εκ/στρ

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, **ECHCG**),
 Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
 Ηλιοτρόπιον (*Heliotropium europaeum*, **HEOEU**),
 Πολυκόμπι (*Polygonum avicularae*, **POLAV**),
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*, **XANST**).

Δόση 300 κ.εκ/στρ

Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus*, **POLCO**),
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*, **POLPE**)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--


- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	Δεν απαιτείται
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας αντικατάστασης και αφού προηγηθεί όργωμα του εδάφους. Στην περίπτωση των σιτηρών, συστήνεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Σε πρόγραμμα αμειψισποράς μπορεί να ακολουθούν οι εξής καλλιέργειες: Σόγια, αραβόσιτος και σόργο μπορούν να φυτευτούν μετά την καλλιέργεια του ηλίανθου ή της πατάτας. Τα μπιζέλια, η εαρινή ελαιοκράμβη, τα ζαχαρότευτλα, οι κράμβες και κτηνοτροφικά τεύτλα δεν πρέπει να σπαρθούν ως επόμενες καλλιέργειες ή ως καλλιέργειες αντικατάστασης.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού**H360Df** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.**EUH401** «Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

11

Δηλώσεις
προφύλαξης**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκφενώματα.**P270:** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση»

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή. Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ κλειστής καμπίνας.»

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό»

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P501** Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**SPe2** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου και καρότου, σελινόριζας και άλλων ριζωματώδων και κονδυλωδών λαχανικών.**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, σελινόριζας και άλλων ριζωματώδων και κονδυλωδών λαχανικών, και **10 μέτρων** στην καλλιέργεια του βαμβακιού.**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους:

Στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, σελινόριζας και άλλων ριζωματώδων και κονδυλωδών λαχανικών:

- να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη ή
- να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, ή
- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Στη καλλιέργεια του βαμβακιού:

- να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γεωργική γη ή

- να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P304 + P340 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337 + 313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P310+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα, Καρότο, Σελινόριζα και άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά, Βαμβάκι, Ηλιάνθος.	Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β

Ανακαλούμε τη με αριθμό **7421** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **RACER 25 EC**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 91737/15-11-1990 Υπουργική Απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί και ανανεωθεί.
Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις (3) επιπλέον μήνες (έως τις 12 - 03 -2018).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι (6) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 12 - 06 -2018).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 12 - 06 -2019).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 12 - 06 -2019 (Παρ. Β.3.), θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**