

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Αθήνα, 15.12.2017  
Αριθμ. πρωτ: 11181/108162

Προς: ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
Μιχαλακοπούλου 29,  
Αθήνα  
e-mail: [alexis.katsivas@monsanto.com](mailto:alexis.katsivas@monsanto.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Roundup 60 (δ.ο. glyphosate) για ερασιτεχνική χρήση».**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και τον Κανονισμό (ΕΕ) ) με αριθμό 2016/1056 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τη με αριθμό πρωτ. 9519/105300/21.08.2014 (ΦΕΚ 2331/Β/29.08.2014) Απόφαση Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την αξιολόγηση και την έγκριση από τη Γαλλία του όμοιου σκευάσματος ROUNDUP MICRO [αριθ. έγκρισης ΑΜΜ n° 2150384].

10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7276/70951/30.06.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα υπ' αριθ. πρωτ. 11181/108162/13.10.2017 συμπληρωματικά στοιχεία.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Roundup 60** της εταιρείας **ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70262

15.12.2017

15.12.2018

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

Roundup 60

Πυκνό διάλυμα (SL)

**1.3 Δραστικές ουσίες****Δραστική Ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

glyphosate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

95 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Φωσφονογλυκινών

Παρασκευαστής

Monsanto Europe SA/NV

Avenue de Tervuren 270-272

B – 1150 Brussels Βέλγιο

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

- 1. Monsanto SA/NV**  
Haven 627, Scheldelaan 460  
B-2040 Antwerp, Βέλγιο
- 2. Monsanto Co**  
Highway 18, River Road  
Luling, LA 70070, ΗΠΑ
- 3. Monsanto do Brasil Ltda.**  
Av. Carlos Marcondes 1200  
Bairro do Limoeiro, Caixa Postal 941  
Sao Jose dos Campos 12241-900, Βραζιλία
- 4. Monsanto Zarate plant**  
Ruta 12-Km. 83.100  
Zarate 2800, Αργεντινή
- 5. Monsanto Co, Muscatine Plant**  
2500 Wiggins Road  
Muscatine, Iowa 5761, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας glyphosate όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 9-5-2006 (Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 118393) έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ**  
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα  
ΑΜΕ: MOD GR  
Τ.Κ. 115 28  
Τηλ: 210 7259435  
Fax: 210 7259439  
E-mail: [alexis.katsivas@monsanto.com](mailto:alexis.katsivas@monsanto.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Monsanto Europe SA/NV**  
Avenue de Tervuren 270-272  
B – 1150 Brussels Βέλγιο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Monsanto Europe SA/NV**  
Haven 627  
Scheldelaan 460  
B – 2040 Antwerp, Βέλγιο

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Monsanto Europe SA/NV**  
 Haven 627  
 Scheldelaan 460  
 B – 2040 Antwerp, Βέλγιο

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** Glyphosate οξύ: 6 % β/ο  
 (υπό μορφή άλατος καλίου: 7,4% β/ο)  
**Βοηθητικές ουσίες:** 94,26 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7276/70951/30.06.2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος                                      | Υλικό                                     |
|-----|-------|--|---|
| 1   | Φιάλη | 125, 140, 250, 280, και 500 κ.εκ,<br>1 λίτρο | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας<br>(HDPE) |

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για ερασιτέχνες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Χρησιμοποιείται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων σε εντοπισμένες εφαρμογές για την καταστροφή ετησίων και πολυετών ζιζανίων σε ερασιτεχνικούς κήπους.

**Προσοχή:** Είναι διασυστηματικό καθολικό ζιζανιοκτόνο και το ψεκαστικό διάλυμα δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με τους βλαστούς φύλλωμα ή καρπούς των καλλιεργούμενων φυτών ή άλλων γειτονικών φυτών για να μη ζημιωθούν.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Με τη βοήθεια του πώματος-δοσομετρητή, ρίξτε την απαραίτητη δόση στον ψεκαστήρα και στη συνέχεια συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μετά τη χρήση του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| 5 Φάσμα δράσης  |  |  |  |                                     |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής   | Στόχος   | Δόσεις του σκευάσματος σε κυβ. εκατοστά αραιωμένα σε 0,5L νερού στον ψεκαστήρα/ 15 τετραγωνικά μέτρα (m <sup>2</sup> ) | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος |
| Ερασιτεχνικοί κήποι με καλλιεργούμενα φυτά όπως:<br><u>Εσπεριδοειδή:</u><br>πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κιτριά, γκρέιπ φρουτ<br><u>Ακρόδρυα:</u><br>αμυγδαλιά, καρυδιά, φιστικιά<br><u>Μηλοειδή:</u><br>μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά<br><u>Πυρηνόκαρπα:</u><br>βερικοκιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, κερασιά<br><u>Αμπέλι:</u><br>επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο<br><u>Ελιά:</u><br>επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη | Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια                                 | 25 κ.εκ.   | Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.  | 1                                   |
|   | Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια και διετή ζιζάνια              | 45 κ.εκ.   | Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.  | 1                                   |
|   | Πολυετή ζιζάνια ή δύσκολα αγρωστώδη / πλατύφυλλα ζιζάνια | 60 κ.εκ.   | Εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή. | 1                                   |
| Ερασιτεχνικοί κήποι : πριν την σπορά/φύτευση της όποιας καλλιέργειας ή μετά την συγκομιδή των καλλιεργειών  | Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια                                 | 25 κ.εκ.   | Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.  | 1                                   |
|   | Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια και διετή ζιζάνια              | 45 κ.εκ.   | Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.  | 1                                   |
|   | Πολυετή ζιζάνια ή δύσκολα αγρωστώδη / πλατύφυλλα ζιζάνια | 60 κ.εκ.   | Εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή. | 1                                   |
| Ερασιτεχνικοί κήποι: χρήση με πινέλο*   | Περικοκλάδες, βάτα, θάμνοι                               | 60 κ.εκ.   | Εφαρμογή κυρίως το φθινόπωρο κατά την ανθοφορία.   | 1                                   |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

\*επάλειψη μόνο των φυτών προς εξάλειψη με το διάλυμα. Η χρήση γαντιών είναι υποχρεωτική.

**Παρατηρήσεις**

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει άνεμος και αποφύγετε τον σχηματισμό εκνεφώματος.
3. Μη το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει δρόσος πάνω στα ζιζάνια ή πάχνη.
4. Μη το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας ή εφόσον επικρατεί παγετός.
5. Για βέλτιστα αποτελέσματα να εφαρμόζεται με μέτρια θερμοκρασία από 10 – 25 C<sup>0</sup>.
6. Να μην εφαρμόζεται στα προς διατήρηση ή τα καλλιεργούμενα φυτά, παρά μόνο στην ανεπιθύμητη βλάστηση.
7. Να μην εφαρμόζεται όταν βρέχει ή επίκειται βροχή στις επόμενες 6 ώρες για την αποφυγή έκπλυσης του.
8. Η σπορά ή επανασπορά καλλιεργούμενων φυτών επιτρέπεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή του.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
- Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην φθάνουν στην επιφάνεια του νερού.
- Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

7 ημέρες

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

7 ημέρες


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 9  | Εικονογράμματα κινδύνου    |  <p><b>GHS09</b></p>   |
| 10 | Δηλώσεις επικινδυνότητας   | <p><b>H411:</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.<br/> <b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>   |
| 11 | Δηλώσεις προφύλαξης        | <p><b>P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.<br/> <b>P405:</b> Μακριά από παιδιά.<br/> <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.<br/> <b>P234:</b> Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.</p> <p>Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.<br/> Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμόχρηστου σκευάσματος).<br/> Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.<br/> Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>SP1:</b> Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (μην ξεπλένετε τα υλικά εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά και αποφεύγετε την ρύπανση μέσω των συστημάτων απομάκρυνσης των νερών σε αυλές αγροκτημάτων ή δρόμους)<br/> <b>SPe3:</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.</p> |
| 12 | Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο | <p><b>Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:</b><br/> <u>Γενικά:</u> Μετακινείτε τον παθόντα από το χώρο εργασίας σε μέρος καλά αεριζόμενο και προστατέψτε τον από υποθερμία.<br/> <u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.<br/> <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.<br/> <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Χορηγείτε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.<br/> <u>Αντίδοτο:</u> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.<br/> <u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται.<br/> <b>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777</b></p>   |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες    |
|--|-----------|
| <b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά)<br><b>Εσπεριδοειδή</b> (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κιτριά)<br><b>Ακρόδρυα</b> (Αμυγδαλιά, Καρυδιά Φιστικιά)<br><b>Πυρηνόκαρπα</b> (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά)<br><b>Ελιές</b> (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες)<br><b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα) | 30 ημέρες |

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

**15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ μία ολοκληρωμένη μελέτη σταθερότητας του σκευάσματος κατά την αποθήκευση για 2 χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**