



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08 .01.2018  
Αριθ. πρωτ: 10355/100387 π.ε.

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: ΟΧΟΝ ΙΤΑΛΙΑ, SpA  
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας  
Απόστολου Σαμούδη, SIPCAM ΕΛΛΑΣ  
Μον. ΕΠΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,  
19400 Κορωπί)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CLICK SUPER (dimethenamid-p 26.5 % + terbuthylazine 30 % β/ο).

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **terbuthylazine**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.
4. Την Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, **dimethenamid-p**, picoxystrobin, fosthiazate και silthiofam ως δραστικές ουσίες.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθμό έγκρισης 70267/03-01-2018 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος MENTOR GOLD.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τις με αριθμό πρωτ. 10355/100387/26.09.2017 και 22/342/02.01.2018 αιτήσεις της εταιρείας Sircam Hellas.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CLICK SUPER** της εταιρείας OXON ITALIA, SpA Ιταλίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70268</b>
<b>08.01.2018</b>
<b>31.10.2019</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>CLICK SUPER</b>
Γαλάκτωμα - Εναιώρημα (SE)

**1.3 Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Dimethenamid-p</b>
-----------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

90,1 % β/β min
----------------

Χημική ομάδα

Χλωροακεταμίδια
-----------------

Παρασκευαστής

<b>BASF Corporation Crop Protection</b> 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709 ΗΠΑ
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

<b>BASF Corporation Agricultural Products</b> 14385 West Port Arthur Road Beaumont, Texas 77705 ΗΠΑ
---

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Dimethenamid-p της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε όπως προσδιορίζονται στην αίτηση της με αριθ. Πρωτ. 13760/160525/24.12.2013. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
--

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**1.3 Δραστική ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Terbutylazine**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98 % β/β min

Χημική ομάδα

Χλωροτριαζίνες

Παρασκευαστής

**OXON Italia S.p.A**  
Via Sempione 195  
20016, Pero (MI)  
Ιταλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**OXON Italia S.p.A.**  
Strada Prov.le Km 2.6  
27030 Mezzana Bigli, Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας terbutylazine όπως προσδιορίζονται στην αίτηση με αριθ. Πρωτ. 13895/161768/30.12.2013. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**OXON ITALIA, SpA**  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία  
Τηλ.: +39 02 35378235  
Fax: +39 (02) 3390 275  
E-mail: [EGallizia@oxon.it](mailto:EGallizia@oxon.it)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Α. Ον/νυμο: Chiara Palladini  
**OXON ITALIA, SpA**  
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία  
Τηλ.: +39 02 35378235  
Fax: +39 (02) 3390 275  
E-mail: [CPalladini@oxon.it](mailto:CPalladini@oxon.it)  
  
**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834  
Fax: 210 5223 139  
E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**  
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 32  
 Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
 Τηλ.: 210 5223 834  
 Fax: 210 5223 139  
 E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SIPCAM S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto 81,  
 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**SIPCAM S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto 81,  
 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**SIPCAM S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto 81,  
 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: **dimethenamid-p** 26.5 % β/ο  
**terbuthylazine** 30 % (β/ο)  
 Βοηθητικές ουσίες: 45,7 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 13895/161768/30.12.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του όμοιου σκευάσματος TERDIM.

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Πλαστικές φιάλες	50, 100, 500 ml και 1, 2.5, 3, 5, 6, 10, και 20 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2-3 ατμόσφαιρες, χρησιμοποιώντας 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά το 1/2 με νερό. Προσθέτουμε το φάρμακο αναδεύοντας καλά. Συνεχίζοντας την ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα τρεις φορές, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό μέσο.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες αφού έχουν ξεπλυθεί υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή μετά από τριπλό ξέπλυμα και έχουν καταστραφεί με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το CLICK SUPER είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο, ευρέως φάσματος, ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Είναι μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbutylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbutylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα II), ενώ το dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμμ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καλαμπόκι ΖΕΑΜΧ	Ετήσια* αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200 - 280	20-40	Προφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια	1
Καλαμπόκι ΖΕΑΜΧ	Ετήσια* αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200-250	20-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια στο στάδιο από ένα έως τρία πραγματικά φύλλα	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Παρατηρήσεις:**

1. Η μικρή δόση εφαρμόζεται σε ελαφρά και η μεγάλη σε βαριά εδάφη.
2. Για να έχουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα απαιτείται εντός δύο εβδομάδων, βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει άρδευση.
3. Το προϊόν δεν δρα σε τυρφώδη εδάφη.
4. Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση των 280 κ.εκ./στρ.
5. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος MENTOR GOLD στην καλλιέργεια του καλαμποκιού σε αμμώδη εδάφη και περιοχές με υψηλή βροχόπτωση.

**\* Ευαίσθητα ζιζάνια:****A. Αγρωστώδη ζιζάνια:**

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli-ECHCG*), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum-PANDI*), Σετάρια (*Setaria viridis-SETVI*), Σπονδυλωτή σετάρια (*Setaria verticillata-SETVE*), Αιματόχαρτο (*Digitaria sanguinalis-DIGSA*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense-SORHA*).

**B. Πλατύφυλλα ζιζάνια:**

Βλήτα (*Amaranthus spp.-AMASS*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare-POLAV*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum-SOLNI*), Λουβουδιά (*Chenopodium album-CHEAL*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea-POROL*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria-POLPE*), Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium-POLLA*), Πολύγωνο (*Polygonum convolvus-POLCO*), Βερόνικα (*Veronica persica-VERPE*), Κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis-VIOAR*), (*Atriplex patula- ATXPA*), *Solanum physalifolium* (SOLPS).

**\* Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti-ABUTH*), Ξάνθιο (*Xanthium spp.-XANSS*), Τάτουλας (*Datura stramonium DATST*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.-MATSS*).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
- Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για παραγωγή σπόρου.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών θα πρέπει να παρέλθει από την εφαρμογή του προϊόντος για τη σπορά σιταριού και 10 μηνών για τη σπορά άλλων καλλιεργειών όπως τεύτλα και καπνός.  
Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει καλή κατεργασία του εδάφους πριν τη σπορά τους.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.  
Αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το προϊόν με γειτονικές καλλιέργειες.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου

**ΠΡΟΣΟΧΗ****GHS07****GHS09**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.  
**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.  
**P261:** Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις /αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  
Η εφαρμογή να γίνεται με **τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου**.  
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό να φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Γενικές πληροφορίες:** Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες, Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγείτε οξυγόνο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P301+P312:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

Μην προκαλείτε εμετό.

**P305+351+338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε με νερό προσεκτικά για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε. /Επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:**

Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλαμπόκι	Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το CLICK SUPER παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασία <math><40^{\circ}</math> C, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας, προστατευμένο από το ηλιακό φως.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**15** **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Η παρούσα άδεια θα ανακληθεί εάν ο κάτοχος της έγκρισης δεν υποβάλει στη ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμό πρωτ. 6260/6106/03.01.2018 Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος MENTOR GOLD και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η ίδια απόφαση.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**