

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.02.2018  
Αριθ. πρωτ: 6919/67626 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20,  
151 25, Μαρούσι  
e-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

ΘΕΜΑ: “Α. Επανεγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CHALLENGE 600 SC (aclonifen 60% β/ο).  
Β. Ανάκληση της με αριθ. 7569 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CHALLENGE 600 SC (aclonifen 60% β/ο)”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/195 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 (πρόγραμμα ανανέωσης AIR IV), στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **aclonifen**.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

7. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τη με αρ. 8600243 έγκριση του όμοιου σκευάσματος **CHALLENGE 600** στη Γαλλία και τη σχετική αξιολόγηση.
10. Το με αριθ. 6919/67626/22.06.17 έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 819/10515/27.01.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CHALLENGE 600 SC** της εταιρείας **Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70272</b>
<b>23.02.2018</b>
<b>31.07.2023</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>CHALLENGE 600 SC</b>
<b>Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)</b>

##### **1.3 Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>aclonifen</b>
------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

<b>97% (β/β) min</b>
----------------------

Χημική ομάδα

<b>Διφαινυλαιθέρες</b>
------------------------

Παρασκευαστής

<b>Bayer S.A.S.</b>
---------------------

Division CropScience 16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία
---

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**1. BASF Agri Production**

Rue de Verdun, BP125  
F-76410 - Saint Aubin les Elbeuf, Γαλλία

**2. Deccan Fine Chemicals (India) Pvt. Ltd.**

Plot No. 6301-10A & 6008-10,  
GIDC Industrial Estate,  
Ankleshwar – 393002,  
Dist. Bharuch, Gujarat; Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας aclofen της εταιρείας Bayer S.A.S. όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 819/10515/27.01.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Bayer Ελλάς ABEE**

Σωρού 18-20 Μαρούσι  
ΑΜΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685  
Τ.Κ. 151 25  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
E-mail: [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Bayer Ελλάς ABEE**

Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι  
Τ.Κ.: 151 25  
Τηλ.: 210 6166374  
Fax: 210 6109100  
E-mail: [nikos.tsakalis@bayer.com](mailto:nikos.tsakalis@bayer.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα):

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Bayer S.A.S.**

Division Crop Science  
16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106  
F-69266 Lyon Cedex 09  
Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Arysta Lifescience SAS**  
Av. Du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
- 2. Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG**  
Stader Elbstraße 26  
21683 Stade, Γερμανία
- 3. Bayer AG**  
Industriepark Höchst  
65926 Frankfurt, Γερμανία
- 4. Imperial Chemical Logistics GmbH**  
Niederlassung Wolfenbüttel  
Wendessener Strasse 11c  
38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
- 5. Bayer SAS, Division Crop Science**  
Site de Marle  
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2  
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, Γαλλία
- 6. Phyteurop S.A.**  
ZI de la Grande Champagne  
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 7. Schirm GmbH**  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
- 8. Bayer SAS, Division Crop Science**  
Industrial Operations – Villefranche  
1 boulevard Edouard Herriot  
69400 Villefranche-Limas, Γαλλία
- 9. Bayer CropScience LP**  
8400 Hawthorn Road  
Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Bayer SAS, Division Crop Science**  
Site de Marle  
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2  
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: aclonifen 60% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 48,88% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 819/10515/27.01.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2**

### Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/Δοχείο	400 και 500 κ.εκ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15 και 20 λίτρα.	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

**3**

Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

#### Τρόπος εφαρμογής:

Για εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά, συστήνεται να εφαρμόζεται σε καλά προετοιμασμένο χωράφι (ψιλοχωματισμένο), οπότε σχηματίζεται ένα φιλμ στην επιφάνεια. Όταν φυτρώσουν τα ζιζάνια απορροφάται από το υποκοτύλιο και τις κοτύλες ή το κολεόπτילו στα αγρωστώδη και τα ζιζάνια νεκρώνονται λίγες μέρες αργότερα. Χρησιμοποιείστε 10-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, με πίεση 2-3 atm (30-45 psi) και μπεκ σκούπας. Ψεκάστε ομοιόμορφα σε νηνεμία, με τη μπάρα κοντά στο έδαφος και με προσοχή να μην προκαλέσετε ζημιά σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (ζαχαρότευτλα, οπωροφόρα δένδρα).

#### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 3/4 με νερό. Ανακινείστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση με μέτρια ταχύτητα.

#### Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Καθαρίστε και ξεπλύνετε πολύ καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού αμέσως μετά τον ψεκασμό.

#### Συνδυαστικότητα: --

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Συσκευασίες: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

Το aclonifen έχει περιορισμένη μετακίνηση μέσα στα ζιζάνια, ενώ βιοχημικά δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών. Δρα κυρίως στους βλαστούς, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στα νεαρά ζιζάνια που βλάστησαν πρόσφατα ή που βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. Μετά την εφαρμογή του CHALLENGE 600 SC τα ζιζάνια εμφανίζουν λεύκανση και χλώρωση του νεαρού βλαστού καθώς αυτός αναπτύσσεται.

5 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Ψυχανθή λαχανικά  Κουκιά – VICFX Λούπινα - LUPSS Μπιζέλια (ξηρά) - PIBSX Μπιζέλια (φρέσκα χωρίς Λοβό) – PIBSX Ρεβίθια - CIEAR Φακές – LENCU Φασόλια (ξηρά) - PHSVX	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u>  Αγριοσινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> – SINAR) Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> – CHEAL)	250-400	10-30	Προφυτρωτικά	1
Σκιαδοφόρα  Άνηθος - AFEGR Μαϊντανός – PARCR Μάραθος - FOEVU Παστινάκη - PAVSA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u>  Ζωχοί ( <i>Sonchus sp.</i> - SONSS) Κοινή πτόα ( <i>Roa annua</i> - POAAN) Τσουκνίδα μικρή ( <i>Urtica urens</i> - URTUR)	250	15-40	Προφυτρωτικά	1
Καρότο - DAUCA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u>  Ζωχοί ( <i>Sonchus sp.</i> - SONSS) Κοινή πτόα ( <i>Roa annua</i> - POAAN) Τσουκνίδα μικρή ( <i>Urtica urens</i> - URTUR)	250	15-40	Προφυτρωτικά	1
Ηλίανθος - HELAN	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u>  Βλήτο τραχύ ( <i>Amaranthus retroflexus</i> - AMARE) Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> – CHEAL)	250-400	10-30	Προφυτρωτικά	1

Πατάτα - SOLTU	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Βλήτα ( <i>Amaranthus</i> sp. - AMASS) Γλυστρίδα ( <i>Portulaca oleraceae</i> - POROL) Ζωχός ( <i>Sonchus oleraceus</i> - SONOL) Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> – CHEAL) Μεγαλόκαρπη Κολλητοίδα ( <i>Galium</i> sp. - GALSS) Παπαρούνα ( <i>Rapaver rhoeas</i> - PAPRH) Σετάρια ( <i>Setaria</i> sp. - SETSS) Τάτουλας ( <i>Datura stramonium</i> - DATST) Τσουκνίδα μικρή ( <i>Urtica urens</i> - URTUR)	250-400	10-30	Προφυτρωτικά	1
Καπνός - NIOTA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Βλήτα ( <i>Amaranthus</i> sp. - AMASS) Γλυστρίδα ( <i>Portulaca oleraceae</i> - POROL) Τριβόλι ( <i>Tribulus terrestris</i> - TRBTE)	250	15-40	Προφυτρωτικά την ημέρα της μεταφύτευσης, πριν από τη φύτευση του καπνού.	1
Αγκινάρα - CYUSC	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Αγριοσινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> – SINAR) Βλήτο τραχύ ( <i>Amaranthus retroflexus</i> - AMARE) Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> – CHEAL)	250	20-50	Προφυτρωτικά	1
Κρεμμύδι - ALLCE Σκόρδο - ALLSA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Αγριοσινάπι ( <i>Sinapis arvensis</i> – SINAR) Βλήτα ( <i>Amaranthus</i> sp. - AMASS) Τσουκνίδα μικρή ( <i>Urtica urens</i> - URTUR)	250	15-40	Προφυτρωτικά	1
<b>Παρατηρήσεις:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Προκειμένου για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζιζανίων συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε καλά προετοιμασμένο έδαφος χωρίς σβόλους. Να μην ενσωματώνεται το σκεύασμα.</li> <li>2. Οι μικρότερες δόσεις χρησιμοποιούνται σε ελαφρά εδάφη, ενώ οι μεγαλύτερες σε βαριά αργιλώδη εδάφη.</li> </ol>					

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.
  - Να μην χρησιμοποιείται σε πρώιμες πατάτες.
  - Να μην χρησιμοποιείται σε πατάτες ποικιλίας 'Mona Lisa' σε ασβεστώδες έδαφος.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προς-τατευόμενης καλλιέργειας
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας πατάτας στην οποία εφαρμόστηκε το CHALLENGE 600 SC, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρούν μετά την πάροδο 3 εβδομάδων, αραβόσιτος, ηλίανθος, σόγια, φασόλια και σόργο, μετά από όργωμα του εδάφους.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- Για αμειψισπορά, υπό κανονικές συνθήκες, είναι απαραίτητη η πάροδος ενός έτους μετά την εφαρμογή του CHALLENGE 600 SC.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 6 ώρες
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου
- ΠΡΟΣΟΧΗ**
- 
- GHS08 GHS09**
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H351:** Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208:** Περιέχει aclonifen και 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **40 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης **20 μέτρων** για τις καλλιέργειες του **φασολιού, μπιζελιού, κουκιού, ανήθου και μαϊντανού, 30 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης **10 μέτρων** για την καλλιέργεια της **πατάτας, 20 μέτρων** συμπεριλαμβανομένης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες του **μάραθου** και του **κρεμμυδιού** από τα **επιφανειακά νερά**.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** για τις καλλιέργειες των **λούπινου, φακής, ρεβιθιού, ηλίανθου και σκόρδου** και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες του **καπνού, παστινάκης, καρότου** και **αγκινάρας** από τα **επιφανειακά νερά**.

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

**P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:**

**Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Συμπτώματα:**

Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

**Θεραπεία:**

Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αγκινάρα, Ηλίανθος, Καπνός, Κουκιά, Λούπινα, Μπιζέλια (ξηρά), Μπιζέλια (φρέσκα χωρίς λοβό), Πατάτα, Ρεβίθια, Φακές, Φασόλια (ξηρά)	-
Καρότο, Παστινάκη, Σκόρδο	70
Άνηθος, Κρεμμύδι, Μαϊντανός, Μάραθος	90

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- An ILV of method M-262314-0 1-1 (Bourgade C., Diot, R.2005) for the determination of aclonifen residues in matrices which are difficult to analyze (tobacco).
- A confirmatory method and an ILV of method DFGS19 for the determination of aclonifen residues in food of animal origin.
- A confirmatory method for the determination of aclonifen residue (aclonifen) in soil.
- Additional residue data for carrot, in order to show that MRLs at the LOQ for minor uses extrapolated from carrot results (Angelica, Lovage, Gentian), will not be exceeded at the intended GAPs.
- Efficacy and Selectivity trials for onion and garlic.

**B**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. **7569** έγκριση κυκλοφορίας του **φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CHALLENGE 600 SC (aclonifen 60% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 93205/26.03.1999 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Γ****Γενικές υποχρεώσεις:**

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

6. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
7. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
8. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
10. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**