



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12 - 10 - 2018
Αριθ. πρωτ: 9168/120374

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 9287224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας
Ανθούσα Αττικής
TK 153 49
e-mail:
Voula.Kalliakaki@syngenta.com
leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60661 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Elatus Era (Benzovindiflupyr 7,5% β/ο + prothioconazole 15% β/ο) ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο. prothioconazole καθώς επίσης και τις δόσεις του σκευάσματος στο φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 3507/34692/01.02.2018 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60661 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Elatus Era (δ.ο. Benzovindiflupyr 7,5% β/ο + prothioconazole 15% β/ο).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".
5. Τη με αριθμό πρωτ. 6420/87494/20.6.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 4571/62338/30.04.2018 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 6405/87382/20.06.2018, 9168/120374/07.09.2018 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60661 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Elatus Era (Benzovindiflupyr 7,5% β/ο + prothioconazole 15% β/ο), της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. 3507/34692/01.02.2018 απόφαση μας, ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο. prothioconazole καθώς επίσης και τις δόσεις του σκευάσματος στο φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **1.3.2** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική Ουσία 2**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Χημική ομάδα:

Παρασκευαστής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι TRZSS	Κίτρινη Σκωρίαση (<i>Puccinia striiformis</i> – PUCST), Καστανή Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i> -PUCRT), Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> -SEPTTR), Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i> -FUSASP)	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-69 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή
Ζέα (σπεלט TRZSP, ντίνκελ)	Κίτρινη Σκωρίαση (<i>Puccinia striiformis</i> – PUCST), Καστανή Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i> -PUCRT), Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> -SEPTTR), Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i> -FUSASP)	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-69 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή

Κριθάρι HORVX	Ελμινθοσπορίαση/ Δικτυωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora teres- PYRNTE</i>), Ρυγχοσπορίαση (<i>Rhynchosporium secalis- RHYNSE</i>), Ραμουλάρια (<i>Ramularia collo-cygni- RAMUCC</i>), Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei- PUCCHD</i>),	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος ξεσταχύασματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας)	1 εφαρμογή
Βρώμη AVESA	Σκωρίαση (<i>Puccinia coronata - PUCCCO</i>)	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος ξεσταχύασματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας)	1 εφαρμογή
Σίκαλη SECCE	Καστανή Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita- PUCCRT</i>), Ρυγχοσπορίαση (<i>Rhynchosporium secalis- RHYNSE</i>)	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-69 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή
Τριτικάλε TTLRI	Καστανή Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita- PUCCRT</i>), Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici- SEPTTR</i>), Ρυγχοσπορίαση (<i>Rhynchosporium secalis- RHYNSE</i>), Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.- FUSASP</i>)	50-100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-69 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης)	1 εφαρμογή
Παρατηρήσεις: Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Να χρησιμοποιείται τη μικρή δόση (50 κ.εκ./στρέμμα) προληπτικά ή σε περιπτώσεις που εμφανίζεται χαμηλής έντασης προσβολή.						

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 3507/34692/01.02.2018 απόφαση μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ