



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 9.03.2018
Αριθμ. πρωτ: 1954/28774

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: AGROTECHNICA OBEE
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 570 22 – Σίνδος, Θεσ/νίκης
Τ.Θ. 1112
e-mail: support@agrotechnica.gr
dkekridou@agrotechnica.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 7974 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL (δ.ο diquat) ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και του σκευάσματος, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και τα στοιχεία της προστασίας των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/841 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis στέλεχος: αq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazate, bromoxynil, carfentrazone ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, **diquat**, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum στέλεχος: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-m, methoxyfenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-metolachlor και trifloxystrobin.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 3627/41364/03.04.2012 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7974 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL (δ.ο.diquat).
6. Την έγκρισή του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) REGLONE 20 SL.
7. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Τις με αριθμό πρωτ. 11272/109041/17.10.2017 και 1954/28774/22.02.2018 αιτήσεις της εταιρείας **AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθμό 7974 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL (δ.ο.diquat), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 3627/41364/03.04.2012 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας και του σκευάσματος, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και τα στοιχεία της προστασίας των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.1.β**, **1.3^{ν)}**, **1.4^{ν)}**, **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7974
30.04.2012
30.06.2019

1.3 Δραστική ουσία

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.

Syngenta Crop Protection AG, CH 4002-Basel Ελβετία

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, CH 4002-Basel Ελβετία

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: -Πορτοκαλιά CIDSΙ -Μανταρινιά CIDRE -Λεμονιά CIDLI -Γκρέιπ Φρουτ CIDPA -Λιμεττία CIDAF -Φράπα CIDGR	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλά καθαρό νερό, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό, για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1

Πυρηνόκαρπα: -Ροδακινιά PRNPS -Βερυκοκιά PRNAR -Κερασιά PRNAV -Βυσσινιά PRNCE -Δαμασκηνιά PRNDO	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλιά καθαρό νερό, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1
Μηλοειδή: -Μηλιά MABSD -Αχλαδιά PYUCO -Κυδωνιά CYDOB	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλιά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1
Ακρόδρυα: -Αμυγδαλιά PRNDU -Φουντουκιά CYLAV -Φιστικιά PIAVE -Καστανιά CSNSA -Καρυδιά IUGRE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30 - 50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλιά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό, για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1

Ελιές OLVEU (ελαιοποιήσιμες)	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1
Αμπέλι VITVI	Πλατύφυλλα ζιζάνια	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μία καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1
Τριφύλλι TRFSS	<i>Cuscutasp.</i> CVCSS	200-250	30-50	Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη, ράντισμα μετά την κοπή.	1
Μηδική MEDSA	<i>Cuscutasp.</i> CVCSS	200-250	30-50	Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη,	1

				ράντισμα μετά την κοπή.	
Πατάτα SOLTU	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή.	400	30-50	Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάσετε όταν υπάρχει ξηρασία.	1
Μηδική για σποροπαραγωγή MEDSA	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή.	300-350	30-50	Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.	1
Φασόλια Γίγαντες- Ελέφαντες Πρεσπών PHSVX	<i>Galinsoga parviflora</i> GASPA	200-400	30-60	Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των φυτών	1
	Ξήρανση της καλλιέργειας	400	70	Ψεκασμός της καλλιέργειας 10-14 ημέρες πριν τη συγκομιδή	1

Παρατηρήσεις:

1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου, ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.

2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων, αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμπελιού.

3. Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

4.Υπολείμματα της καλλιέργειας Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Πρεσπών στα οποία έχει γίνει εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφή.

5.Σε ελαιώνες που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται να συγκομίζονται καρποί απευθείας από το έδαφος παρά μόνο όταν γίνεται χρήση διχτύων/ ελαιόπανων.

B.

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή: -Πορτοκαλιά -Μανταρινιά -Λεμονιά -Γκρέιπ Φρούτ -Λιμεττία -Φράπα	30 ημέρες
Πυρηνόκαρπα: -Ροδακινιά -Βερυκοκιά -Κερασιά -Βυσσινιά -Δαμασκηνιά	30 ημέρες
Μηλοειδή: -Μηλιά -Αχλαδιά -Κυδωνιά	30 ημέρες
Ακρόδρυα: -Αμυγδαλιά -Φουντουκιά -Φιστικιά -Καστανιά -Καρυδιά	30 ημέρες
Ελιές (ελαιοποιήσιμες)	30 ημέρες
Αμπέλι	30 ημέρες
Τριφύλλι	-
Μηδική	-
Πατάτα	10 ημέρες
Μηδική για σποροπαραγωγή	-
Φασόλια γίγαντες	4 ημέρες

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3627/41364/03.04.2012 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ