



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα, 14 - 5 - 2018  
Αριθ. Πρωτ. 3054/43654

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
Email: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: Α.Σ. ΠΙΠΕΡΙΑΣ  
ΠΙΠΕΡΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
Κοιν: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ  
Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **EXIREL 10 SE** (δραστική ουσία: *cyantraniliprole*), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια της **κερασιάς**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
4. Τη με αριθ. πρωτ.: 3054/43654 /21.03.2018 αίτηση του Α.Σ. ΠΙΠΕΡΙΑΣ, ως εκπροσώπου φορέων και καλλιεργητών κερασιάς από τις Π.Ε. Ημαθίας, Λαρίσης και Πέλλας.
5. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 485, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (δραστική ουσία: cyantraniliprole) στην καλλιέργεια της κερασιάς, για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ημαθίας, Λαρίσης και Πέλλας

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.608

22/05/2018

19/09/2018

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

EXIREL 10 SE

1.2.β Μορφή:

SE Γαλακτώδες αιώρημα

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Cyantraniliprole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Ομάδα ανθρανιλικών διαμιδίων
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	<b>DuPont International Operations Sàrl</b> 2, Chemin du Pavillon P.O. Box 50 CH-1218 Le Grand-Saconnex Geneva, Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>Synthesis</b> E. I. Du Pont de Nemours and Company Mobile Manufacturing Center Highway 43 Axis, Alabama 36505 UNITED STATES OF AMERICA  <b>Re-crystallisation</b> WeylChem US 2114 Larry Jeffers Road Elgin, SC 29045 UNITED STATES OF AMERICA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν στην παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο <a href="#">Παράρτημα I</a> και στο Part C. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ  
 ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα  
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα  
 ΤΗΛ.: 211 198 3903  
 FAX: +30 211 1097209  
 E-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ  
 ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα  
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα  
 ΤΗΛ.: 211 198 3903  
 FAX: +30 211 1097209  
 E-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ  
 ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα  
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα  
 ΤΗΛ.: 211 198 3903  
 FAX: +30 211 1097209  
 E-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl, Quai de l'Île 13 CH  
 1204 Geneva Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
**DuPont de Nemours (France) S.A.I.**  
 Agricultural Products  
 82, rue de Wittelsheim  
 BP9  
 F-68701 Cernay CEDEX  
 France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
 1. **DuPont de Nemours (France) S.A.I.**  
 Agricultural Products  
 82, rue de Wittelsheim  
 BP9  
 F-68701 Cernay CEDEX  
 France  
 2. **Cheminova Agro France S.A.S.**  
 Etablissement D'Uffholtz  
 23 Rue de la Scierie,  
 Uffholtz, France 68700

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 10 % β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες 89,15 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στην ζωνική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (Part C). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος (κ.εκ)	Υλικό
1	Φιάλη	50-75-100-150-200-250-500-750-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000	COEX HDPE/EVOH (High Density Polyethylene co-extruded with ethylene vinyl alcohol copolymer).

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Γεμίστε το βυτίο με νερό ως τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Διαλύστε καλά με ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση. Εάν το τελικό ψεκαστικό διάλυμα έχει pH >8 προσθέστε ρυθμιστή pH ή χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 4 ωρών.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού του βυτίου μια ακόμα φορά. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

**Συνδυαστικότητα:** -

- **Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το EXIREL™ είναι εντομοκτόνο σκεύασμα, επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών. Διαθέτει προνυμφοκτόνο δράση αλλά ανάλογα με το στόχο μπορεί να επιδείξει και ωο-προνυμφοκτόνο, ωοκτόνο ή ακμαιοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ στρέμμα (max)	Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<b>Κεράσια PRNAV</b>	<i>Δίπτερα:</i> <i>Drosophila suzukii</i> <i>DROSSU</i>		75		BBCH 79-87 Ελάχιστη δόση 75 κ.εκ/στρ ασχέτως όγκου ψεκ. διαλύματος.	2

**Παρατηρήσεις:**

Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό εντομοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών πληθυσμών εντόμων στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα. Τέτοιοι πληθυσμοί αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων ειδών.

Ένας πληθυσμός εντόμων θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο εντομοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του. Για την βέλτιστη διαχείριση της ανθεκτικότητας προτείνεται να

ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του IRAC για την ομάδα 28  
Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων  
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως  
απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.

Μην υπερβείτε τις 2 διαδοχικές εφαρμογές εντός χρονικού διαστήματος  
30 ημερών για τον ίδιο εχθρό και μην χρησιμοποιείτε μικρότερες δόσεις  
από τις συνιστώμενες.

Οι εφαρμογές να γίνονται με την συνιστώμενη δόση και να  
εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας  
με το ψεκαστικό υγρό.

Το EXIREL να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο  
και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο  
δράσης.

Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των  
εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη  
ανθεκτικότητας.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι  
εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα  
διαφορετικής ομάδας.

**Το δραστικό συστατικό ανήκει στην Ομάδα 28, σύμφωνα με την  
ταξινόμηση της επιτροπής IRAC (Insecticides Resistance Action  
Committee).**

Τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες κατά την  
περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών ή των ζιζανίων  
χρησιμοποιείτε το προϊόν τις ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές,  
ιδανικά μετά το πέρας της ημερήσιας δραστηριότητάς τους.  
Αποφύγετε τη μεταφορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε  
περιοχές εκτός της καλλιέργειας που αποτελούν κατάλληλα  
ενδιαίτηματα για τις μέλισσες.

**Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον  
ψεκασμό**


**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας  
μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου  
ή των ζώων στην καλλιέργεια  
στην οποία έχει εφαρμοστεί το  
σκεύασμα




**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας,  
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε  
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα  
προϊόντα τους.

**Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί  
σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας**

9	Εικονογράμματα κινδύνου:	 <p style="text-align: center;"><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p>
10	Δηλώσεις Επικινδυνότητας	<p><b>H315</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  <b>H317</b> Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  <b>H400</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
11	Δηλώσεις Προφύλαξης	<p><b>P405+P102</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  <b>P261</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα  <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  <b>P363</b> Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  <b>SP1</b> Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).</p> <p style="text-align: center;"><b>“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”</b></p>
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><u>Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο</u></p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).  <b>P333+P313</b> Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  <b>P302 + P352</b> Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο νερό  <b>P362+P364</b> Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής . Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.  <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Ζητείστε ιατρική συμβουλή . Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων . Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.  <b>Αντίδοτο:</b> Συμπτωματική θεραπεία.          Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.</p>

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κεράσι	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό για **3** χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι ως χρήστες για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση σύμφωνα με το παραπάνω φάσμα δράσης. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 19/11/2018, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 2.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 2.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
  - 2.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους.
  - 2.4. Λοιπές εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή/και μη χημικών μεθόδων για τη καταπολέμηση των στόχων που περιλαμβάνονται στο παραπάνω φάσμα δράσης, που χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες, σύμφωνα με την παρούσα, του εν λόγω φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

N. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ