



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14 - 06 - 2017  
Αριθ.πρωτ: 6171/84428

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 92 87225  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς ABEE  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 2 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Email: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) VERRESTA 10 EC ( δ.ο. cycloxydim).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τη με αριθμό n. 16289 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος VERRESTA στην Ιταλία και την σχετική αξιολόγηση.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
8. Τις με αρ. πρωτ. 12117/137126/31-10-2014 και 1095/14310/05-02-2015 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70285
14/06/2018
31/05/2022

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

VERRESTA 10 EC

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Cycloxydim
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % β/β min
Χημική ομάδα	Cycloxydim (χημική ομάδα: κυκλοεξαδιόνες)
Παρασκευαστής	BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Γερμανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cycloxydim όπως αυτές περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 12117/137126/31-10-2014 αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
 Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
 ΑΜΕ: ΒΑΣΓΡ  
 Τηλ.: 2106860120  
 Fax: 2106860200  
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
 Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
 ΑΜΕ: ΒΑΣΓΡ  
 Τηλ.: 2106860120  
 Fax: 2106860200  
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE  
 Carl-Bosch-Strasse 38  
 67056 Ludwigshafen  
 Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
 1) BASF SE  
 Carl-Bosch-Strasse 38  
 67056 Ludwigshafen  
 Γερμανία  
 2) Schirm GmbH  
 Standort Schönebeck  
 Geschwister-Scholl-Strasse 127  
 39218 Schönebeck  
 Γερμανία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen  
Γερμανία

2) Schirm GmbH  
Standort Schönebeck  
Geschwister-Scholl-Strasse 127  
39218 Schönebeck  
Γερμανία

3) Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης  
570 22 Σίνδος  
Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία cycloxydim 10 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 88.6 % β/β  
όπως αυτές περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 1095/14310/05-02-2015 αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	150 κ.εκ., 250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο	PA/PE (Coex) & Eco-PA/PE (Coex)
	Δοχείο	2,5 λίτρα, 3 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα	PA/PE (Coex) & Eco-PA/PE (Coex)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικοί ψεκασμοί.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, μέχρι τον προβλεπόμενο όγκο. Προσθέστε το προσκολλητικό DASH HC. Διατηρήστε συνεχώς σε λειτουργία τον αναδευτήρα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Ξεπλύνετε το ψεκαστικό μηχάνημα με νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Καύση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100°C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Το VERRESTA 10 EC μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, όπως για παράδειγμα με αυτά που περιέχουν τις δραστικές ουσίες bentazone, MCPA, penoxsulam και bensulfuron-methyl, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις και οδηγίες χρήσης τους. Να αποφεύγετε η συνδυαστικότητα του με σκευάματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες propanil και triclopyr καθώς μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα ανταγωνισμού.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** ---

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά αγρωστώδη ζιζάνια σε ρύζι ποικιλιών PROVISIA™ (ποικιλίες ανθεκτικές στο cycloxydim). Το VERRESTA 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των οξιμών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.
----------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι ποικιλιών PROVISIA™ (ORYSA)	<u>Ευαίσθητα ετήσια ζιζάνια</u> Κόκκινο ρύζι ( <i>Oryza sativa</i> , ORYSA) Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Echinochloa</i> spp., ECHCG), Αιματόχορτο ( <i>Digitaria sanguinalis</i> , DIGSA), Πάνικο ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> , PANDI, <i>P. miliaceum</i> , PANMI), Λεπτόχλοα ( <i>Leptochloa fascicularis</i> , LEFFA), Λεέρζια ( <i>Leersia oryzoides</i> , LEROR)	250 + 0.5% DASH HC	-	20-40	Κάνετε κατά το μέγιστο 2 εφαρμογές, στο διάστημα μεταξύ της έκπτυξης των 3 φύλλων ως το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού. Πρώτη εφαρμογή: Όταν το ρύζι είναι στο στάδιο των 3-4 φύλλων, αφού έχουν αδειάσει τα τηγάνια. Το νερό επανέρχεται στα τηγάνια 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεύτερη εφαρμογή: 2-4 εβδομάδες μετά την πρώτη	2

					εφαρμογή, ανάλογα με τον ρυθμό της εμφάνισης νέων ζιζανίων ή της αναβλάστησης των υπαρχόντων, αφού έχουν αδειάσει τα τηγάνια. Το νερό επανέρχεται στα τηγάνια 4 ημέρες μετά την εφαρμογή. Μέγιστη ετήσια δόση VERRESTA 10 EC είναι 500 κ.εκ./στρ.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρατηρήσεις:

1) Για τον βέλτιστο έλεγχο των ζιζανίων, καλό είναι τα ζιζάνια να είναι σε φάση ζωηρής ανάπτυξης και ιδανικά στο διάστημα από την έκπτυξη 3 φύλλων ως το μέσον του αδελφώματος. Τα ευαίσθητα ζιζάνια πρέπει να είναι πλήρως εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα κατά την εφαρμογή.

2) Το προϊόν εφαρμόζεται με ακροφύσια τύπου σκούπας, στην πίεση που ορίζεται από τον κατασκευαστή τους.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

A) Όλες οι καλλιέργειες μπορούν να ακολουθήσουν σε ένα φυσιολογικό πρόγραμμα αμειψισποράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, όλες οι δικοτυλήδονες καλλιέργειες και τα υβρίδια αραβοσίτου που είναι ανθεκτικά στο cycloxydim μπορούν να ακολουθήσουν αμέσως. Για τη φύτευση/σπορά καλλιεργειών της οικογένειας Graminae, συμπεριλαμβανομένου του αραβόσιτου (υβρίδια μη ανθεκτικά στο cycloxydim) πρέπει να περάσουν 4 εβδομάδες.

Β) Οι ποικιλίες ρυζιού PROVISIA™ δεν πρέπει να καλλιεργούνται για περισσότερες από μια καλλιεργητικές περιόδους στη σειρά και στον ίδιο αγρό. Για τη βέλτιστη διαχείριση της ανθεκτικότητας του κόκκινου ρυζιού, οι ποικιλίες ρυζιού PROVISIA™ πρέπει να εναλλάσσονται με ποικιλίες ρυζιού CLEARFIELD™ με χρήση του ζιζανιοκτόνου PULSAR® 4 SL (imazamox).

Χρησιμοποιήστε τις ποικιλίες ρυζιού PROVISIA™ σαν ένα εργαλείο για την καταπολέμηση δυσεξόντων ζιζανίων, όπως το κόκκινο ρύζι. Μετά τη συγκομιδή, συνιστάται να κάνετε αναμόχλευση του εδάφους του αγρού και να τον γεμίζετε με νερό, ώστε να προκαλείται η βλάστηση του κόκκινου ρυζιού τον χειμώνα και έτσι να μειώνεται ο πληθυσμός του την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Όταν οι πρακτικές διαχείρισης του νερού και του εδάφους το επιτρέπουν, κάνετε εναλλαγή των ποικιλιών ρυζιού PROVISIA™ με άλλες καλλιέργειες, χρησιμοποιώντας ζιζανιοκτόνα εδάφους ή/και μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

- 9** Σήμανση σκεύασματος:



**KINΔΥΝΟΣ**



**10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
**H361d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 Περιέχει: *solvent naphta*

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P102+405** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P260** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
**P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P301 + P310 + P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό.  
**P308 + P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P403 + P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.  
**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.  
  
**SP1** Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

Αν ο παθών έχει την τάση να χάσει τις αισθήσεις του, μεταφέρετέ τον και τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση (θέση ανάρρωσης). Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε 200-200 κ.εκ. νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι ποικιλιών PROVISIA™	Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΔΡ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**