



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 15/06/2018
Αριθ. πρωτ: 5977/81282**

**Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
176 71-ΑΘΗΝΑ**

**Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl
(δια της Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)**

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη

Τηλέφωνο: 210 928 7250

e-mail: mgaspari@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) MAXIM (δ.ο. triclopyr) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) και ως προς την επωνυμία του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/686 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl και **triclopyr** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους : Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 5977/81282/8-6-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Τροποποιούμε τα σημεία 1.4 δ), ε) 5 και 13.2 της με αριθ. 8259 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **MAXIM (triclopyr)**, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 10404/114066/14-10-2016 απόφασή μας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

- Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- Thomson & Capper Ltd, 9-12 Hardwick Road, Astmoor Industrial Estate, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

- Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- Thomson & Capper, Ηνωμένο Βασίλειο
- ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
- Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών
- ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ν. Κηφισιά Αττικής

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρέμμα	γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ						
Πορτοκαλιά [CIDSΙ] (ποικιλίες: κοινή, είδη Tarocco, Sallustiana, Navellina, Merlin, Moro)	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	15-37,5 (βέλτιστη δόση 25-30) [1,5-3,75 δισκία (βέλτιστη δόση 2,5-3)]	6-18,75 (βέλτιστη δόση 10-15) [0,6-1,88 δισκία (βέλτιστη δόση 1-1,5)]	200-250	Μετά τη φυσική καρπόπτωση και όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 25 χιλιοστά.	1

	Αποφυγή καρπόπτωσης	15-37,5 (βέλτιστη δόση 25) [1,5-3,75 δισκία (βέλτιστη δόση 2,5)]	6-18,75 (βέλτιστη δόση 10-12,5) [0,6-1,88 δισκία (βέλτιστη δόση 1-1,25)]	200-250	Μόλις πριν ή κατά την αλλαγή χρώματος του καρπού.	
Μανταρινιά [CIDRE] (ποικιλίες: κοινή, άσπερμες και όψιμες)	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	20-25 [2-2,5 δισκία]	8-12,5 [0,8-1,25 δισκία]	200-250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπόπτωση και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 20-22 χιλιοστά.	1
Κλημεντίνη		25-35 (2,5-3,5 δισκία)	10-17,5 [1-1,75 δισκία]	200-250	διάμετρος 18-22 χιλιοστά	
Κλεμενούλα		20-35 (2-3,5 δισκία)	8-17,5 [0,8-1,75 δισκία]	200-250	διάμετρος 20-24 χιλιοστά	
Σατσούμα, Νόβα - Κλημεντίνη		20-35 (2-3,5 δισκία)	8-17,5 0,8-1,75 δισκία		διάμετρος 22-26 χιλιοστά	
Λεμονιά [CIDLI] (ποικιλίες: κοινή, είδη Femminello, Monachello, Interdonato, Lunario)	Αύξηση μεγέθους καρπού, πρωιμότητα παραγωγής.	15-37,5 [1,5-3,75 δισκία]	6-18,75 [0,6-1,88 δισκία]	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 22 χιλιοστά (μέση διάμετρος 24-26 χιλιοστά).	1

Βερικοκιά [PRNAR]	Πρωίμηση ωρίμανσης καρπών, αύξηση μεγέθους καρπών, βελτίωση χρωματισμού καρπών και αύξηση παραγωγής.	12 [1,2 δισκία]	9,6-14,4 [0,96- 1,44 δισκία]]	80-120	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 20-24 χιλιοστά και όχι αργότερα.	1
Μηλιά [MABSD]	Αποφυγή καρπόπτωσης και αύξηση κόκκινου χρωματισμού σε ορισμένες ποικιλίες.	20 [2 δισκία]	13,3-66,6 [1,3-6,7 δισκία]	30-150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.	1
Αχλαδιά [PYUCO]	Αποφυγή καρπόπτωσης.	10-20 [1-2 δισκία]	6,66-66,6 [0,6-6,7 δισκία]	30-150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.	1
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ						
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες)	Διατήρηση κάλυκα καρπών	-	2 δισκία	100 λίτρα/ τόνο καρπών	Με διαβροχή, μετά τη συγκομιδή.	1

Παρατηρήσεις:

1. Να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης, κυρίως όσον αφορά τη δόση και τον χρόνο εφαρμογής.
2. Οι μικροί όγκοι ψεκαστικού υγρού να συνδυάζονται με τη μέγιστη δόση ανά εκατόλιτρο και αντίστοιχα οι μεγάλοι όγκοι ψεκαστικού υγρού με την ελάχιστη δόση ανά εκατόλιτρο, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.
3. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φυσικής καρπόπτωσης.
4. Μην ψεκάσετε φυτά που έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα και νεαρά φυτά σε φυτώριο, παρά μόνο ενήλικα φυτά.
5. Μην ψεκάσετε όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή έντονος άνεμος.
6. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στην όψιμη εποχή/εφαρμογή.
7. Εφαρμόστε σε υγιή φυτά, με επάρκεια υγρασίας και λίπανσης.
8. Μην εφαρμόζετε μαζί με κάλιο.
9. Μην εφαρμόζετε σε αχλάδια ποικιλίας Guyot.
10. Στη βερικοκιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας (σχίσσιμο καρπών, τοξικότητα στο φύλλωμα), μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μεταγενέστερο στάδιο ή σε μεγαλύτερη δόση από τα προτεινόμενα.

Η χρήση στην ακτινιδιά θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν ανώτατα όρια υπολειμμάτων σύμφωνα με τα παρακάτω :

Καλλιέργεια	Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής			Δόσεις εφαρμογής σκευάσματος			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
	Στόχος	Χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών (max)	γρ./ 100L min max	Όγκος ψεκ. υγρού L/στρ. min max	γρ. / στρ. min max		
Ακτινιδιά [ATIDE]	Αύξηση μεγέθους και βάρους καρπού.	30 ημέρες από το πέρας της ανθοφορίας ή μεταξύ 70 και 100 ημερών από το πέρας της ανθοφορίας	1	1,7-2,5 [0,17-0,25 δισκία] ή 8,3-12,5 [0,83-1,25 δισκία]	80 120	2 [0,2 δισκία] ή 10 [1 δισκίο]	60	Η εφαρμογή του προϊόντος στα δέντρα των ακτινιδιών σε πολύ όψιμη εποχή ή σε πολύ υψηλή δοσολογία, μπορεί να προκαλέσει μαρασμό ή/και μερική πτώση των φύλλων. Ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί αρνητική επίδραση στη ζωτικότητα ή τη μακροζωία της καλλιέργειας.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια) - χρήση μετά τη φυσική καρπόπτωση	120
Πορτοκάλια - χρήση για αποφυγή καρπόπτωσης	40
Βερίκοκα	60
Μήλα, Αχλάδια	21
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Κλημεντίνες)	3

B.

1. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ' ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ' ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 10464/119602ΠΕ/8-6-2016 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ