

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.07.2018
Αριθ. πρωτ: 7033/94620

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Μαιάνδρου 15,
11528 Αθήνα
E-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

ΘΕΜΑ: "Α. Επανεγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron).
Β. Ανάκληση της με αριθ. 7546 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron)."

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 704/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **azimsulfuron**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τη με αριθμό 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος **GULLIVER** στην Ιταλία [αριθ. έγκρισης n. 9181].

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Τις με αριθμό πρωτ. 13438/156573/17.12.2013 και 3542/38876/24.03.2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GULLIVER 50 WG της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70286
04.07.2018
31.12.2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

GULLIVER WG
ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

azimsulfuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% (β/β) min

Χημική ομάδα

σουλφονουλουρίες

Παρασκευαστής

FMC international Switzerland Sarl
Quai de l'Île 13 CH 1204 Geneva Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd.
Highway 686, Km. 2.3
P.O. Box 30000
Manati, Puerto Rico 00674-3000, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azimsulfuron όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 13438/156573/17.12.2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
ΤΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
 ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
 ΤΗΛ.: 211 198 3903
 FAX: +30 211 1097209
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
 ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
 ΤΗΛ.: 211 198 3903
 FAX: +30 211 1097209
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
FMC international Switzerland Sarl
 Quai de l'île 13 CH 1204 Geneva Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Cheminova Agro France S.A.S.
 Etablissement D'Uffholtz
 23 Rue de la Scierie, Uffholtz, 68700, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Cheminova Agro France S.A.S.
 Etablissement D'Uffholtz
 23 Rue de la Scierie, Uffholtz, 68700, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: azimsulfuron 50 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αίτηση με αρ. πρωτ. 13438/156573/17.12.2013 της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας.

2**Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βάζο	40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραμμ.	Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί
2	Βάζο	40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραμμ.	Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET)
3	Βάζο	40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραμμ.	Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 1-2 ατμόσφαιρες με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους με 20-40 λίτρα νερού/στρέμμα και μπεκ τύπου σκούπας. Αποφύγετε την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζεται το βυτίο του ψεκαστικού κατά το 1/4 με νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται στο βυτίο με συνεχή ανάδευση. Η απαιτούμενη ποσότητα επιφανειοδραστικού προστίθεται πάντοτε μετά την προσθήκη του GULLIVER. Απογεμίζετε το βυτίο με νερό και η ανάδευση συνεχίζεται τόσο κατά την διάρκεια του ψεκασμού, όσο και κατά τα τυχόν διαλείμματα. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το βυτίο και τη μπάρα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυμα καθαρισμού 0.5 λίτρα αμμωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε 100 λίτρα νερό. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της αντλίας, μπάρας και μπεκ για τουλάχιστον 15 λεπτά, με συνεχή ανάδευση. Αδειάστε ξανά.
3. Επαναλάβετε άλλη μια φορά το 2.
4. Γεμίστε τελείως το βυτίο με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά, οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την μπάρα.
5. Φίλτρα και μπεκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε ένα δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού (στην ίδια συγκέντρωση που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Το ψεκαστικό να μην στραγγίζετε ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνδυαστικότητα:

Μην αναμιγνύετε το GULLIVER με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.

Επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε σε μείγμα με τα ζιζανιοκτόνα (AURA 20 EC, BASAGRAN 48SL, CLINCHER Neo 200 EC, VIPER MAX).

Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο, ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το GULLIVER είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια μετακινείται στα σημεία ανάπτυξής τους. Αμέσως μετά την απορρόφησή του από τα ζιζάνια, σταματά η ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός τους με την καλλιέργεια του ρυζιού. Τα συμπτώματα είναι ορατά 10-15 περίπου μέρες μετά την εφαρμογή, σαν τυπικό κιτρίνισμα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρ.		
Ρύζι (ORYSA)	Αγρωστώδη Πλατύφυλλα ζιζάνια*	4 - 5	20 - 40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή 18 ως 50 ημέρες μετά την σπορά (καλλιέργεια στα 2 φύλλα έως τέλος του αδελφώματος {BBCH 12 – 29}).	1

Παρατηρήσεις:

- Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου μετά την εφαρμογή του GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα ως εξής:
 - Εφαρμογή σε πλημμυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό για τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 - Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την εφαρμογή αφήνοντας νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκευάσμα, μην απομακρύνετε το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 - Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την εφαρμογή, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
 - Επειδή το GULLIVER έχει μικρή υπολειμματική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά μόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά την στιγμή της εφαρμογής.
 - Για την άριστη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο.
- Για την *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa sp.* η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-4 φύλλων και πάντα πριν το αδελφωμα.
- Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και ριζωμα) στο στάδιο του 1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.


Καταπολεμούμενα ζιζάνια*Ευαίσθητα ζιζάνια**

Άλισμα το αγρωσιδόμορφον (<i>Alisma lanceolatum</i> – ALSLA)	Μοσχοκύπερη (<i>Cyperus difformis</i> - CYPDI)
Αμάνια (<i>Ammannia coccinea</i> – AMMCO)	Μουχρίτσες (<i>Echinochloa sp.</i> – ECHSS)
Βούτομο (<i>Butomus umbellatus</i> – BUTUM)	Πεντάνευρο ρυζιού (<i>Alisma plantago-aquatica</i> – ALSPA)
Ετερανθέρα (<i>Heteranthera limosa</i> – HETLI)	Ραγάζι ή Βολβόσχοινο (<i>Scirpus (Bolboschoenus) maritimus</i> – SCPMA)
Λινδέρνια (<i>Lindernia dubia</i> – LIDDU)	Σκίρπος ορυζώνων (<i>Scirpus (Schoenoplectus) mucronatus</i> – SCPMU)
Κύπερη κίτρινη (<i>Cyperus esculentus</i> – CYPES)	Ψαθί (<i>Typha sp.</i> - THYSS)
(<i>Cyperus serotinus</i> – CYPSE)	

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Ετερανθέρα (*Heteranthera reniformis* – HETRE)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Μην ψεκάζετε με το σκεύασμα αν επικρατούν ή πρόκειται να επικρατήσουν τις επόμενες του ψεκασμού μέρες, υψηλές θερμοκρασίες ή αν το εύρος θερμοκρασιών μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι μεγαλύτερο από 12 °C.
- Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
Το προϊόν περιέχει αναστολέα του ενζύμου οξυγαλακτικής συνθετάσης (ALS) (ομάδα Β της ταξινόμησης HRAC). Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης και εξάπλωσης ανθεκτικών ζιζανίων, ιδίως αγρωστωδών, συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και η χρήση κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. προετοιμασία αμειψισποράς και επιφανειακής σποράς). Να μη χρησιμοποιείται το GULLIVER σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ή ισχυρισμοί περί ανθεκτικότητας ή ανοχής σε αναστολείς του ενζύμου ALS.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
-
- Σε εδάφη που εφαρμόστηκε GULLIVER, συνιστάται να σπέρνονται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μόνο ρύζι, καλαμπόκι ή σόγια. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρθεί μόνο ρύζι, αφού προηγηθεί επιφανειακή κατεργασία του εδάφους στις 21 μέρες μετά την εφαρμογή του GULLIVER.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Μην εισέρχεστε πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους
- Το **GULLIVER WG** είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες ρυζιού τύπου indica ή japonica που βρίσκονται σε καλή βλαστική κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, τροφοπενίες ή προσβολές εντόμων ή ασθενειών. Κάτω από ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να εμφανιστούν ελαφρά κιτρινίσματα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τα συμπτώματα αυτά είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση στις αποδόσεις. Συνιστάται να πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές σε περίπτωση εφαρμογής σε νέες ποικιλίες.
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου
- 
- ΠΡΟΣΟΧΗ**
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H400:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από τα παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος.
 Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Spe1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν υποστεί εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα.

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:

- μian αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** ή
- μian αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- μian αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτομο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	--

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, αν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. **7546** έγκριση κυκλοφορίας του **φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 93587/30.05.2002 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ

Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ