



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08/08/2018
Αριθ. πρωτ: 8337/110309

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των εγκρίσεων που περιέχουν τη δραστική ουσία *chlorpyrifos* όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και συγκεκριμένα το άρθρο 45.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/686 της Επιτροπής της 4^{ης} Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες **chlorpyrifos**, chlorpyrifos-methyl και triclorpyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τις με αριθ. πρωτ. 6204/84879/14-6-2018, 8079/106449/30-7-2018, 6201/84876/14-6-2018, 8058/106160/30-7-2018, 8063/106223/30-7-2018, 8034/105971/27-7-2018, 6160/84157/13-6-2018, 6876/92328/29-6-2018, 6086/82939/12-6-2018, 5870/79986/6/6/2018, 8113/107218/1-8-2018, 6977/93757/3-7-2018, 6159/84154/13-6-2018, 7911/104465/25-7-2018, 8156/107490/1-8-2018 αιτήσεις
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε το φάσμα δράσης των σκευασμάτων περιεκτικότητας 48% β/ο και μορφής EC όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ, ως προς τους χρόνους εφαρμογής και το μεσοδιάστημα εφαρμογών ώστε το σημείο 5 του κάθε σκευάσματος να περιοριστεί εντός του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο Εφαρμογής (για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Γκρέϊτ-φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	200-500	Με την εμφάνιση των προσβολών	1-2 (μεσοδιάστημα 60 ημέρες)
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά Κυδωνιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100 -250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά Κερασιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	150 -312,5	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Τομάτα Πιπεριά, Μελιτζάνα υπαίθρου	>>	100-250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Βαμβάκι	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πατάτα	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-250	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και πριν το σχηματισμό των κονδύλων (BBCH 10-39)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

Παρατηρήσεις:

- 1.Στα εσπεριδοειδή να μη χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της άνθισης
- 2.Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιείται για ζωτροφή

Για τα σκευάσματα περιεκτικότητας 48% που έχουν στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης τους εφαρμογές εδάφους, το φάσμα δράσης διαμορφώνεται εντός του παρακάτω πίνακα :

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (max)		
Λαχανικά, (Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι), Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι, Σιτάρι	Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa spp.</i>) Χλώροπας (<i>Carabidae</i>) Ζάμπρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>)			100 (σε λωρίδες ή αυλάκια)	Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ψεκάσμο και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.	1
	Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>)			130 (καθολική εφαρμογή) 80 (σε λωρίδες ή αυλάκια)		
Καπνός, Τομάτα	Σιδεροσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>) Υλέμια (<i>Hylemia antique</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa spp.</i>) Χλώροπας (<i>Carabidae</i>) Ζάμπρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>)			150	Κατά το φύτεμα. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος..	1
Δολώματα για τις προαναφερθείσες καλλιέργειες	Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa spp.</i>)			100 κ.εκ./στρ. με 3 κιλά πίτουρα σε 1 λίτρο νερό	Με διασκορπισμό	1

- Β.** Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1903 άδειας διάθεσης στην αγορά του Pyrinex 25 CS σύμφωνα με τα παρακάτω :

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρου	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (max)		
Ψεκασμός φυλλώματος						
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαφα (<i>Cydia pomonella</i>) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i>) Υπονομευτής (<i>Hyponomeuta malinellus</i>) Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> <i>P. corylifoliella</i> , <i>Cemistoma scitella</i> , <i>Lyonetia clerkella</i>) Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>) Κόσσοι (<i>Cossus cossus</i>) Ξυλοφάγα έντομα	200-240	100-200	200-480	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Κυδωνιά	>>	200	100	200	Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) Καρπόκαφα (<i>Cydia molesta</i>) Φυλλοδέτες	200-240	150-250	300-600	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

	(<i>Archips rosanus</i> , <i>A. podanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i>) Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>) Κόσσοσ (<i>Cossus cossus</i>) Ξυλοφάγα έντομα					
Δαμασκηλιά	>>	200	150	300	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Αμπελι Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus spp</i>) Τζιτζικάκι (<i>Empoasca spp.</i>)	200	100	200	Εφαρμογή πριν την άνθηση	1
Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i> <i>Myzus spp.</i>) Θρίπες (<i>Thrips spp.</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>)	--	50-80	400	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Εφαρμογή στο έδαφος						
Λαχανικά, (Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι), Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι, Σιτάρι	Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa spp.</i>) Χλώροπας (<i>Carabidae</i>) Ζάμπρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>)			190 (σε λωρίδες ή αυλάκια) 250 (καθολική εφαρμογή) 150 (σε λωρίδες ή αυλάκια)	Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ψεκάσμο και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.	1
Καπνός, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	Σιδεροσκούληκο (<i>Agriotis spp.</i>) Υλέμυια (<i>Hylemia antique</i>) Πρασάγγουρας			290	Κατά το φύτεμα. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος..	1

	(<i>Gryllotalpa spp.</i>) Χλώροπας (<i>Carabidae</i>) Ζάμπρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>)					
Δολώματα για τις προαναφερθείσες καλλιέργειες	Κοφτοσκούληκο (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa spp.</i>)			190 κ.εκ./στρ. με 3 κιλά πίτουρα σε 1 λίτρο νερό	Με διασκορπισμό	1

Παρατηρήσεις: 1.Στο βαμβάκι το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιείται για ζωτροφή.

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1888 άδειας διάθεσης στην αγορά του Dursban 750 WG σύμφωνα με τα παρακάτω:

Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού : λίτρα/στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	Έντομα φυλλώματος, καρπών και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	320	-	200-400	Εφαρμογές με την εμφάνιση των εντόμων. (BBCH 11-89) Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 60 ημέρες.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ : Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Έντομα φυλλώματος, και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	160	-	100-200	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-15 ημέρες.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Έντομα φυλλώματος και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	200	-	150-250	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηλιά	Έντομα φυλλώματος, ανθέων, καρπού και ξύλου (μασητικά, μυζητικά)	200	-	150-250	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. (BBCH 11-89) Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες. Για καρπόκαψα και ανάρσια ψεκασμοί με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Τομάτες, Πυτεριές, Μελιτζάνα (υπαίθρου)	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	-	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.

Βαμβάκι	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	128	-	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες
Πατάτα	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	-	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες. Εφαρμογές μέχρι το σχηματισμό των κονδύλων. (BBCH10-39)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στα εσπεριδοειδή να μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης (BBCH-60-69).
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιηθεί για ζωτροφή.

Γ.	Το σημείο 13.2 των σκευασμάτων που περιέχουν δραστική ουσία chlorpyrifos όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ (μορφής EC, CS ή WG) διαμορφώνεται εντός του παρακάτω πίνακα :		
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα (για τους ψεκασμούς φυλλώματος)	Ημέρες	
	Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά	21	
	Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πατάτα	Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής	
	Κυδωνιά	30 (μόνο για το Pyrinex 25 CS)	
	Βαμβάκι	90	
	Για τις εφαρμογές εδάφους	Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής	

Δ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν οι αποφάσεις άδειας διάθεσης στην αγορά όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για το κάθε σκεύασμα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ.

Ε. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αφορούν ήδη εγκεκριμένο φάσμα δράσης και δεν παρέχουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των υφιστάμενων εγκρίσεων.

ΣΤ. 1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.

3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Πίνακας Διανομής

	Κάτοχοι άδειας διάθεσης στην αγορά
1	Dow Agrosiences Ltd
2	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
3	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
4	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
5	CHEMINOVA POLSKA SP.zo.o
6	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
7	SELECTAGRI ΕΠΕ.
8	AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
9	AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
10	DELTA GAMMA AGRO ΑΒΕΕ
11	ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
12	ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
13	Cheminova A/S
14	Dow Agrosiences Export SAS
15	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
16	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
17	CHEMINOVA AGRO S.A.
18	Headland Agrochemicals Ltd.

Παράρτημα Ι

	Εμπορικό Όνομα σκευάσματος	Αριθμός έγκρισης
1	DURSBAN 480 EC	1113
2	PYRINEX 48 EC	1508
3	DOLBENAL 48 EC	1637
4	MORRIGAN 48 EC	1639
5	TERMINOVA 48 EC	1750
6	PYRIFOS 48 EC	1772
7	DORSAN 48 EC	1781
8	CHLORPYRIFOS - AGROTECHNICA 48 EC	1790
9	CHLOROPHOS 48 EC	1791
10	DUCLOR 48 EC	1805
11	METHOCHLOR 48 EC	1848
12	ECHO 48 EC	1861
13	CYREN 48 EC	1863
14	DURSBAN 750 WG	1888
15	PYRINEX 25 CS	1903
16	CHLORACT 48 EC	1914
17	CYFOS 48 EC	1958
18	CHLORPYRIFOS-HEADLAND 48 EC	1976