



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08 - 10 - 2018
Αριθ. πρωτ: 9472/124945

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| Ταχ. Δ/νση: | Λ. Συγγρού 150 | Προς: | ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ |
| Ταχ. Κώδικας: | 176 71 - ΑΘΗΝΑ | | Εθνικής Αντιστάσεως 73 |
| TELEFAX: | 210 92 12 090 | | Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι |
| Πληροφορίες: | Κ. Μητσοπούλου | | |
| Τηλέφωνο: | 210 92 87 165 | | |
| e-mail: | kmitsopoulou@minagric.gr | e-mail: | technical@alfagro.gr |

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CONSTEL F (diflufenican 2,5% β/ο + chlorotoluron 40% β/ο)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο της εγκεκριμένης δραστικής ουσίας diflufenican.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1262 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και η δραστική ουσία Chlorotoluron.
8. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

9. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος CONSTEL στην Γαλλία (αριθμ. έγκρισης: 2070237).
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 9472/124945/18.09.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CONSTEL F**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 70294 |
| 08.10.2018 |
| 31.12.2019 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

| |
|---------------------------|
| CONSTEL F |
| Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) |

1.3 Δραστικές ουσίες

| Δραστική ουσία 1 | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | Chlorotoluron |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | Min 975 g/kg |
| Χημική ομάδα | Υποκαταστατο Ουρίας |
| Παρασκευαστής | ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel Dr. Tali Ehrlich Tel.: +972 7 3232 1330 Fax: + 972-7-3232 1315 E-mail: tali.ehrlich@adama.com European address ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Γερμανία Mr. Wolfgang Busch Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατίθενται με την παρούσα αίτηση (Part C-Confidential) της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |

| | |
|--|---|
| Δραστική ουσία 2 | |
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | Diflufenican |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | Min 970 g/kg |
| Χημική ομάδα | Πυριδινο-καρβοξαμικά |
| Παρασκευαστής | <p>ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel Dr. Tali Ehrlich Tel.: +972 7 3232 1330 Fax: + 972-7-3232 1315 E-mail: tali.ehrlich@adama.com</p> <p>European address ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Γερμανία Mr. Wolfgang Busch Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com</p> |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | <p>1. ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel</p> <p>2. Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd. West Road, South Area of Ocean Economic Development Zone - Dafeng, Jiangsu 224173 Κίνα.</p> |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατίθενται με την παρούσα αίτηση (Part C-Confidential) της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα):

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel
Dr. Tali Ehrlich
Tel.: +972 7 3232 1330
Fax: + 972-7-3232 1315
E-mail: tali.ehrlich@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Τ.Κ. 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:
Diflufenican: 2,5% β/ο
Chlorotoluron: 40 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 61,07 %β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | Φιάλη | 350 κ.εκ. - 1 λίτρο | Πλαστικό τύπου HDPE |
| 2 | Δοχεία | 1,5 - 20 λίτρα | Πλαστικό τύπου HDPE |

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες****Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός με 8-20 λίτρα νερό/στρ. με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (30 – 45 psi) υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό σιτάρι και κριθάρι, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών: του Diflufenican που απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες των ζιζανίων και έχει δράση επαφής και υπολειμματική και του Chlortoluron, που απορροφάται από τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται διασυστηματικά. Σε βιοχημικό επίπεδο το Diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών ενώ το Chlortoluron αναστέλλει τη φωτοσύνθεση στο φωτοσύνστημα II.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|--|--|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | | κ.εκ./ στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| Σκληρό Σιτάρι (TRZDU) Μαλακό σιτάρι (TRZAW) | Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (1*) | 350-450 | 8-20 | Προφυτρωτικά (BBCH 00-09) ή Νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 10-14) | 1 |
| Κριθάρι (χειμερινό) | Ετήσια αγρωστώδη και | 350-450 | 8-20 | Προφυτρωτικά (BBCH 00-09) | 1 |

| | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|---|--|
| (HORVW) | πλατύφυλλα ζιζάνια (1*) | | | ή Νωρίς μεταφύτευτικά, από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 12-29) | |
|---------|----------------------------|--|--|---|--|

Παρατηρήσεις:

1* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

| | |
|-------------------|--|
| Ευαίσθητα | Αγρωστώδη ζιζάνια Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i> - ALOMY) Αγριοβρώμη (<i>Avena spp</i> - AVESS) Πολύανθη Ηρα (<i>Lolium multiflorum</i> - LOLMU) Πόα κοινή (<i>Poa annua</i> - POAAN) Πλατύφυλλα ζιζάνια Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i> - CAPBP) Χαμομήλι (<i>Matricaria recutita</i> - MATCH) Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i> - PAPRH) Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculariae</i> - POLAV) Άγριο σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i> - SINAR) Στελλάρια (<i>Stellaria media</i> - STEME) Βερόνικες (<i>Veronica persicae</i> - VERPE, <i>Veronica hederifolia</i> - VERHE) Αγριοπανσές (<i>Viola arvensis</i> - VIOAR) |
| Μετρίως ευαίσθητα | Κολλιτσίδα (<i>Galium spp</i> - GALSS) Λεπτή Ηρα (<i>Lolium rigidum</i> - LOLRI) |

- Η δόση είναι ανάλογη με το είδος του εδάφους και την πυκνότητα των ζιζανίων. Χρησιμοποιείστε την μικρή δόση σε ελαφρά εδάφη και χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων και τη μεγάλη σε μέσης σύστασης εδάφη και μεγάλη πυκνότητα ζιζανίων. Σε βαρεία-αργιλλώδη εδάφη (> 30% άργιλος) η αποτελεσματικότητά του είναι ανεπαρκής. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια, καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με εφαρμογή πριν από το στάδιο των τεσσάρων (4) φύλλων των ζιζανίων.
- Σε ελαφρά εδάφη συνίσταται η μεταφύτευτική εφαρμογή.
- Να ψεκάζεται σε εδάφη με καλή προετοιμασία και εδαφική υγρασία
- Να ψεκάζεται απουσία ανέμου για την αποφυγή διασποράς του ψεκαστικού νέφους.
- Να μην εφαρμόζεται κατά το φύτευμα της καλλιέργειας ή σε καλλιέργειες ανεπαρκώς σπαρμένες ή που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να μην καλλιεργείται το έδαφος 15 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Να αποφεύγεται η χρήση του σε περιόδους με έντονη ξηρασία ή βροχόπτωση, με μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή όταν αναμένεται παγετός.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προ-στατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στον ίδιο αγρό μπορεί να σπαρθούν μετά από βαθύ όργωμα πατάτα ή εφόσον η εφαρμογή έγινε μέχρι Ιανουάριο εκτός από τις εγκεκριμένες καλλιέργειες, αραβόσιτος ή λινάρι.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρθούν σιτάρι, κριθάρι, ελαιοκράμβη, μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, πατάτα, λινάρι, σόργο, σόγια, αραβόσιτος, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες).

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Λόγω του ότι περιέχει Chlorotoluron θα πρέπει η ποικιλία μαλακού σιταριού που έχει σπαρθεί να είναι ανεκτική σε αυτή τη δραστική ουσία. Οι ποικιλίες που έχουν ελεγχθεί είναι οι Bolero, Bologna, Dion, Genesis και Gogas. Για τις υπόλοιπες πραγματοποιείστε δοκιμαστικές εφαρμογές μικρής κλίμακας. Να αποφεύγονται τα διπλοπεράσματα καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα φυτοτοξικότητας.

9 Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ208 Περιέχει 1,2 βενζισοθιαζολινη-3-ένα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα, γυαλιά και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή»
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Spe2 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να μην ψεκάζεται σε τεχνητά αποστραγγισμένα εδάφη.
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων, με φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe7 Να μην ψεκάζεται μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου που είναι η περίοδος αναπαραγωγής των πτηνών.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητα έκθεσης,
 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο εάν παρατηρηθεί ερεθισμός.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα καλά με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗ ΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία
επέμβαση πριν
τη συγκομιδή:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-------------------------------------|--------|
| Σιτάρι (μαλακό & σκληρό) Κριθάρι | 90 |

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκεύασματος

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C – 30°C, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ