

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 21-7- 1998

Αριθ.Πρωτ.: 69349

Ταχ.Δ/νση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:52 91 411

ΠΡΟΣ: 1) SUMITOMO Corp. Hellas S.A.
Κηφισίας 256
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΘΕΜΑ:Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
TACHIGAREN 36 SL.

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97) άρθρο 1, παρ.2 α.
2. Την από 30-3-98 αίτηση καθώς και τις από 30-6-98 και 17-7-98 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε **προσωρινή** έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6699** στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TACHIGAREN 36 SL
2. **Μορφή:** Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** hymexazol 36% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 69,7% β/β

Το προϊόν περιέχει Υδροξείδιο του Καλίου

4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 99% min.
5. **Παρασκευαστής:** SANKYO Co Ltd, Ιαπωνία

6. **Αντιπρόσωπος:** SUMITOMO Corp. Hellas, Κηφισίας 256 15231 Χαλάνδρι

7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής

8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής

9. **Συσκευασία:** 9α. **Είδος -Μέγεθος:** Φιάλες των 500 κ. εκ.

9β. **Υλικό:** Πολυαιθυλένιο

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση μυκήτων εδάφους.

11. **Τρόπος εφαρμογής:**

Σπορεία: Ριζοπότισμα

Εγκατεστημένη φυτεία: Ριζοπότισμα που μπορεί να γίνει και με την προσθήκη του σκευάσματος στο σύστημα στάγδην άρδευσης ρυθμίζοντας έτσι τη διάλυση ώστε να πέφτουν τουλάχιστον 200 κ. εκ. διαλύματος ανά φυτό.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση στην ανάλογη ποσότητα νερού και αφού αναδεύσουμε αρχίζουμε την εφαρμογή.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τομάτα: α. Σπορεία	Φουζαρίωση (Fusarium spp.)	0,5κ.εκ.σκευάσματος/ λίτρο νερού με 4 λίτρα διαλύματος/τ.μ.	Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη σπορά και επανάληψη όταν χρειασθεί. Αριθμός επεμβάσεων 1-2
β. Εγκατεστημένη φυτεία (Θερμοκήπια και γενικά εδάφη όπου είναι γνωστό ότι ενδημεί η ασθένεια)	Φουζαρίωση (Fusarium spp.)	0,25 κ.εκ. σκευάσματος/ φυτό (ή 0,5 λίτρα/στρέμμα, εφόσον ο αριθμός των φυτών/στρέμμα είναι 2000)	β1. Προληπτικά Πρώτη επέμβαση 8 ημέρες μετά την οριστική εγκα- τάσταση των φυτών και επανάληψη κάθε 10-12 ημέ- ρες. Αριθμός επεμβάσεων 4-5.
(Θερμοκήπια και γενικά εδάφη όπου δεν ενδημεί η ασθένεια)	Φουζαρίωση (Fusarium spp.)	0,75 κ.εκ. σκευάσματος/ φυτό (ή 1,5 λίτρα/στρέμμα, εφόσον ο αριθμός των φυτών/στρέμμα είναι 2000)	β2. Θεραπευτικά. (στα πρώτα στάδια προσβολής) Πρώτη επέμβαση με τα πρώτα συμπτώματα προσβο- λής επανάληψη μετά από 15 ημέρες. Αριθμός επεμβάσεων 2.

14.Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργεια.

15.Συνδυαστικότητα:

Δεν προτείνεται η συνδυασμένη εφαρμογή του με άλλα σκευάσματα.

16.Σημάνσεις:

Σταυρός του Αγ. Ανδρέα

Xn- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, Xi -ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R22) Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

(R36) Ερεθίζει τα μάτια.

(R41) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

Επικίνδυνο για την πανίδα της ξηράς και την υδρόβια.

19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S24/25) Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S36/37/39)Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό, καλέστε γιατρό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό για 15 λεπτά.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τη μολυσμένη περιοχή με νερό και σαπούνι.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

Μη ρυπαίνετε τα νερά. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα ξεπλύνετε καλά ρίχνοντας τα ξεπλύματα στο δοχείο προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος. Απορρίψτε τα κατεστραμένα κενά δοχεία σε μέρος που να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκληθεί ρύπανση.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):-

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εγκατεστημένη φυτεία: 15 ημέρες

Μέγιστο ανεκτό όριο υπολειμμάτων (MRL) : 1 mg/kg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ.1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 21-7-2002.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία SUMITOMO CORP. HELLAS S.A.

IV. Η εταιρεία SUMITOMO CORP. HELLAS S.A. υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το TACHIGAREN 36 SL, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

K. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ