



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11-10-2004

Αριθ. πρωτ.: 121092

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 92 12 164

- ΠΡΟΣ: 1) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 26, Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου, Θεσ/νίκη
(με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Τμήματα Β, Γ και Ε Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο)
PROPARGITE FARMA-CHEM 57 EC ”

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ.2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) Απόφασή μας, για την «τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ.83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 105277/4.6.2004 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2102 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) PROPARGITE-ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ 57 EC.
6. Τη με αριθ. 230642/15.03.2004 (ΦΕΚ 525/Β/23-04-2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωσή της για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό».

7. Τη με αριθ. 272635/5.8.2004 (ΦΕΚ 1270/Β'/18.8.2004) Απόφασή μας με θέμα την “μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν με εντολή Υφυπουργού”.
8. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το από 05-04-2004 πρωτόκολλο πληρότητας φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **2104** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PROPARGITE FARMA-CHEM 57 EC
2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** propargite 57% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 39,69% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 90% min, του οίκου SINOCHEM IMP. & EXP. CO., LTD, Κίνας.
5. **Παρασκευαστής:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., Τ.Θ. 26, 570 22 – ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
6. **Αντιπρόσωπος:** -----
7. **Τυποποιητής:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
8. **Συσκευαστής:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος–μέγεθος:** -Φιάλες των 100, 200, 250, 500, 800 κ.εκ. και 1, 2, 5 και 10 λίτρων.
9β. Υλικό: HDPE ή PET ή COEX ή αλουμίνιο.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Ακαρεοκτόνο που δρα δι’ επαφής και με ατμούς. Έχει εκλεκτική δράση.

11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (5), (6)
Αμυγδαλιά, καρυδιά	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, κλπ.) -Aculus cornutus	80 – 100	Νωρίς την άνοιξη, μέχρι αργά το καλοκαίρι, εναντίον των προνυμφών και ακμαίων και επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειασθεί.
Μηλιά (1)	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae)	80 – 100	>>

	(<i>Aculus schlechtendali</i>)		
Πυρηνόκαρπα (κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, δαμασκηλιά ροδακινιά) (2)	-Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) -Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) -Άλλα ακάρεα (<i>Tetranychidae</i> , κλπ.) - <i>Aculus cornutus</i>	80 – 100	>>
Αμπέλι (3)	-Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) -Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus carpini</i> , <i>Tetranychus atlanticus</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus mcDanieli</i>)	80 – 100 (150 κ.εκ./στρ.)	15–20 ημέρες μετά την άνθηση. Επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειασθεί.
Βαμβάκι (4)	-Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	100 – 250 κ.εκ./στρ.	Με την εμφάνιση των προνυμφών ή των ακμαίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις μηλιές δεν πρέπει να ψεκάζεται πριν από τα μέσα Ιουνίου. Μόνο 1–3 ψεκασμοί το χρόνο. Χρησιμοποιείτε 200–300 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα.
 2. Μόνο 1–2 ψεκασμοί το χρόνο. Χρησιμοποιείτε 250–300 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα.
 3. Ψεκάζετε μόνον (15–20 ημέρες μετά την άνθηση), σε αμπέλια που δεν υποφέρουν από ξηρασία, διάφορες ασθένειες, νηματώδεις κ.λ.π.
 4. Μην ψεκάζετε νεαρό βαμβάκι, όταν είναι κάτω των 25 εκ. Χρησιμοποιείτε 40–50 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Το εύρος των δόσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων δηλ. 100 κ.εκ./στρ. για φυτά ύψους 25–30 εκ. και 150–250 κ.εκ./στρ. για τα μέσου ύψους και μεγάλου ύψους βαμβακόφυτα.
 5. Για καλύτερα αποτελέσματα ψεκάζετε κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά μη ψεκάζετε όταν υπάρχουν προβλήματα ξηρασίας, διαφόρων ασθνεσιών προσβολές από νηματώδεις, τροφopenίες ή όταν τα φυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει πάντα να γίνεται καλός ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται καλό λούσιμο των φυτών και ειδικότερα των φύλλων και στις δύο επιφάνειες.
 6. Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες, γι' αυτό οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται μόνον εφ' όσον εμφανισθούν εκ νέου τα ακάρεα.
- 14. Φυτοτοξικότητα:** Να μην χρησιμοποιείται σε αχλαδιές και τριανταφυλλιές.
- 15. Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και θερινούς πολτούς, όπου οι ψεκασμοί δεν πρέπει να γίνονται πριν περάσουν 30 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό τους. Σε περίπτωση ανάμιξης με περισσότερα σκευάσματα, καλό είναι να γίνεται προηγουμένως μία δοκιμή συνδυαστικότητας, με μικρή ποσότητα φαρμάκου σε μικρή έκταση.
- 16. Σημάνσεις:** Xn – Επικίνδυνο, Xi – Ερεθιστικό, N - επικίνδυνο για το περιβάλλον.
- 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**
- R10** Εύφλεκτο.
- R20/21/22** Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
- R36/38** Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- R41** -Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**
- R50/53** -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 -Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S23 Μην εισπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό.
S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

A1 Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του κοντά σε επίγεια χερσαία ύδατα.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, πυρηνόκαρπα: **7** ημέρες.
Βαμβάκι: **14** ημέρες.
Λοιπές καλλιέργειες: **21** ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α)** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
δ) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α) Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008.**

β) Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ