



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7-5-2007  
Αριθ. Πρωτ.: 118702

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  
FAX: 210 92 12 090

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής  
εισαγωγής και αντιπροσώπους  
φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
ως Π.Δ.

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των εγκρίσεων  
των σκευασμάτων που περιέχουν  
captan, σε εφαρμογή της με αριθ.  
2006/92/ΕΚ οδηγίας»**

Σας γνωρίζουμε ότι με την οδηγία **2006/92/ΕΚ** της Επιτροπής της 09.11.2006 (L.311/10.11.2006), ορίστηκαν νέα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), για τη δ. ο. captan, τα οποία θα ισχύουν από τις 11 Μαΐου 2007.

Οι κάτοχοι εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν **captan** και δεν προορίζονται για απολύμανση σπόρων, παρακαλούνται:

- 1) Να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την αποφυγή χρήσης στις καλλιέργειες : **Ροδακινιά-Νεκταρινιά μετά το τέλος της άνθησης, Αμπέλι, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πατάτα**, επειδή από τη μέχρι σήμερα εγκεκριμένη χρήση αναμένονται υπολείμματα ανώτερα των MRLs.
- 2) Να υποβάλουν άμεσα, και όχι αργότερα από τις 10 Μαΐου 2007, αίτηση για τροποποίηση της έγκρισης, έτσι ώστε από τη χρήση τους να μην παράγονται προϊόντα με υπολείμματα ανώτερα από τα θεσπισθέντα.

Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε ανάκληση της αντίστοιχης έγκρισης, μετά το τέλος Μαΐου 2007.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις καλλιέργειες και τις δόσεις με τις οποίες, με την ορθή γεωργική πρακτική, δεν αναμένονται υπολείμματα ανώτερα από τα οριζόμενα στην οδηγία. Το φάσμα δράσης, καθώς και ο μέγιστος αριθμός επεμβάσεων, οι παρατηρήσεις, οι περιορισμοί και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  | ΔΟΣΕΙΣ (Μέγιστες)             |                           |                   | Μέγ. Αριθμός Εφαρμογών / καλ. περίοδο | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
|  |  | Κιλά δ.ο./100 λίτρα ψεκ. υγρό | Λίτρα ψεκ. υγρού /στρέμμα | Κιλά δ.ο./στρέμμα |                                       |  |
| Αμυγδαλιά  | <b>Φαιά σήψη</b><br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )<br><br><b>Κορόνιο</b><br>( <i>Stigmina carpophila</i> )  | 0,125                         | 100-150                   | 0,185             | 2                                     | - Αρχή της άνθησης<br>- Πλήρη άνθηση.<br><br>Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.   |
| Μηλιά  | <b>Φουζικλάδιο</b><br>( <i>Venturia inaequalis</i> )   | 0,125                         | 100-200                   | 0,250             | 4                                     | - Πράσινη κορυφή<br>- Ρόδινη κορυφή<br>- Πτώση πετάλων και<br>- 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο).  |
| Αχλαδιά  | <b>Φουζικλάδιο</b><br>( <i>Venturia pirina</i> )   | 0,125                         | 100-200                   | 0,250             | 4                                     | - Πράσινη κορυφή<br>- Λευκή κορυφή<br>- Πτώση πετάλων και<br>- 15-20 ημέρες αργότερα.  |
| <b>Βερικοκιά<br/>Κερασιά<br/>Ροδακινιά<br/>Νεκταρινιά<br/>Δαμασκηλιά</b> | <b>Φαιά σήψη</b><br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )<br><br><b>Κορόνιο</b><br>( <i>Stigmina carpophila</i> )<br><br><b>Εξώασκος</b><br>( <i>Taphrina deformans</i> )  | 0,125                         | 100-250                   | 0,310             | 4                                     | Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης:<br>- ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10% της άνθησης)<br>- 50% άνθηση<br>- πλήρη άνθηση<br>- πτώση πετάλων.<br><br>Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.<br><br>Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. |
| <b>Τομάτα<br/>υπαίθρου</b>   | <b>Αλτερναρίωση</b><br>( <i>Alternaria spp.</i> )<br><b>Τεφρά σήψη</b><br>( <i>Botrytis cinerea</i> )<br><b>Σεπτορίωση</b><br>( <i>Septoria lycopersici</i> )<br><b>Προσβολή λαιμού</b><br>( <i>Pythium spp., Rhizoctonia solani</i> ) | 0,125                         | 50-100                    | 0,125             | 3                                     | Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα.<br><br><br><br>Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.   |

|                     |   |       |        |       |   |   |
|---------------------|---|-------|--------|-------|---|---|
| Πιπεριά<br>υπαίθρου | Αλτερναρίωση<br>( <i>Alternaria solani</i> ),<br>Τεφρά σήψη<br>( <i>Botrytis cinerea</i> )<br>Προσβολή<br>λαιμού<br>( <i>Pythium spp.</i> ) | 0,125 | 50-100 | 0,125 | 3 | Εφαρμογές που<br>αρχίζουν με τα πρώτα<br>συμπτώματα.<br><br>Μια εφαρμογή με τα<br>πρώτα συμπτώματα  |
| Πεπόνι<br>υπαίθρου  | Τεφρά σήψη<br>( <i>Botrytis cinerea</i> )<br><br>Προσβολή<br>λαιμού<br>( <i>Pythium spp.</i> )  | 0,125 | 50-100 | 0,125 | 3 | Εφαρμογές που<br>αρχίζουν με τα πρώτα<br>συμπτώματα.<br><br>Μια εφαρμογή με τα<br>πρώτα συμπτώματα. |
| Καλλωπιστικά        | Προσβολή<br>λαιμού<br>( <i>Pythium spp.</i> ,<br><i>Rhizoctonia spp.</i> ).   | 0,125 | 50-100 | 0,125 | 1 | Μια εφαρμογή με τα<br>πρώτα συμπτώματα.   |

Παρατηρήσεις :

- Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτινίασης και Κλαδοσπορίωσης της τομάτας, της πιπεριάς και του πεπονιού.
- Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμυγδαλιά : στην πλήρη άνθηση

Μηλιά-Αχλαδιά : στο στάδιο του καρπιδίου

Πυρηνόκαρπα: στην πτώση των πετάλων

Τομάτα (υπαίθρου), Πιπεριά (υπαίθρου): στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

Πεπόνι (υπαίθρου): 21 ημέρες.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Θ. ΝΟΤΟΣ**

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

- 1) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
- 2) AGROLOGY, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ
- 3) ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
- 4) ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
- 5) ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
- 6) ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
- 7) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
- 8) ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ, ΣΗΦΗΣ ΜΠΡΕΔΟΛΟΓΟΣ Α.Ε.
- 9) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
- 10) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
- 11) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ & Ν ΑΒΕΕ
- 12) ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ
- 13) ISAGRO HELLAS Ltd
- 14) ΛΑΜΔΑ ΦΕΡΤΙΛΑΪΖΕΡΣ ΑΒΕΕ
- 15) ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ
- 16) Κ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
- 17) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
- 18) ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 19) SYNGENTA Hellas ΑΕΒΕ
- 20) ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε
- 21) VECTOR AGRO S.A.
- 22) ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ
- 23) ΦΙΛΟΚΡΟΠ Α.Ε.
- 24) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
- 25) Ν. Αυτοδιοικήσεις- Δ/νσεις Γεωργίας, Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, με e-mail
- 26) ΕΣΥΦ, Πατησίων 53 104 33 - Αθήνα
- 27) ΠΟΣΕ Γεωπόνων, Διδότου 26, Αθήνα