



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 2 - 3 - 2007

Αριθ. Πρωτ.: 124625 π.ε.

Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210-928 7228

ΠΡΟΣ: ΕΜΑΒΠ Ο.Ε.

Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Χαλκοκονδύλη 19 – 104 32 - ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)

Έδρες τους

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και τροποποίηση της
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία),
CEKUGIBB CEQUISA 9 TB
ως προς το φάσμα δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α' 104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1, 7.
3. Τη με αριθμό 117655/4-4-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8164 έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας μορφής και μεγαλύτερης περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν GIBBERELLIC ACID AGROLOGY 10 TB.
4. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστική ουσία gibberellic acid.
5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β' 1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β' 1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με "Έντολή Υφυπουργού"».

7. Τις από 22-12-2006 αιτήσεις της εταιρείας ΕΜΑΒΙΠ Ο.Ε. Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, για την ανανέωση και τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματός της CEKUGIBB CEQUISA 9 TB.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Ανανεώνουμε για μία πενταετία από 1-1-2007 έως 31-12-2011, και **τροποποιούμε** τη με αριθ. **8128**, οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία), **CEKUGIBB CEQUISA 9 TB**, (δ.ο. gibberellic acid 9% β/β), με παρασκευαστή την εταιρεία **CEQUISA S.A. – Ισπανίας** που χορηγήθηκε στην εταιρεία **ΕΜΑΒΙΠ Ο.Ε. Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ-Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ**, με την αριθ. 96232/1-5-2002 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και συγκεκριμένα η παράγραφος 13 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		Δισκία/100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u>					
Γκρέιπ φρούτ	Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.	1-1,5	200-400	Όταν οι καρποί στην περιφέρεια του δέντρου εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα κιτρινίσματος.	1
Λεμονιά	1. Για συντόμευση του χρόνου συγκομιδής σε πολύφορες ποικιλίες. 2. Για καθυστέρηση της συγκομιδής σε όλες τις ποικιλίες. 3. Για αύξηση του μεγέθους του καρπού.	0,5-1	200-300	Όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν χρώμα από βαθύ πράσινο έως ελαφρό κίτρινο.	1
Μανταρινιά (Κλημεντίνες)	1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δέντρα με χαμηλή παραγωγικότητα. 2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής	1-2,5 1	200-300	Στην πλήρη άνθηση. Αφού συγκομίσετε τους καρπούς, οι	1

				οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια του δέντρου και οι οποίοι ωριμάζουν νωρίς.	
Πορτοκαλιά (εκτός ποικιλίας Valencia)	1. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής. 2. Για βελτίωση της αντοχής του φλοιού του καρπού κατά την παραμονή στο δέντρο. 3. Για περιορισμό των απωλειών που οφείλονται σε ρυτίδωση ή «φούσκωμα» του φλοιού κατά την εποχή της συγκομιδής.	1 1-2	300-400	Για καλύτερα αποτελέσματα ψεκάστε μόλις το χρώμα του καρπού αρχίσει να αλλάζει από πράσινο σε κιτρινωπό. Εάν δεν επιδιώκετε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το εμπορικό χρώμα τους. 3-6 εβδομάδες πριν από την αλλαγή του χρώματος.	1
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u>					
Αχλαδιά	1. Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν ικανοποιητικά. 2. Για ικανοποιητική καρπόδεση μετά την καταστροφή των ανθέων από παγετό. (1)	0,5 1,5-2,5	100	Στην αρχή της άνθησης.	1
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u>					
Κερασιά	1. Για αύξηση της καρπόδεσης. 2. Για αύξηση του μεγέθους του καρπού και βελτίωση της αντοχής του	1-2 1,5-2,5	150	Στα τέλη της άνθησης. Όταν τα κεράσια έχουν χρώμα ανοικτό πράσινο προς αχυρώδες.	1

	φλοιού.				
<u>ΑΜΠΕΛΙ</u>					
1. Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση	Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δε δένουν.	2-4	100	Στο διάστημα από την πλήρη άνθηση (όταν δηλαδή το 70% των πλιδίων έχει πέσει) και μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm (σκαγιού). (2)	2
2. Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας	Για αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ράγας, όταν είναι μικρότερο του κανονικού.	0,2-0,8		Κατά το δέσιμο και όταν οι ράγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3 mm (σκαγιού).	1
3. Μαύρη Κορινθιακή (σταφίδα)	Για βελτίωση της ποιότητας και αποφυγή του σχισίματος των ραγών.	0,1-0,5 (3)		Ψεκάστε προσεκτικά με το σκεύασμα, όταν έχουν πέσει όλα τα πλιδία.	1
Φράουλα	Για πρωίμιση και αύξηση της παραγωγής σε περιοχές που το ψύχος δεν είναι επαρκές (πρώιμες χειμωνιάτικες καλλιέργειες σε υποτροπικά κλίματα).	1,5-2,5	50	3-4 εβδομάδες πριν από την έναρξη της άνθησης.	1
<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u>					
Πιπεριά	Για πρωίμιση ή αύξηση της παραγωγής.	1,5-3	50	Όταν τα μισά περίπου άνθη έχουν δέσει.	1
Σέλινο	Για πρωίμιση ή αύξηση της παραγωγής.	2,5-5	50	4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.	1
Αγκινάρα	Για πρωίμιση της αγκινάρας, για βελτίωση της ποιότητας και για αύξηση της παραγωγής.	0,25-0,5 <u>σε 15 λίτρα νερό</u>	40-50	Όταν εμφανιστούν 6-8 φύλλα ή 8-12 φύλλα για φυτά ενός έτους. (4)	3
<u>ΠΑΤΑΤΑ</u>	Για προβλάστηση του πατατόσπορου και για αύξηση της παραγωγής.	1 <u>σε 600 λίτρα νερό</u>		Βυθίστε τους κονδύλους είτε κομμένους είτε όχι για 4 λεπτά σε	1

				διάλυμα του σκευάσματος.	
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ					
Ανεμώνες	Για ωραιότερα άνθη και επιμήκυνση των ανθοφόρων στελεχών.	2,5	50	Όταν ο πρώτος καρποφόρος οφθαλμός είναι μόλις ορατός.	1
Ίρις	Για προώμιση της άνθησης και επιμήκυνση του ανθοφόρου στελέχους.	10	50	1. Εμβάπτιση των βολβών για 20 ώρες σε διάλυμα του σκευάσματος μετά από διατήρησή τους σε θερμοκρασία 8-13 °C για 45 ημέρες και αμέσως μετά φύτευση ή 2. Ψεκάστε με το σκεύασμα μετά την έκπτυξη των φύλλων.	1
		25			

Παρατηρήσεις:

Το σκεύασμα συνιστάται να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικού στις καλλιέργειες. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του προσκολλητικού.

(1) Πρέπει να προσέξετε ώστε να μη συμβεί υπερβολική καρπόδεση.

(2) Προσέξτε ώστε να βραχούν καλά τα τσαμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε δυο φορές: α) όταν το 70% των πυλιδίων έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β) κατά την καρπόδεση, δηλαδή 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής.

(3) Προσθέστε 1,5-2 γραμ. PCPA ανά 100 λίτρα νερού.

(4) Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί η επαρκής άρδευση. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση. Εάν το νερό άρδευσης είναι αλατούχο, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ πρόωμη χρήση του σκευάσματος.

II. Η ετικέτα να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ όπως ισχύει σήμερα και με την παρούσα Απόφαση.

III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 96232/1-5-2002 απόφασή μας.

IV. 2. Η ανανεωθείσα έγκριση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31-12-2011. (Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης).



ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ