



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 – 3 - 1999

Αριθ. πρωτ.: 93227

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 36 17 103  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Α. Παπαθανασίου  
Τηλέφωνο: 5291412  
3637457

ΠΡΟΣ: 1) Παπαοικονόμου Αγροχημικά Α.Ε.  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης  
Τ.Θ. 89  
57022 Σίνδος Θεσ/νίκη  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής  
έγκρισης κυκλοφορίας  
στο γεωργικό φάρμακο  
(εντομοκτόνο)  
MEZYL 25 WP "

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87», Κεφ. Β παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» ", καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 70727/19-8-98 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1733 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο γεωργικό φάρμακο AZIKON 25 WP.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».

6. Τις από 23-7-96, 15-5-97, 24-6-98 και 16-2-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, και το από 24-6-98 πρωτόκολλο πληρότητας.

## Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1800** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** MEZYL 25 WP
  2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** azinphos methyl 25 % β/β  
βοηθ. ουσίες: 72,22 % β/β
  4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 90 % min
  5. **Παρασκευαστής:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος
  6. **Αντιπρόσωπος:-**
  7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
  8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
  9. **Συσκευασία: 9.α. Είδος-Μέγεθος:** Σακούλες 800 γρ. και 1 κιλού.

**9.β. Υλικό: :** Σακούλες πλαστικές (PE) θερμοκολλημένες και τοποθετημένες μέσα σε χάρτινο κουτί

**10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου,με ελαφράς μορφής διεισδυτική δράση. Καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα.

**11.Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.

**12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

- Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση.
- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13.Φάσμα δράσης.**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά, γκρέϊπ φρουτ)	Λεκάνιο (Saissetia oleae) Ψευδόκκοκος (Planococcus citri) Ακάρεα (3) (δράση μετρία)	200	Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3 εβδομάδες.

<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> (Μηλιά, αχλαδιά)	Διάσπις ( <i>Diaspis pentagona</i> ) Ψώρα του San Jose ( <i>Aspidiotus perniciosus</i> )	160 – 200	Οι ψεκασμοί γίνονται όταν υπάρχουν κινητές μορφές κοκκοειδών.
	Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) Καρπόκαγα ( <i>Cydia molesta</i> ) Φυλλοδέτες ( <i>Archips laevigana</i> ) Φυλλορύκτες ( <i>Lithiocoletis blancardella</i> ) Ανθονόμος ( <i>Anthonomus pomorum</i> , <i>A. pygi</i> )	160-200	Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3 εβδομάδες.
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά)	Καρπόκαγα ( <i>Cydia</i> spp.) Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) Ανθονόμος ( <i>Anthonomus</i> spp.) Φυλλοδέτες <i>Archis laevigana</i> , Φυλλορύκτες ( <i>Litmacaletis</i> <i>blancardella</i> ) Διάσπις Ψώρα του San Jose	160 - 200	Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3 εβδομάδες.
	<b>ΑΜΠΕΛΙ</b>	Ευδεμίδα ( <i>Lobesia botrana</i> ) Κογγυλίδα ( <i>Clysis ambiguella</i> ) Τυλιγάδι ( <i>Byctiscus betulae</i> ) Ερίνωση (3) ( <i>Eriophyes vitis</i> ) (Δράση μετρία)	160-200
<b>ΕΛΙΑ</b>	Πυρηνοτρήτης ( <i>Prays oleae</i> )	130 - 160	Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3
	Μαργαρόνια ( <i>Margaronia</i> sp.)	200 - 250	
	Λεκάνιο	200	

	( <i>Saissetia oleae</i> ) Ασπιδιοτός ( <i>Aspidiotus hederea</i> ),		εβδομάδες.
<b>BAMBAKI</b>	α) Πράσινο σκουλήκι ( <i>Heliothis</i> spp.) Ρόδινο σκουλήκι ( <i>Platyedra gossypiella</i> )	160 - 200 γρ./στρ.	α. Ψεκασμός όταν εμφανιστούν οι προνύμφες και επανάληψη κάθε 10-14 μέρες.
	β) Μελίγκρες ( <i>Aphis gossypii</i> ) Ανθονόμος ( <i>Anthonomus grandis</i> ) Θρίπας ( <i>Thrips tabaci</i> ) Τζιτζικάκια ( <i>Empoasca</i> spp.)	160-200 γρ./στρ.	β. Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3 εβδομάδες.
<b>ΠΑΤΑΤΑ</b>	Δορυφόρος ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ) Σποντόπτερα ( <i>Prodenia litura</i> )	200 γρ./στρ.	Ψεκασμοί καλύψεως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται συνήθως κάθε 2-3 εβδομάδες.

#### Παρατηρήσεις:

1. Μέσα στο εύρος των συνιστώμενων κατά καλλιέργεια και εχθρό δόσεων η επιλογή της κατάλληλης δόσης γίνεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής και την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
2. Οι δόσεις σε γρ./100 λίτρα νερού αφορούν ψεκασμούς μέχρι απορροής (run off).
3. Η δράση του φαρμάκου στα ακάρεα είναι μέτρια.

#### 14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται.

#### 15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

#### 16. Σημάνσεις:

**Τοξικότητας: T, ΤΟΞΙΚΟ**

#### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):

- R21** Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα.
- R23** Τοξικό όταν εισπνέεται.
- R25** Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):**

- RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- RO4** Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
- RO10** Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
- RO12/16** Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
- RO15** Βλαβερό για τα πουλιά.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- S27** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί.
- S28 \** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- S35** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.
- S39** Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου και αναπνευστική συσκευή.  
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
- SY1** Φοράτε φόρμα, μπότες και ελαστικά γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε ιατρική συμβουλή, (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση δηλητηρίασης μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρείστε τον ζεστό και δώστε μεγάλη ποσότητα ιατρικού άνθρακα.

**Αντίδοτο:** Θειϊκή ατροπίνη και συμπληρωματικά TOXOGONIN ή 2-RAM.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- SO1** Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- SO3** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
- SO5** Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή.  
Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---**

**A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

**A3** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**Π1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Ελιά: Όχι πέραν του τέλους Αυγούστου.

Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείστε το στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική Αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**