



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 - 3 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 117407

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 72 28
E-mail: syg064@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ALAPIS CropScience AE
Καρτσιβάνη 6, Π.Φάληρο
175 64 - ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας
7) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία)
TRAX 50 WP”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 118674/30-4-2007 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8174 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) KEYNERON 50 WP, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία, και έχει την ίδια περιεκτικότητα και μορφή.
6. Το με αριθμ. 123951/14-6-2005 μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Thidiazuron.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').

8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 1-9-2007 και 30-1-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 30-1-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου της εταιρείας ALAPIS CropScience AE.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ALAPIS CropScience AE, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **8178** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (φυτορρυθμιστικής ουσίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TRAX 50 WP
2. **Μορφή:** Βρέξιμη Σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Thidiazuron 50% β/β
βοηθητικές ουσίες: 47,37 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Kingtai Chemicals Co., Ltd, Κίνα
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Kingtai Chemicals Co., Ltd, Κίνα (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thidiazuron, όπως προσδιορίζονται στα τμήματα ζ και η (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 01-09-2006 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 121479) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ALAPIS CropScience AE, Καρτσιβάνη 6, Π.Φάληρο, 175 64 Αθήνα.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ALAPIS CropScience AE, Καρτσιβάνη 6, Π.Φάληρο, 175 64 Αθήνα.
7. **α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ALAPIS CropScience AE , Καρτσιβάνη 6, Π.Φάληρο, 175 64 Αθήνα.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ALAPIS CropScience AE ,Υπατο Θηβών.
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ALAPIS CropScience AE ,Υπατο Θηβών
9. **Συσκευασία: - 9α Είδος-Μέγεθος:**
 - i. Κουτιά με εσωτερική σακούλα των 200 (διακοσίων), 300 (τριακοσίων), 400 (τετρακοσίων) και 1000 (χιλίων) γραμμαρίων
 - ii. Κουτιά με δύο εσωτερικές σακούλες των 600 γρ (2 x 300 γρ) και κουτιά των 800 γρ (2 x 400 γρ)**9β Υλικό συσκευασίας:** Χάρτινα κουτιά με εσωτερική σακούλα από PE-PET.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Αποφυλλωτικό βάμβακος. Δρα στο φύλλωμα των βαμβακόφυτων προκαλώντας τον πρόωμο σχηματισμό αφοριστικού ιστού του μίσχου των φύλλων. Τα φύλλα πέφτουν πράσινα. Η αποφύλλωση συμπληρώνεται σε 14-21 ημέρες σε κανονικές συνθήκες. Όταν όμως επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, όπως υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, συμπληρώνεται σε 8 ημέρες από την εφαρμογή του.

11. Τρόπος εφαρμογής: Το TRAX 50 WP εφαρμόζεται με 20-50 λίτρα νερό / στρέμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για καλύτερη αποφύλλωση είναι η καλή διαβροχή του φυλλώματος. Καλύτερη αποφύλλωση επιτυγχάνεται αν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μη χρησιμοποιείτε το σκευάσμα όταν η νυχτερινή θερμοκρασία αναμένεται να είναι χαμηλότερη των 15 ° C για 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να μην έχουμε πλήρη αποφύλλωση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε δένδρα (εσπεριδοειδή) ή άλλες γειτονικές καλλιέργειες πλην του βάμβακος (φυλλώδη λαχανικά), διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή την αποφύλλωση αυτών. Η αποφύλλωση επηρεάζεται όταν επικρατούν συνθήκες ξηρασίας ή τα βαμβακόφυτα είναι ανεπτυγμένα και πυκνοφυτεμένα και δεν γίνεται καλή διαβροχή των φύλλων ή ακόμα και όταν έχουμε μεγάλο αριθμό ζιζανίων.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Το σκευάσμα διαλύεται εύκολα στο νερό και μπορεί να εφαρμοσθεί με οποιοδήποτε ψεκαστικό μηχάνημα εδάφους. Γεμίστε κατά το ήμισυ το βυτίο του ψεκαστήρα με νερό. Με τον αναδευτήρα σε λειτουργία προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και γεμίστε το βυτίο. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του. Μην προετοιμάζετε το ψεκαστικό διάλυμα από την προηγούμενη μέρα.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		γραμ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	γραμ./ στρέμμα	
Βαμβάκι	Αποφύλλωση	30 + (100 κ.εκ. παραφινι κό λάδι)	20-50	6-15 + (20-50 κ.εκ. παραφινικό λάδι)	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ανοίξουν τα 40-60% των καρυδιών στην περίπτωση συλλογής με το χέρι και όταν ανοίξουν τα 50-70% των καρυδιών στην περίπτωση μηχανικής συλλογής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1
Ποικιλία ACALA-(Ζέτα)	Αποφύλλωση	40 + (100 κ.εκ. παραφινι κό λάδι)	20-50	8-20 + (20-50 κ.εκ. παραφινικό λάδι)	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ανοίξουν τα 40-60% των καρυδιών στην περίπτωση συλλογής με το χέρι και όταν ανοίξουν τα 50-70% των καρυδιών στην περίπτωση μηχανικής συλλογής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

- Σε θερμοκρασίες μικρότερες των 16° C η αποτελεσματικότητα του είναι μειωμένη.
- Δίνει καλύτερα αποτελέσματα αν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του.
- Η εφαρμογή του TRAX 50 WP επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών με αποτέλεσμα την πρωιμότερη συγκομιδή (μηχανοσυλλογή ή με το χέρι) και καλύτερη ποιότητα ινών. Το σκεύασμα καταστέλλει την αναβλάστηση και μειώνει το λέκιασμα των ινών.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις)

SZ7 Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Να μην εφαρμόζεται σε άλλες καλλιέργειες εκτός από το βαμβάκι.

15. Συνδυαστικότητα: ----

16. Σημάνσεις: --

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):--

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3: Μη ρυπαίνετε τους υδάτινους πόρους καθαρίζοντας τα ψεκαστικά μηχανήματα.

SO5: Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τα ψεκασμένα φυτά.

Μην χρησιμοποιείται ψεκασμένα φυτικά υπολείμματα της βαμβακοκαλλιέργειας για ζωοτροφή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 - Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 5 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (ξηρό και δροσερό μέρος) στην αρχική του συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

Π. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

ΠΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΔΑΣ