



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 26 - 3 - 2008

Αριθ. πρωτ.: 117408

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228**

**ΠΡΟΣ: ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ
Καπετάν Μητρούση 4,
546 46 - Θεσσαλονίκη
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
6) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορρυθμιστική ουσία)
GIBBERELLIC ACID ΙΝΑΓΚΡΟ 9 ΤΒ”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 97042/26-3-2003 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8136 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ΚΕΥΓΙΒ 9 ΤΒ, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή.

6. Το με αριθμ. 123951/14-6-2005 μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας gibberellic acid.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 25-11-2005 και 6-3-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 6-3-2008 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου της εταιρείας **ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε στην εταιρεία ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **8179** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** GIBBERELIC ACID ΙΝΑΓΚΡΟ 9 TB
- 2. Μορφή:** Δισκία (TB).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση :** gibberellic acid 9 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 89.41% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 85% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο:** ZHEJIANG QIANJIANG BIOCHEMICAL CO., Ltd., Κίνας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : ZHEJIANG QIANJIANG BIOCHEMICAL CO., Ltd., Κίνας (η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
- γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. :** Όπως προσδιορίζονται στο σημείο ζ (ΕΝΤΥΠΙΑ IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 31-10-2007 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ , Καπετάν Μητρούση 4, 546 46, Θεσσαλονίκη
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : -
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΙΝΑΓΚΡΟ ΕΠΕ, Καπετάν Μητρούση 4, 546 46, Θεσσαλονίκη.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Zhejiang Qianjiang Biochemical CO., Ltd. Κίνας.
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zhejiang Qianjiang Biochemical CO., Ltd. Κίνας.
- 9. Συσκευασία: 9α. Είδος- Μέγεθος:** Δισκία των δέκα (10) γραμμαρίων συσκευασμένα σε κουτιά των 10 δισκίων.
9β. Υλικό: Τα δισκία συσκευάζονται σε ταινία αλουμινίου ή σύνθετη ταινία αλουμινίου/πολυαιθυλενίου μέσα σε χάρτινο κουτί..
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωσης της ποιότητας, πρωιμότητα της παραγωγής στις καλλιέργειες: Αμπέλι (Σουλτανίνα και Μαύρη Κορινθιακή Σταφίδα), Αγκινάρα και Σέλινο. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος καλύψεως.
- 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού. Την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος τη διαλύουμε σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνουμε στο ψεκαστικό. Ξεπλύνουμε το δοχείο και ρίχνουμε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώνουμε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων.
		Δισκία/100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
1. Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση	Αύξηση καρπόδεσης, πρωίμιση παραγωγής	2-4	100	α. Στην πλήρη άνθηση (1) β. Μετά 5 - 12 ημέρες.	2/5-12
2. Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας	Αύξηση του μεγέθους των ραγών	0,2-0,6		Όταν οι ράγες γίνουν 3 mm	1
3. Κορινθιακή σταφίδα	Μείωση ανθόρροιας & καρπόπτωση (υποκατάσταση χαρακώματος)	0,1-0,5		Στην πλήρη άνθηση.	1
Αγκινάρα	Πρωίμιση & αύξηση παραγωγής	1,6-3,5	100	Όταν τα φυτά έχουν 6 - 8 φύλλα ή 10 - 12 στα φυτά ηλικίας 1 έτους. (2)	3/15-20
Σέλινο	Πρωίμιση & αύξηση παραγωγής & μήκους στελέχους	5-7	100	4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. (3)	1

Παρατηρήσεις:

1. Ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται όταν έχει πέσει το 70 % των πιλιδίων. Να γίνεται καλή διαβροχή των τσαμπιών.
2. Γίνονται 3 ψεκασμοί, με διάστημα 15 - 20 ημέρες μεταξύ τους. Να αυξάνεται η αζωτούχος λίπανση και το πότισμα.
3. Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής.
4. Οι ψεκασμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες της ημέρας.
5. Στο ψεκαστικό να προστίθεται προσκολλητικό.

14 .Φυτοτοξικότητα:

Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τα φυτά.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα.

16. Σημάνσεις : -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) : -

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S15 Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)
S47/49 Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των 32⁰C και μεγαλύτερη από 0 °C.
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε , πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή με τα κενά συσκευασίας του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία .

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία .

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : (210) 77 93 777 .

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S0 φράσεις):

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σέλινο: 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασία πάνω από 0⁰C και κάτω από 32⁰C παραμένει σταθερό μέχρι και 2 χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ