



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 15 - 1 - 2009
Αριθ. πρωτ: 124687**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: syg035@minagric.gr

Προς: Bayer CropScience AG,
Γερμανίας
(δια της εταιρείας
Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Σωρού 18-20
151 25 – Μαρούσι, Αθήνα
(με απόδειξη)

- Κοιν.:**
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: “**Τροποποίηση** της με αριθ. **120852/14-7-2008** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **7154** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **NORTRON 50 SC** ως προς το φάσμα δράσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αριθ. **117471/31-3-2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **7154** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **NORTRON 50 SC**, την με αριθ. 118398/5-5-2008 απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς τον κάτοχο της έγκρισης καθώς και την με αριθ. 120852/14-7-2008 τροποποίησή της ως προς το τα σημεία 4 (κατηγορία και τρόπος δράσης) και 5.1 (φάσμα δράσης).
3. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το 1^ο θέμα της **11^{ης}/16-10-2008** Συνεδρίασής του.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
6. Την από 28-7-2008 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούμε την με αριθ. **120852/14-7-2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **7154** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **NORTRON 50 SC** ως προς το σημείο 5.1 (φάσμα δράσης).

Συγκεκριμένα το σημείο 5.1 διαμορφώνεται ως εξής:

5		5.1 Φάσμα δράσης			
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ.		
Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια -Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>), -Κολληστίδα μεγαλόκαρπη (<i>Gallium aparine</i>), -Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>), - Τραχύ Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>), - Σετάρια (<i>Setaria spp.</i>)	150 – 200	20 - 30	Μεταφωτρωτικά * στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων της καλλιεργείας και μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων.	1
	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	50	20 - 30	Μεταφωτρωτικά (μικροδόσεις ζιζανιοκτόνων)** από το στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων.	2

Παρατηρήσεις:

*Για διεύρυνση του φάσματος και στα καταπολεμούμενα από το Spark ζιζάνια το NORTRON 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με 2-2.5 L/ha (200 – 250 κ.εκ./στρέμμα) Spark 16/16 EC..

**Σε μίγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα (με την προϋπόθεση της χημικής συνδιαστικότητας των μιγμάτων) σε μειωμένες δόσεις και σύμφωνα πάντα με την πρακτική και τις οδηγίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

-Η μέγιστη ποσότητα NORTRON 50 SC που επιτρέπεται να εφαρμοσθεί στο ίδιο χωράφι σε διάστημα 3 ετών είναι 2 lit/ha (=1 Kgr ethofumesate/ha).

I. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό με αριθ. **120852/14-7-2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **7154** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **NORTRON 50 SC**.

Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ



Δ – 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)		ETHOFUMESATE 50%		Σελίδες											
EEC No (α)		:		Χώρα		: ΕΛΛΑΔΑ									
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)		NORTRON 50 SC													
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο		Ζιζανιοκτόνο													
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10				
Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) (K)	Εχθρός, ομάδα ή εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα	Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις		
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χγρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Χγρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
-Ζαχαρότευτλα -Κτηνοτροφικά τεύτλα	ΕΛΛΑΔΑ	NORTRON 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια - <i>Fumaria officinalis</i> , - <i>Gallium aparine</i> , - <i>Stellaria media</i> , - <i>Amaranthus retroflexus</i> , - <i>Setaria spp.</i>	SC	500 g/lit	Ψεκασμός	Μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας και μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων	1	-	-	200-300	0,75-1	-	Για διεύρυνση του φάσματος των καταπολεμούμενων ζιζανίων το NORTRON 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με 2-2.5 L/ha Spark 16/16 EC.
-Ζαχαρότευτλα -Κτηνοτροφικά τεύτλα		NORTRON 50 SC	A	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	SC	500 g/lit	Ψεκασμός	Μεταφυτρωτικά (ΜΙΚΡΟ ΔΟΣΕΙΣ) από το στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλα των ζιζανίων	1-2	-	-	200-300	0,25	-	Σε μίγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα σε μειωμένες δόσεις και σύμφωνα πάντα με την πρακτική και τις οδηγίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπίκνωμα (EC)
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/lit
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση