



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.  
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 – 11 - 2006  
 Αριθ. πρωτ.: 123096

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ  
 Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου  
 Τηλέφωνο: 210 928 7244  
 FAX: 210 92 12 090  
 e-mail: [syg035@minagric.gr](mailto:syg035@minagric.gr)

Προς: Syngenta ΕΛΛΑΣ  
 Α.Ε.Β.Ε.  
 Λ.Ανθούσας  
 15349 – Ανθούσα, Αττική  
 (με απόδειξη)

Κοιν.:

1. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
 Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους
2. Μπενάκειο  
 Φυτοπαθολογικό  
 Ινστιτούτο  
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
 Φαρμάκων  
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
4. Εσωτερική διανομή  
 Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'  
 της Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: “Έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **Ridomil Gold MZ 68 WP**”

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ.2 και 3 αυτού.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ Β'674/13-9-88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ.6).
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
5. Την ΚΥΑ 92083/27-1-2004 (ΦΕΚ 247/Β/9-2-2004) των Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2003, για την δ.ο. metalaxyl-m.
6. Την ΚΥΑ 97252/21-5-1999 (ΦΕΚ 1240/Β/16-6-1999) των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής, για την δ.ο. mancozeb.
7. Την ΚΥΑ 101382/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία metalaxyl-m.
8. Την ΚΥΑ 116180/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006) των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία mancozeb.
9. Την με αριθ. 104967/3-9-2002 Απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. **6870** προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Ridomil Gold MZ 68 WP** καθώς τις με αριθ. 95838/11-3-2003, 111084/22-9-2003, 105350/15-6-2004 και 126834/6-9-2005 αποφάσεις μας με τις οποίες τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση.
10. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.Γ.Ε.Φ** για το 2<sup>ο</sup> θέμα της 7<sup>ης</sup>/2006 Συνεδρίασης του.
11. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
12. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
13. Τις από 3-6-2005, 26-7-2005 και 20-3-2006 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas A.E.B.E..

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε στην εταιρεία Syngenta Hellas ΑΕΒΕ έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 8 παρ.(2 και 3), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Ridomil Gold MZ 68 WP** με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **1.1** Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**6870**

**7 – 11 - 2006**

**31 – 12 - 2010**

#### **1.2** Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**Ridomil Gold MZ**

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

#### **1.3** Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Metalaxyl-m

Mancozeb

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Metalaxyl-m: 91 % (β/β) min

Mancozeb: 80%(β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

**Metalaxyl-m:** Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

**Mancozeb:** Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

**Metalaxyl-m:** Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

**Mancozeb:** Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών Metalaxyl-m και Mancozeb όπως προσδιορίζονται στην αίτηση για προσωρινή έγκριση με ημερομηνία 18-11-1999 (Αρ. Πρ. ΥΓ 111675) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Syngenta Hellas AEBE  
 Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής  
  
 AME:SYNGR  
 T.K.15349  
 Τηλ.:210-6666612-13  
 Fax: 210-6665777  
 E-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

γ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection Monthey SA, Ελβετία  
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
 Syngenta Hellas AEBE, Οινόφυτα Βοιωτίας.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Metalaxyl-m (άθροισμα εναντιομερών min. 91% R-και max. 4% S-): 4% β/β  
 Mancozeb: 64% β/β  
 βοηθητικές ουσίες : 15,75% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για προσωρινή έγκριση με ημερομηνία 18-11-1999 (Αρ. Πρ. ΥΓ 111675) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2 Συσκευασίες

### 2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 9)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κονσέρβα	100 gr, 250 gr, 500 gr και 600 gr	Κονσέρβα αλουμίνιο που περιέχει “laminated bag” με επένδυση φύλλου αλουμινίου.
2	Χαρτοκουτίο	100 gr, 1000gr, 1250 gr, 1500 gr και 2000 gr	Χαρτοκουτίο που περιέχει “laminated bag” με επένδυση φύλλου αλουμινίου.

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Πρέπει να γίνεται σε απέκαστη περιοχή της περιοχής όπου χρησιμοποιήθηκε το Ridomil Gold MZ 68 WP ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τσιμεντένιο δάπεδα και συλλογή των εκπλυμάτων σε ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Η απόσυρση/καταστροφή του Ridomil Gold MZ 68 WP πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου σε αμπέλι, πατάτα, καπνός, τομάτα και αγγούρι.

Το metalaxyl-m (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με δράση κατά των ωομυκήτων, με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς. Το mancozeb (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) είναι μη εκλεκτικό προστατευτικό μυκητοκτόνο, με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

## 5.1 Φάσμα δράσης:

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα (max)	γρ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	-Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250	250	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή, που ξεκινούν κατά την κρίσιμη για την ανάπτυξη περονόσπορου, περίοδο της άνθησης.	Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες
Πατάτα	-Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250	-	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή, που ξεκινούν όταν τα φυτά στη γραμμή φύτευσης έχουν κλείσει ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε περίπτωση έντονων και συχνών βροχοπτώσεων, συνιστάται μεταξύ δύο ψεκασμών με Ridomil Gold MZ ένας ψεκασμός με προστατευτικό μυκητοκτόνο.	Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες
Τομάτα (αγρού και θερμοκηπίου)	-Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250	250	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή, ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας και αντίστοιχη ρύθμιση του ψεκαστικού εξοπλισμού (πίεση, ταχύτητα, μπεκ. Οι ψεκασμοί να ξεκινούν από το σταύρωμα των φυτών και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.	Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες

Αγγούρι (αγρού και θερμοκηπίου)	-Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	250	250	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος, χωρίς απορροή, ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας και αντίστοιχη ρύθμιση του ψεκαστικού εξοπλισμού (πίεση, ταχύτητα, μπεκ. Οι ψεκασμοί να ξεκινούν από το σταύρωμα των φυτών και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.	Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 7-14 ημέρες
Καπνός	-Περονόσπορος ( <i>Peronospora tabacina</i> )	250	250	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος χωρίς απορροή. Συνιστάται ένας ψεκασμός 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Στα καπνοσπορεία οι ψεκασμοί να γίνονται από το σταύρωμα των φυταρίων.	Μέχρι 3 εφαρμογές προληπτικά κάθε 10-14 ημέρες

**Παρατηρήσεις:**

1. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού.
2. Η δόση εφαρμογής να μην ξεπερνά τα 40 γρ. metalaxyl-m/στρ. ανά καλλιεργητική περίοδο.
3. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά τη περίοδο έντονης ανάπτυξης των φυτών.
4. **Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

- Εφαρμογή μόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικούς ψεκασμούς.
- Επεμβάσεις κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.
- Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής.
- Ανάλογα με την καλλιέργεια, ο αριθμός των εφαρμογών να περιορίζεται σε 3 έως 4 ανά καλλιεργητική περίοδο, εκ των οποίων οι 2 μπορεί να είναι συνεχόμενες.
- Μετά τη 2<sup>η</sup> εφαρμογή με RIDOMIL Gold MZ, η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαμίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- Xn** – Επιβλαβές  
**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  
**R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης  
**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



## 11 Φράσεις S

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

**S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

- Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και καπέλο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

**S60** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανεμάστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** μεταξύ επιφανειακών υδάτων και αμπελώνα.

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»*

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

#### **Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Ιατρικές οδηγίες σε περίπτωση κατάποσης: Κάντε πλύση στομάχου και χορηγήστε αλατούχο καθαρτικό. Μην χορηγήσετε λίπη και έλαια. Υποβοηθήστε την κυκλοφορία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	MRLs (mg/kg)
<b>Metalaxyl-m</b>	Έχουν οριστεί με την ΚΥΑ 92083/27-1-2004 (ΦΕΚ 247/Β/9-2-2004)
<b>Mancozeb</b>	Έχουν οριστεί με την ΚΥΑ 97252/21-5-1999 (ΦΕΚ 1240/Β/16-6-1999)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Αμπέλι	28 ημέρες
Πατάτα	28 ημέρες
Καπνός	30 ημέρες
Τομάτα (αγρού)	14 ημέρες
Τομάτα (θερμοκηπίου)	7 ημέρες
Αγγούρι (αγρού)	14 ημέρες
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	7 ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το Ridomil Gold MZ 68 WP παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**

**Δ - 7 (GAP)**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

: metalaxyl-M + mancozeb

Σελίδες :

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Ridomil Gold MZ 68 WP

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης  (α)	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται  (β)	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις  (μ)
					Μορφή  (δ)	Περιεκτικότητα σε δ.ο  (θ)	Μέθοδος/ Τρόπος  (η)	στάδιο ανάπτυξης και εποχή  (ι)	αριθμός εφαρμογών ελαχ. μεγ.  (κ)	χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	χλ.γ δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	χλ.γ δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
Αμπέλι	ΕΛΛΑΣ	Ridomil Gold MZ 68 WP	A	<i>Plasmopara viticola</i>	WP	40 g/kg metalaxyl-M + 640 g/kg mancozeb	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 53- BBCH 81	3-4	10	0,01+0,16	500-1000	(0,05+0,8)-(0,1+1,6)	28	
Πατάτες	ΕΛΛΑΣ	Ridomil Gold MZ 68 WP	A	<i>Phytophthora infestans</i>	WP	40 g/kg metalaxyl-M + 640 g/kg mancozeb	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικά πριν το στάδιο έντονης ανάπτυξης	2-3	10		500-1000	0,1+0,16	28	
Καπνός	ΕΛΛΑΣ	Ridomil Gold MZ 68 WP	A	<i>Peronospora tabacina</i>	WP	40 g/kg metalaxyl-M + 640 g/kg mancozeb	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικά πριν το στάδιο έντονης ανάπτυξης	2-3	10	0,009+0,14	500-1000	((0,045+0,72)-(0,09+1,4)	30	Εφαρμογή και σε σπορεία

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθένειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος/ Τρόπος	στάδιο ανάπτυξης και εποχή	αριθμός εφαρμογών ελαχ. μεγ.	χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	χλγ δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	χλγ.δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
(α)			(β)	(γ)	(δ)	(θ)	(η)	(ι)	(κ)					(λ)	(μ)
Τομάτες	ΕΛΛΑΣ	Ridomil Gold MZ 68 WP	A/Θ	<i>Phytophthora infestans</i>	WP	40 g/kg metalaxyl-M + 640 g/kg mancozeb	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικά πριν το στάδιο έντονης ανάπτυξης	2-3	10	0,01+0,16	500-1000	(0,05+0,8)-(0,1-1,6)	14 ημέρες (αγρός), 7 ημέρες θερμοκήπιο	
Αγγούρι	ΕΛΛΑΣ	Ridomil Gold MZ 68 WP	A/Θ	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	WP	40 g/kg metalaxyl-M + 640 g/kg mancozeb	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικά πριν το στάδιο έντονης ανάπτυξης	2-3	7	0,01+0,16	500-1000	(0,05+0,8)-(0,1-1,6)	14 ημέρες (αγρός), 7 ημέρες θερμοκήπιο	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

- (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).  
(γ) π.χ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια  
(δ) π.χ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)  
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.  
(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  
(ζ) Μέθοδος π.χ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Π.χ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/lt

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς

στη χρήση