



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 14 677
FAX: 210 92 12 090**

**Αθήνα 17 – 5 - 2005
Αριθ. πρωτ.: 122997**

**Προς: Syngenta ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.
Λ.Ανθούσας
15349 – Ανθούσα, Αττική
(με απόδειξη)**

Κοιν.:

- 1. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους**
- 2. Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**
- 3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους**
- 4. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων**
- 5. Εσωτερική διανομή
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'
της Δ/σης μας**

**ΘΕΜΑ: "Έγκριση οριστικής διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
RIDOMIL GOLD 48 SL"**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη¹:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 και το Παράρτημα VI αυτού².
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τη με αριθ. 101382/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία metalaxyl-m.
5. Την με αριθ. **106904/12-9-2002** Απόφαση μας, με την οποία χορηγήθηκε **προσωρινή** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **RIDOMIL GOLD 48 EC**³.
6. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **5^ο** θέμα της **1^{ης}/2005** Συνεδρίασης του.
7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
8. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού».
9. Τη με αριθ. πρωτ 117161/28-11-2003 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ⁴.

Α Χορηγούμε έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο4 (1)⁵, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **RIDOMIL GOLD 48 SL** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης⁶

6995

17 - 5 - 2005

17 - 5 - 2015

¹ Μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση

² Αλλάζει εκάστοτε ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. προσωρινή έγκριση, οριστική έγκριση κ.λ.π.)

³ Σε περίπτωση που δεν έχει προηγουμένα δοθεί προσωρινή έγκριση, το σημείο αυτό θα πρέπει να απαληφθεί

⁴ Αναφέρεται ο αιτών

⁵ ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

RIDOMIL GOLD

1.2.β Μορφή⁷:

SL (Πυκνό διάλυμα)

1.3 Δραστική ουσία (ες)⁸

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσία/ζών κατά ISO⁹

metalaxyl-M
(ομάδα φαινυλαμιδίων)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91 % (β/β)
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002
Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.¹⁰

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Όνομασία: Syngenta Crop Protection AG
Περιοχή/χώρα: Pratteln Ελβετίας
Ταχ. Δ/ση: Pratteln-Ελβετίας
Τηλ.: 0041613237736
FAX: 0041613234966
E-mail: ---

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metalaxyl-M όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα 14 της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 28-11-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 117161) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

⁶ Η έγκριση χορηγείται για διάρκεια δέκα (10) ετών και μπορεί να ανακαλείται εάν οι όροι για την απόκτηση της πάθουν να πληρούνται.

⁷ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

⁸ Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

⁹ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

¹⁰ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης¹¹:

Syngenta Hellas AEBE
AME¹²: SYNGR
Λ.Ανθούσας –Ανθούσα
Αττικής
Τ.Κ. 15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210-6665777
E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)¹³:

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Εταιρεία:Syngenta Crop Protection AG,
Monthey-Ελβετίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος¹⁴

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Εταιρεία:Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση εργοστασίου:Monthey-Ελβετίας
Ταχ. Δ/ση: Monthey-Ελβετίας
Τηλ.: 0041613237736
FAX: 0041613234966
E-mail:---

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος¹⁵

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Εταιρεία:Syngenta Hellas AEBE
Διεύθυνση εργοστασίου:Οινόφυτα Βοιωτίας
Ταχ. Δ/ση: 2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής Οδού
Οινοφύτων-Αγ.Θωμά-Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 22620-51600
FAX:22620-31583
E-mail:---

¹¹ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

¹² Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

¹³ Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως υπεύθυνος για την έγκριση κυκλοφορίας νοείται αυτός που υποβάλει την αίτηση για έγκριση (π.χ. αντιπρόσωπος)

¹⁴ Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος νοείται ο **τυποποιητής**

¹⁵ Προκειμένου για εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.2. του ΠΔ 115/1997 ως εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος νοείται ο **συσκευαστής**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

metalaxyl-M 46,52% β/ο
βοηθητικές ουσίες 51,78% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα 14 της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 28-11-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 117161) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία(ες): (Σύνολο συσκευασιών: δώδεκα 12)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιαλίδια εντός χαρτοκυτίου ή με ενσωματωμένο φυλλάδιο	120, 240 και 250 κ.εκ.	PET και HDPE
2.	Φιάλες	600, 1000 και 1200 κ.εκ.	PET και HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα RIDOMIL GOLD 48 SL στο νερό, που προορίζεται για το πότισμα της νέας φυτείας κατά τη μεταφύτευση και ποτίστε.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Βάζουμε στο ψεκαστικό, το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ποτιστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ποτίζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση /καταστροφή του RIDOMIL GOLD 48 SL πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο

Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό κατά των ωομυκήτων διασυστηματικό μυκητοκτόνο. Απορροφάται από τις ρίζες και κινείται μέσα στο φυτό με αποτέλεσμα την προστασία των φυτών του καπνού για διάστημα τουλάχιστον 45 ημερών. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του r-RNA.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος		Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
			γρ./ στρέμμα	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
Καπνός	Φυτόφθορα	<i>Phytophthora parasitica</i>	100-120	-	-	Με το νερό του ποτίσματος κατά τη μεταφύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μία (1)

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά την μεταφύτευση.
2. Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.

5.2 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Καλλιέργεια	Ημέρες
Καπνός	---

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Εφόσον σε 45 ημέρες από την εφαρμογή του Ridomil Gold 48 SL στο έδαφος απαιτηθεί επέμβαση για την αντιμετώπιση περονοσπόρου στο φύλλωμα, να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν περιέχουν metalaxyl-M ή άλλα μυκητοκτόνα που ανήκουν στην ομάδα φαινυλαμιδίων.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.</p>
<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<p>Xn – Επιβλαβές</p>
<p>10 Φράσεις R</p>	<p>R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.</p>
<p>11 Φράσεις S</p>	<p>S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές S20/21 Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα προστασίας ματιών/προσώπου</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας</p> <p><i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</i></p>
<p>12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p>Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: <u>Γενικά:</u> Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. <u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβανοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777</p>

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)¹⁶

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
--	--

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
--	--

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹⁷.

Το RIDOMIL GOLD 48 SL παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο, υγρασία και σε θερμοκρασία από -10oC έως 35oC.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα ΙΑ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Στο Παράρτημα ΙΒ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες οι οποίες προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13 (3) και (4) του Π.Δ. 115/1997.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

¹⁶ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

¹⁷ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα που διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ

Δ – 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ημερομ: 30 – 3 - 2005

Εμπορική ονομασία:

RIDOMYL GOLD 48 SL

EEC, CIPAC, and CCPR No (s)

: metalaxyl-M

Σελίδα: 1

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

:Μυκητοκτόνο

Χώρα: Ελλάδα

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
					Μορφή	Περιεκτ. σε δ.ο.	Μέθοδος /τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης & εποχή	Αριθμός εφαρμογών ελα (σε ημέρες)	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών	Χλγ. Δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. Μέγ.	Λίτρα ψεκαστικού υγρού / εκτάριο ελάχ. Μέγ.	Χλγ δ.ο. / εκτάριο ελάχ. Μέγ.		
Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης (α)	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K) (β)	Εχθρός, Ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα										
Καπνός	Ελλάδα	RIDOMYL GOLD 48 SL	A	<i>Φυτόφθορα -Phytophthora parasitica</i>	SL	465 g/l	Πότισμα	Με το νερό του ποτίσματος κατά τη μεταφύτευση	1	-	-	-	0,465-0,558	-	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
(β) Ανοιχτού αγρού (A), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (K).
(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/l
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση