



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 212 45 08

Αθήνα, 11-05-2004

Αριθ. πρωτ.: 105262

ΠΡΟΣ: 1. AGROTECHNICA
ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ 112, 570 22-Θεσ/νίκη
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
CHLORPYRIFOS-
AGROTECHNICA 25 WP ”

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α/77) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83346/28.7.86 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 107394/6.10.99 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1842 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης εντομοκτόνο σκεύασμα PYRIFOS 25 WP καθώς και τη με αριθ. 109095/30.11.2000 Απόφασή μας, με την οποία καθορίστηκε νέο φάσμα δράσης για τα εντομοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία chlorpyrifos.
6. Τη με αριθ. 230642/15-3-2004 (ΦΕΚ 525/23-3-2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωσή της για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 26-2-2004 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14051** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CHLORPYRIFOS-AGROTECHNICA 25 WP
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** chlorpyrifos 25% β/β, βοηθητικές ουσίες: 73,4% β/β
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 94% min.
Οίκος παρασκευής technical: EXCEL CROP CARE LIMITED.
Εργοστάσιο παρασκευής technical: 6/2 Ruvaparī road, Bhavnagar-364 001, Gujrat, Ινδία.
5. **Παρασκευαστής:** AGROTECHNICA-ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ 112, 570 22-Σίνδος
6. **Αντιπρόσωπος:** -----
7. **Τυποποιητής:** ο παρασκευαστής.
8. **Συσκευαστής:** ο παρασκευαστής.
9. **Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος:** α) Σακούλες των 100, 200, 300, 400, 500, 800 γραμ. 1 κιλού, 2, 3, 4, 5 και 10 κιλών.
β) Σακούλες εντός χαρτοκυτίων των 100, 200, 300, 400, 500, 800 γραμ. 1 κιλού, 2, 3, 4, 5 και 10 κιλών.

Υλικό: α) i) Λαμιναρισμένη σακούλα τριών φύλλων (TRIPLEX), αποτελούμενη από πολυαιθυλένιο (εσωτερικά), aluminium foil και πολυεστέρα (εξωτερικά).
ii) Λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων, αποτελούμενη από πολυαιθυλένιο (εσωτερικά) και πολυεστέρα (εξωτερικά).

β) Χαρτοκύτιο τυπωμένο με τις απαραίτητες οδηγίες, με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου, λαμιναρισμένη με πολυεστέρα.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.

11. Τρόπος εφαρμογής :

- Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.
- Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση.
- Δολώματα

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13.1 ΨΕΚΑΣΜΟΣ	ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ		
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέϊπ-φρουτ)	-Ψευδόκοκκος (Pseudococcus citri) -Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii) -Λεκάνιο (Saissetia oleae) -Ασπιδιωτός (Aspidiotus nerii)	300 (με 200-400 λίτρα νερό)	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασμού (αν χρειαστεί) μετά από 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί γίνονται από Ιούνιο -Σεπτέμβριο πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.

	-Ισέρνα (<i>Icerya purchasi</i>) -Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphis beckii</i>) -Λοιπές ψώρες -Θρίπες (<i>Trips spp.</i>) -Αφίδες (<i>Toxoptera spp.</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus spp.</i>) -Ανθοτρήτης (<i>Prays citri</i>)	300 (με 200-400 λίτρα νερό)	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασμού (αν χρειαστεί) μετά από 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί γίνονται από Ιούνιο -Σεπτέμβριο πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)	-Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) -Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i>) -Υπονομευτής (<i>Hyponomeuta malinellus</i>) -Ψώρα του Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>) -Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , P. <i>corylifoliella</i> , <i>Cemiosoma scitella</i> , <i>Lyonetia clerkella</i>) -Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>) -Κόσσος (<i>Cossus cossus</i>) -Ξυλοφάγα έντομα	300 (με 100-200 λίτρα νερό)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη (αν χρειαστεί) μετά από 15 ημέρες.
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηινιά)	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Φυλλοδέτες (<i>Archips rosanus</i> , A. <i>podanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i>) -Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>)	300 (με 150-250 λίτρα νερό)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη (αν χρειαστεί) μετά από 15 ημέρες.

-Κόσσοσ
(*Cossus cossus*)
-Ξυλοφάγα έντομα

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

(Καρότο,
ραπάνια,
κρεμμύδια,
τομάτα,
πιπεριά,
μελιτζάνα,
αγκινάρες)

-Αφίδες
(*Aphis* spp.,
myzus spp.)
-Θρίπες
(*Thrips* spp.)
-Πράσινο σκουλήκι
(*Heliothis armigera*)
-Πιερίδα
(*Pieris brassicae*)

300-350
γρ./στρ.
(με 50-80
λίτρα νερό)

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη (αν χρειαστεί) μετά από 15 ημέρες.

ΒΑΜΒΑΚΙ

-Πράσινο σκουλήκι
(*Heliothis armigera*)
-Ρόδινο σκουλήκι
(*Pectinophora gossypiella*)
-Σποντόπτερα
(*Spodoptera exiqua*)
-Αφίδες
(*Aphis gossypii*)
-Θρίπες
(*Thrips tabaci*)

300-350
γρ./στρ.
(με 50-80
λίτρα νερό)
λίτρα νερό)

Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ

-Δορυφόρος
(*Leptinotarsa decemlineata*)
-Φθοριμαία
(*Phthorimeae operculella*)
-Αφίδες
(*Aphis* spp.,
Myzus spp.)

300-350
γρ./στρ.
(με 50-80
λίτρα νερό)

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

13.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

(αγγούρι,
κολοκύθι,
καρπούζι)

-Σιδεροσκουλήκο
(*Agriotis* spp.)
-Υλέμια
(*Hylemyia Antiqua*)

1000
γρ./στρ.
κ.εκ./στρ
(Καθολική
εφαρμογή)
400 γρ./στρ.
(σε λωρίδες
ή αυλάκια)

Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

ΤΡΙΦΥΛΛΙ,

ΒΑΜΒΑΚΙ,

ΠΑΤΑΤΑ,

ΣΙΤΑΡΙ,

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ,

ΚΑΠΝΟΣ

	-Πρασάγγουρας (Grylotalpa spp.)	400 γρ./στρ.	Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.
	-Χλώροπας (Carabidae)	(Καθολική εφαρμογή)	
	-Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides)	200 γρ./στρ. (σε λωρίδες ή αυλάκια)	
	-Κοφτοσκούληκο (Agriotis spp.)	250 γρ./στρ. (Καθολική εφαρμογή)	Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ράντισμα και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.
		150 γρ./στρ. (σε λωρίδες ή αυλάκια)	
Σπορεία, Καπνοσπορεία	»	1 γρ./1 τ.μ	Μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος.
Καπνός, τομάτα, λοιπά λαχανικά	»	300 γρ./στρ.	Κατά το φύτεμα. Με το νερό του φυτέματος.
Πατάτα	»	400 γρ./στρ.	Κατά το φύτεμα. Ψεκάσμος του εδάφους στις αυλακίες.

13.3 ΔΟΛΩΜΑΤΑ

- Κοφτοσκούληκο (Agriotis spp.)
- Πρασάγγουρας (Grylotalpa spp.)

Δόση: 200 γρ./στρ. με 3 KG πίτουρα σε 1 λίτρο νερό και διασκορπισμό στη συνέχεια.

Παρατήρηση:

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο (για τους ψεκάσμούς φυλλώματος): 2 εφαρμογές.

14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

16. **Σημάνσεις Τοξικότητας:** Xn - Επικίνδυνο, Xi - Ερεθιστικό.

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- R20** -Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα.
- R22** -Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- R36** -Ερεθίζει τα μάτια.

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):**

- RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- RO4/RO7** Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικώς τους υδρόβιους οργανισμούς.
- RO11** Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.
- RO13/RO15** Βλαβερό για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/S2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S23 Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.
S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
SY1 Όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα φοράτε φόρμα μπότες και ελαστικά γάντια.
 Αν πεταχτεί φάρμακο στα μάτια πλύντε τα καλά επί 15 λεπτά.
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό.
SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SY11 Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε επείγοντως ιατρική βοήθεια.

Αναπνοή: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 5' λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύντε αμέσως τη δερματική περιοχή στην οποία έπεσε σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: θεϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO1 -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

SO3 -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

SO5 -Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την πρόσφατα ψεκασμένη περιοχή.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-Εσπεριδοειδή, μηλοειδή: **30** ημέρες. -Λοιπές καλλιέργειες: **20** ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

(S7/8) Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με τον ίδιο αριθμό στο παραπάνω γεωργικό φάρμακο με ιδιαίτερο έντονο χρωματισμό (κόκκινο) για εφαρμογή στο σπόρο και ιδιαίτερη ετικέτα που να περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

α) Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 κιλιά σπόρου	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βαμβακόσπορος (Προσδιορισμός για σπορά)	Έντομα εδάφους	1200	Πριν τη σπορά.

Φασόλια, 800 Πριν τη σπορά
Καλαμπόκι Έντομα εδάφους

Σιτάρι 250-400 Πριν τη σπορά
Έντομα εδάφους

β) Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Στην περίπτωση εφαρμογής του με ψεκασμό γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό, αραιώνουμε την αναγκαία ποσότητα του φαρμάκου σε λίγο νερό, το προσθέτουμε στο ψεκαστικό αναδεύοντας και συνεχίζουμε την προσθήκη του υπολοίπου νερού υπό ανάδευση.

γ) Τρόπος εφαρμογής:

1. Εφαρμόζεται είτε με ψεκασμό των σπόρων που τους έχουμε απλωμένους σε φύλλο πολυαιθυλενίου, είτε με έγχυση της δόσης του εντομοκτόνου σε πλαστικό σάκκο, όπου βρίσκεται ο σπόρος και ακολούθως ανατάραξη επί 2 λεπτά.
2. Επίσης εφαρμόζεται με την slurry μέθοδο, είτε μόνο του, είτε σε ανάμειξη με προστατευτικά μυκητοκτόνα. Ανακατεύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου με λίγο νερό ώστε να γίνει κρέμα.
Προσθέτουμε τέτοια ποσότητα (περίπου 2 λίτρα για 100 κιλά σπόρου) ώστε το διάλυμα που γίνεται να επαρκεί να καλύψει τους σπόρους.
Στην συνέχεια ανακατεύονται, το διάλυμα και ο σπόρος, στο ειδικό βαρέλι του αναμικτήρα.

δ) Ο επενδεδυμένος σπόρος δεν χρησιμοποιείται για ανθρώπινη τροφή (λάδι) ή ζωοτροφή.

III. Από την 1-8-2004 οι παράγραφοι 16, 17, 18, 19 και 21 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

16. **Σημάνσεις Τοξικότητας:** T-τοξικό, Xi-ερεθιστικό, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R25 -Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

R36 -Ερεθίζει τα μάτια.

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R και RO φράσεις):**

R50 -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 -Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

R57 -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.

RO13/RO15 Βλαβερό για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :**

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S 3/7 Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

S 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S 14 Μακριά από χαλκό, ορείχαλκο, σίδηρο, λευκοσίδηρο.

S 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

S 22 Μην αναπνέετε την σκόνη.

S 23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S 28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

S 36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/πρόσωπου.

- S 41** Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς.
- S 43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό.
- S 45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, εάν είναι δυνατόν).
- S 60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S 61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

- SO1** -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- SO3** -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
- SO5** -Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την πρόσφατα ψεκασμένη περιοχή.

IV. Ετικέτα:

- α)** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
- β)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά μέχρι τις 30-7-2004, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μέχρι τη λήξη τους (2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής που αναγράφεται στην ετικέτα), με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίζεται με τις παραγράφους 16, 17, 18, 19 και 21 του τμήματος Ι της παρούσας Απόφασης.
- γ)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά από την 1-8-2004, θα κυκλοφορούν με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίστηκε με τις παραγράφους 16, 17, 18, 19 και 21 του τμήματος ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης.
- δ)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

V. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ