



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 6 - 12 - 2006

Αριθ. πρωτ.: 123898

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

ΠΡΟΣ: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Τ.Κ. 151 25 - Μαρούσι
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο), **RONSTAR 25 EC**, ως
προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας και
το εργοστάσιο παρασκευής και
συσκευασίας του σκευάσματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ. 1 και 2
3. Τη με αριθ. 1716/27-4-1999 απόφασή μας για « παρασκευαστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή».
4. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
5. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με "Έντολή Υφυπουργού».
6. Τις από 30-3-2005 και 10-5-2006 αίτηση της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ** για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος **RONSTAR 25 EC**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Η οριστική έγκριση, με αριθμό **7231** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο), **RONSTAR 25 EC**, της εταιρείας **BAYER Ελλάς ABEE**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 158541/1811/26-2-1980 απόφασή μας, τροποποιήθηκε με την αριθ. 103269/13-5-2004 και ανανεώθηκε με την αριθ. 122949/27-4-2005 απόφασή μας τροποποιείται **ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και διαμορφώνεται ως ακολούθως:**

- 1. Εμπορικό όνομα:** RONSTAR.
- 2. Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** oxadiazon 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73% β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 94% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο:** Bayer CropScience AG - Γερμανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : Bayer CropScience AG - Γερμανία
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στα ENTΥΠΙΑ IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** Bayer CropScience SA. – Γαλλία.
β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Bayer Ελλάς ABEE
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Bayer Ελλάς ABEE
- 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer CropScience S.A. – Γαλλία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer CropScience GmbH, Frankfurt am Main, Germany.
- 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer Ελλάς ABEE, Ύπατο Θηβών.
9. Συσκευασία: **9α. Είδος-Μέγεθος:**Φιάλες 1 (ενός) λίτρου.
9β. Υλικό: COEX.
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Προφυτρωτικό-Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια σε γαρύφαλλα, γλαδίολους, αμπέλια, σποροφόρα και ρύζι.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
Εφαρμόζεται με ψεκασμό.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζετε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτετε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.
- 13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ Καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Γαρύφαλλα	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1000 – 1500	150-200	Ψεκασμός λίγες μέρες μετά τη φύτευση των μοσχευμάτων ή σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης των	1

	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια			γαρύφαλλων, όταν τα ζιζάνια είναι ακόμη μικρά.	
Γλαδίοιοι		1000 - 1500	150-200	Ψεκασμός λίγες μέρες μετά τη φύτευση.	1
Ρύζι		350 - 400		Ψεκασμός σε ψιλοχωματισμένο έδαφος 4-5 ημέρες πριν την κατάκλυση.	1
Αμπέλια Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Βερικοκιά)		Προφυτρωτικά 1000 – 1500 Μεταφυτρωτικά 800 - 1000		Στα Αμπέλια ψεκάζουμε πριν φουσκώσουν τα μάτια ή μετά το στάδιο των 10-12 φύλλων. Στα Οπωροφόρα 2-4 εβδομάδες μετά την καρπόδεση. Σε ροδακινιές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δέντρα από 2 ετών και πάνω.	1
Κρεμμύδια από κοκάρι		300 - 400		Η εφαρμογή γίνεται μετά τη φύτευση του κοκαριού (3 ημέρες) και προφυτρωτικά.	1
Κρεμμύδια από σπόρο		150 - 300		Η εφαρμογή γίνεται όταν η καλλιέργεια φτάσει τα 3-4 φύλλα. Ποτίζουμε για να βοηθήσουμε την αποτελεσματικότητα.	1

Σε εδάφη με πολύ οργανική ουσία χρησιμοποιήστε τις υψηλές δοσολογίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αγρωστώδη ζιζάνια: *Agrostis spica-venti* (άγρωστις), *Avena fatua* (αγριοβρώμη), *Cyperus* sp. (κύπερη – εκτός της *rotundus*), *Digitaria* sp. (διγιάτνια), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Festuca* sp. (φεστούκα), *Leptochloa* sp. (λεπτόχλοα), *Lolium* (ήρα – λόλιο), *Paspalum* (πάσπαλο), *Phalaris* (φαλαρίδα), *Setaria* (κολλητσίδα).

Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Abutilon theophrasti (αβούτιλο), *Alisma plantago* (άλισμα), *Amaranthus* spp. (βλήτα), *Ambrosia artemisifolia* (αμβροσία), *Anagalis arvensis* (αναγαλίδα), *Anthemis* sp. (αγριομαργαρίτα), *Brassica* spp., *Capsela bursa-pastoris* (καψέλλα), *Cerastium arvense* (κεράστιο), *Chenopodium* sp. (χηνοπόδι – λουβουδιά), *Convolvulus arvensis* (περικοκλάδα), *Datura* sp. (τάτουλας), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο), *Galinsoga parviflora* (γαλινσόγα), *Galium* sp. (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Lamium* sp. (λάμιο), *Matricaria* sp. (χαμομήλι), *Oxalis* sp. (οξαλίδα), *Plantago* sp. (πλαντάγο), *Polygonum* spp. (πολύγωνο), *Raphanus* sp. (αγριοραφανίδα), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Sinapis arvensis* (σινάπι), *Scirpus* sp. (Σκίρπο), *Sonchus* spp. (ζωχόι), *Urtica* spp. (τσουκνίδα), *Veronica* spp. (βερονίκη).

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον της περικοκλάδας (*Convolvulus* sp.), προ και μεταφυτρωτικά.

Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές ψεκάζουμε την περικοκλάδα όταν έχει μήκος 10-20 εκ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Κύπερη Πορφυρή (*Cyperus rotundus*), Κίρσιο (*Cirsium* spp.), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοκουκιά (*Agrostemma* spp.) και Στελλάρια (*Stellaria media*).

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται
SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα, με άφθονο νερό και υγρό απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Να προφυλάσσονται οι νεαρές κορυφές από τον ψεκασμό. Φυτοτοξικότητα στα τριαντάφυλλα.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σήμανση τοξικότητας: Xn - Επιβλαβές

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10** Εύφλεκτο
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):

- R50/53** Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις και S φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας :

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): --

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): --

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) τουλάχιστον χρόνια κάτω από κανονικές συνθήκες, και σε θερμοκρασία από 0 έως 35 °C μέσα στη συσκευασία του. (Η ημερομηνία λήξης δεν θα αναγραφεί στην ετικέτα).

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ