



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 9287161
FAX: : 210 92 12 090
E-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ:

«Ανανέωση και Τροποποίηση της με αριθμό 6914 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνου) NUSTAR 20 WG ως προς το φάσμα δράσης και την επωνυμία του συσκευαστή »

Αθήνα, 17 - 6 -2008
Αριθ. πρωτ.: 119575

ΠΡΟΣ:

NTY PONT AGKPO ELLAS A.E.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
5. Π.Κ. Π.Φ. και Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε
της διεύθυνσης μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε/ Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το **άρθρο 4 (παρ. 6)** αυτής.
2. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας **116045/20-11-2003** με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **6914** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NUSTAR 20 WG (μυκητοκτόνο)** και την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1032085/13-5-2004 με την οποία αυτή τροποποιήθηκε
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008
4. Το από 21-3-2008 Υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
7. Τις με αρ. πρωτ. 124642/11-12-07 και 122258/1309/07 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **6914** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **NUSTAR 20 WG (δ.ο. flusilazole)** (Υπ. Αριθ. **116045/20-11-2003**) της εταιρείας **NTY ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**, ως προς το φάσμα δράσης και την επωνυμία του συσκευαστή και την ανανεώνουμε για πέντε έτη.

Συγκεκριμένα τα σημεία 8, 13, 23 και III διαμορφώνονται ως εξής:

8. Συσκευαστής : DuPont Operations Italia S.r.l.

13 Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιά,
Αχλαδιά

Φουζικλάδιο
(*Venturia inaequalis*,
Venturia pyrina)

10-13
γρ./100
λίτρα νερό

Ψεκασμοί στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής και όταν έχουν πέσει τα πέταλα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών 10-12 ημέρες ανάλογα με τη δόση εφαρμογής και την ένταση της προσβολής.

Ροδακινιά,
Νεκταρινιά

Ωίδιο
(*Sphaerotheca pannosa*)

20
γρ./100
λίτρα νερό

Ο 1^{ος} ψεκασμός προς το τέλος Μαρτίου στην «πτώση των πετάλων».
Ο 2^{ος} κατά την «απόσπαση του κάλυκα» δηλαδή 10-14 ημέρες μετά τον 1^ο ψεκασμό.
Ο 3^{ος} ψεκασμός πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα, συμπίπτει με το «στάδιο καρπιδίου μεγέθους καρυδιού» και έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση της ασθένειας (στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από ωίδιο).
Τέλος ένας τελευταίος ψεκασμός με NUSTAR 20 WG μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει πρόβλημα κατά τη «σκλήρυνση του πυρήνα».

Ζαχαρότευτλα

Κερκοσπορίαση
(*Cercospora beticola*)

15-40
γρ./στέμμα

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

Μηλιά, Αχλαδιά: 100-200 λίτρα/στρέμμα

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 100-160 λίτρα/στρέμμα

Ζαχαρότευτλα: 40-80 λίτρα/στρέμμα

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά 4, Ζαχαρότευτλα 3.

Παρατηρήσεις:

-Το NUSTAR 20 WG απορροφάται από τους φυτικούς ιστούς και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί ο ψεκασμός ακόμη και αν βρέξει 4 ώρες μετά τον ψεκασμό. Όμως σε χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερες των 10^o C) και στο στάδιο πριν την άνθηση της αχλαδιάς μπορεί να καθυστερήσει η απορρόφηση.

Σ' αυτές τις συνθήκες συστήνεται η εφαρμογή της υψηλότερης δόσης και σε περίπτωση ισχυρής βροχής επανάληψη του ψεκασμού μέσα σε 6-7 ημέρες.

-Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης από τους DMIs.

Για τον ίδιο λόγο οι επεμβάσεις με το σκεύασμα ανά καλλιεργητική περίοδο, να μη ξεπερνούν τις 2.

-Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας.

-Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.

-Αποφυγή επεμβάσεων με NUSTAR 20 WG μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά: 20 ημέρες

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 28 ημέρες

Ζαχαρότευτλα: 15 ημέρες

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό **116045/20-11-2003** Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ **6914** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) **NUSTAR 20 WG**.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ