



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25-2-2008

Αριθ. πρωτ.: 116088

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
E-mail: syg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: 1. CHEMIA S.P.A. Ιταλίας
(δια της εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, 54249-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
2. INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Κηφισίας 31, 115 23 – ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Φυτικής Παραγωγής
4) Μ.Φ.Ι. (με e-mail)
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ακαρεοκτόνο) CITRAN 500 SC”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 115618/10.04.2007 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2130 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) Z-Z-RED.
6. Την με αριθ. 91923/23.1.2003 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' /101/30.1.2003), με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία της χώρας μας με την Οδηγία 2002/79/ΕΚ, ως προς τα ανώτερα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας cyhexatin στα τρόφιμα.
7. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
8. Τη με αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού””.

9. Τις από 29-05-2003, 02-10-2007, 09-10-2007 και 13-11-2007 αιτήσεις για λογαριασμό της εταιρείας CHEMIA S.P.A. Ιταλίας από τους εξουσιοδοτημένους από αυτή υπεύθυνους επικοινωνίας, καθώς και το από 13-11-2007 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε στην εταιρεία CHEMIA S.P.A. Ιταλίας, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **2147** του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (ακαρεοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: CITRAN 500 SC

2. Είδος (μορφή) σκευάσματος: Συμπυκνωμένο ελαιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση: cyhexatin 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 57,11% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
95% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: CHEMIA S.P.A., Via Statale, 327-C.P. 7, 44040 DOSSO (Ferrara), Ιταλία.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: CHEMIA S.P.A., Ιταλία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: CHEMIA S.P.A., Via Statale, 327-C.P. 7, 44040 DOSSO (Ferrara), Ιταλία.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: CHEMIA S.P.A., Via Statale, 327-C.P. 7, 44040 DOSSO (Ferrara), Ιταλία.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: CHEMIA S.p.A., Ιταλία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: CHEMIA S.p.A., Ιταλία. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

β. Συσκευασίες: Είδος-Μέγεθος: α1. Φιάλες των 250, 500 κ.εκ και 1 λίτρου
α2. Δοχεία των 5 και 10 λίτρων.

- **Υλικό:** HDPE.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής. Καταπολεμά τις κινούμενες μορφές (ακμαία και προνύμφες) των ακάρεων.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση.

-Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσο-διαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
		Κ.εκ. Σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό*	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	Κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα (max)		
Μηλιά ,Αχλαδιά	-Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Βρυόβιος (Bryobius rubrioculus) -Διάφοροι Τετράνυχτοι (Eutetranychus carpinii)	42-60	100-200	120	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών των ακάρεων.	2/30
Δαμασκηλιά	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Βρυόβιος των πυρηνοκάρπων (Bryobius rubrioculus)	42-60	150-250	150	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών των ακάρεων.	2/30
Φράουλα	-Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) -Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	42-60	50-70	42	Μετά το πέρας της συγκομιδής όταν δεν υπάρχουν καρποί στα φυτά.	1
Φασόλι	-Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae) -Aculops lycopersici	42-60	80-100	60	Με την εμφάνιση των κινητών μορφών των ακάρεων	2/30
Βαμβάκι	-Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)		40-80	120	Με την εμφάνιση των κινητών μορφών των ακάρεων.	2/30
Γαριφαλιά, τριανταφυλλιά	-Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae) --Τετράνυχος της γαριφαλλιάς (Tetranychus cinnabarinus) -Ερίνωση (Eriophyes paradianthi)	42-60	80	48	Με την εμφάνιση των κινητών μορφών των ακάρεων.	2/30

*: το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

Παρατηρήσεις:

1. Στις συνιστώμενες δοσολογίες είναι ακίνδυνο για τα ωφέλιμα παράσιτα εντόμων και ακάρεων.
2. Η διάρκεια δράσης του φθάνει τις 30 ημέρες, γι' αυτό οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται μόνο εφόσον εμφανιστούν εκ νέου τα ακάρεα.
3. Πρέπει πάντα να γίνεται καλός ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης διαβροχή των φυτών και ειδικότερα των φύλλων και στις δυο επιφάνειες.

14. Φυτοτοξικότητα:

Σπορόφυτα και τρυφερή βλάστηση καλλωπιστικών και λαχανικών μπορεί να υποστούν ελαφρές βλάβες υπό μορφή εντοπισμένων κηλίδων. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στην ποικιλία "ΜΠΑΚΑΡΑ" της τριανταφυλλιάς.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαβρέκτες. Να μην χρησιμοποιείται με πολτούς κυρίως όταν υπάρχουν καρποί, ούτε πρέπει να γίνεται ψεκασμός χωριστά πριν μεσολαβήσουν τουλάχιστον 28 ημέρες.

16. Σημάνσεις: Χη-Επιβλαβές, Χι-ερεθιστικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):

R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO-φράσεις και R-φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO11/RO15 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα και τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία:

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY9 Να μην χρησιμοποιείται από εγκύους ή παρουσία εγκύων γυναικών.

SY10 Μην αυξάνεται τις δόσεις.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του. Μη ψεκάζετε αντίθετα προς τον άνεμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

(S45/46) Σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση κατάποσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Γίνεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

(SO3) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

(SO5) Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις: **A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
A2 Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

-**Φράουλα** : Ψεκασμοί επιτρέπονται μόνον μετά το πέρας της συγκομιδής όταν δεν υπάρχουν καρποί στα φυτά.

-**Λοιπές καλλιέργειες**: **35** ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ